



FONDO PIZZOFALCONE



NAZIONALE

B. Prov.

BIBLIOTECA

V

137

NAPOLI

VITT. EM. III

25-A-65

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Armadio

XIX



Palchetto

Num.° d'ordine

16

22-28-38

B. Prev.

IV

137



A B R È G É
D E S
TRANSACTIONS
PHILOSOPHIQUES.

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

S E P T I È M E P A R T I E .



615232

A B R É G É

D E S

TRANSACTIONS

PHILOSOPHIQUES

D E

LA SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES ;

*OUVRAGE traduit de l'Anglois , & rédigé par
M. GIBELIN , Docteur en Médecine , Membre
de la Société Médicale de Londres , &c. &c.*

AVEC DES PLANCHES EN TAILLE-DOUCE.

SEPTIÈME PARTIE.

MÉDECINE ET CHIRURGIE,

Par M. PINEL, Docteur en Médecine.

A P A R I S ;

Chez BUISSON, Imprimeur - Libraire,
rue Hautefeuille, n°. 20.

1 7 9 1.



1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

AVANT-PROPOS.

LA Médecine & la Chirurgie auroient peut-être toujours tenu le premier rang parmi les sciences naturelles, si elles avoient été traitées avec la même solidité qu'elles le sont dans les Transactions philosophiques. Elles y offrent en général la marche rigoureuse de l'observation, quoique tous les articles ne soient pas également intéressans à recueillir, & qu'il ait fallu faire un choix, soit à cause des progrès postérieurs qu'a faits l'art de guérir, soit parce qu'ils ne renferment pas tous des vérités également utiles. Mais ils sont en général précieux, parce que les auteurs se sont bornés à de simples relations de faits & aux conséquences qu'on doit en tirer pour la pratique, sans aller s'égarer dans des théories vagues ou des vues systématiques.

J'ai d'abord coordonné ensemble plu-

a iij

vj *A V A N T - P R O P O S.*

fleurs relevés de registres sur des calculs
 de mortalité; ce qui est encore une branche
 de la médecine très-peu cultivée en France,
 & qui mérite singulièrement de l'être par
 ses rapports avec la politique & la théorie
 des annuités. Quoiqu'on ait beaucoup écrit
 sur l'inoculation de la petite vérole, il faut
 cependant convenir que les médecins qui
 se sont livrés presque exclusivement à cette
 branche ont été bien plus soigneux de la
 surcharger de pratiques frivoles ou même
 de porter à l'excès la méthode des rafraî-
 chissans qu'à faire faire des progrès réels à
 cette coutume prise des Orientaux. Comme
 les Anglois ont été les premiers à l'adopter,
 & qu'ils en ont constaté les avantages
 par des relations rigoureuses des faits, j'ai
 cru devoir rapporter celles qui ont été
 consignées dans les Transactions philoso-
 phiques. On pourra juger par-là combien
 des auteurs plus récents se sont éloignés
 de la simplicité des vrais observateurs, sans
 ajouter presque rien à leurs principes,
 qu'une exagération vaine & souvent toutes
 les minuties du charlatanisme.

La description de la peste qui régna vers 1758, à Constantinople, étoit trop intéressante pour qu'on n'en rapportât pas tous les détails. J'ai cru aussi devoir faire connoître plusieurs particularités sur la dernière peste de Marseille, soit relativement à ses symptômes, par rapport à l'ouverture des corps : il y a sur-tout des faits comparatifs qu'il étoit très-intéressant de recueillir ; puisqu'ils font connoître les caractères distinctifs qui existent entre la peste & une fièvre maligne. On n'a qu'à voir en effet combien la bile prise du cadavre des pestiférés, & celle des personnes mortes de fièvres malignes produisent des effets différens sur les animaux, & on ne sera plus de l'avis de certains auteurs de médecine qui classent la peste parmi les fièvres malignes.

Je ne puis pas parcourir ici toutes les autres maladies qu'on trouve dans ce volume, & dont on peut facilement se former une idée, d'après la simple lecture de la

table; je ferai seulement une remarque sur la disposition des matières à qui on pourroit reprocher quelquefois un défaut de régularité & d'ordre. Il semble en effet qu'on ait rapporté à la médecine, des objets de chirurgie & *vice versâ*. Mais ne fait-on point que ces deux parties de l'art de guérir qui sont très-distinctes dans certains articles, sont souvent tellement confondues dans d'autres, qu'il est difficile de décider s'il s'agit plutôt de l'une que de l'autre. J'ai rapporté, par exemple, une blessure de la vésicule du fiel qui a produit des symptômes internes très-singuliers, & tels qu'en les rapprochant du résultat de l'ouverture du corps, on en peut naturellement déduire, non-seulement des conséquences très-utiles pour la pratique des maladies internes, mais encore des vues très-saines de physiologie sur l'usage de la bile dans l'économie animale.

Quoique la lithotomie, ou plutôt la cystotomie, par le haut appareil & l'appareil

AVANT-PROPOS. ix

latéral soit tombée en désuétude, cependant j'ai cru devoir rapporter deux ou trois observations sur cette opération, soit pour faire connoître avec quelle lenteur l'esprit humain s'élève aux méthodes directes & simples, soit pour montrer qu'il peut encore y avoir des circonstances qui peuvent faire donner la préférence à ces méthodes moins récentes. J'ai cru surtout ne devoir point omettre deux questions proposées par M. Douglas, sur un moyen à substituer à l'opération de la lythotomie, lorsque les circonstances où se trouveroit l'individu ne pourroient nullement permettre d'attendre un plein succès de l'opération. Elles paroissent dictées par les principes les plus sains de la chirurgie.

Il seroit superflu de s'étendre ici en particulier sur plusieurs cas de pratique chirurgicale qui sont rapportés dans ce volume, sur les blessures, les tumeurs, les fractures ou les luxations: ils méritent d'être médités.

■ A V A N T - P R O P O S.

puisqu'ils réunissent à l'avantage d'offrir des vérités utiles celui d'être exposés avec une rigoureuse précision & une sagesse qui doivent servir de modèles ; combien en effet parmi les observations analogues que rapportent les auteurs, en peut-on citer dont on puisse faire le même éloge ?

On me saura peut-être gré de n'avoir point omis les moyens chirurgicaux employés par les sauvages de la Virginie : quelque caractère qu'ils portent de rudesse & d'une simplicité grossière, ils font voir les ressources que la nature suggère à ces malheureux Indiens pour remédier aux accidens de la vie, & ils sont propres à faire sortir des routes battues de la routine qui a si souvent consacré des procédés nuisibles.

Je donne à la fin de ce volume des notices plus ou moins étendues sur divers articles de l'art de guérir qui n'ont pu être insérés en entier dans cet abrégé. Elles

AVANT-PROPOS. 27

Sont également instructives par les matières qui en font l'objet, & par les nouvelles vues qu'elles peuvent suggérer. Quelques-unes paroissent même, par leur étendue, s'éloigner des bornes que le simple titre de notice semble annoncer; mais leur importance doit faire pardonner cette espèce d'écart, qui d'ailleurs a un avantage qu'on ne peut se dissimuler, puisque les divers objets de médecine & de chirurgie deviennent le plus souvent incomplets, lorsqu'on en retranche les circonstances qui servoient à les déterminer d'une manière exacte & précise.

Dans les volumes de matière médicale du présent abrégé, on a donné des extraits de quelques articles qu'il suffisoit d'indiquer, mais qui étoient incomplets, considérés relativement à l'art de guérir; tel est par exemple l'emploi de l'eau froide dans les fièvres. J'ai cru donc devoir revenir sur deux ou trois de ces articles pour en bien détailler les indications, & pour faire bien

xi) *AVANT-PROPOS:*

connoître les cas précis de l'emploi de certains remèdes. On sent en effet qu'indiquer simplement un remède & déterminer les cas précis de son emploi sont deux objets différens, & que si l'un appartient proprement à la matière médicale, l'autre est du ressort de l'art de guérir pris dans toute son étendue.



T A B L E

*DES chapitres contenus dans ce volume de
Médecine & de Chirurgie.*

M É D E C I N E.

SECTION PREMIÈRE.

Calculs sur la population.

A R T I C L E P R E M I E R.

OBSERVATIONS sur les calculs de mortalité de la ville d'York; par M. G. White; pages 1

ART. II. Supplément à un écrit qui a pour titre : Observations sur la population de Manchester; par M. Thomas Percival, 11

ART. III. Sur l'accroissement & la mortalité des habitans de l'Isle de Madère, par M. Thomas Heberden, 18

ART IV. Calculs sur la mortalité de l'année 1723, pris des mémoires de Breslaw, 22

ART. V. Lettre au R^{ev.} Guillaume Brakentidge, concernant le terme & la période de la vie

humaine, dans laquelle les inégalités dans la construction des tables de Breslaw sont pleinement prouvées, &c.; par M. T. W. A. M. pages 26

ART. VI. *Description de la peste de Constantinople en l'année 1764; 33*

SECTION II.

Maladies organiques.

ART. I. *Extrait d'une lettre du docteur Kinneir; sur l'efficacité du camphre contre la manie, 55*

ART. II. *Cas remarquable & traitement d'une femme d'où on a tiré un fœtus qui avoit resté treize ans dans une des trompes de fallope; par le docteur Monsey, 68*

ART. III. *Muet qui recouvre l'usage de la langue par le moyen d'un songe effrayant; par M. Squire, 78*

ART. IV. *Extrait d'une lettre de M. Acry, sur les particularités de la cure d'une blessure de la cornée & une lacération de l'uvée, 81*

ART. V. *Remarques faites sur l'état du cerveau de trois personnes mortes d'épilepsie; par M. W. Rhoti, 85*

ART. VI. *Gros calcul rendu par les voies urinaires d'une femme; 87*

DES ARTICLES. ❧

- ART. VII.** *Perforation contre nature trouvée dans la partie supérieure de l'estomac, avec les symptômes qui en avoient été la suite; par M. C. Rawtinson,* pages 91.
- ART. VIII.** *Calcul trouvé dans l'urètre,* 94
- ART. IX.** *Nombreux calculs rendus par l'usage des eaux de Pyrmont; par M. A. Vater,* 97
- ART. X.** *Ouverture du corps d'une personne qui avoit éprouvé des affections calculeuses; par M. P. Williams,* 99
- ART. XI.** *Conformation remarquable des voies urinaires; par M. J. Budgen.* 101
- ART. XII.** *Accouchement contre nature d'un fœtus par l'anus; par M. Nourse,* 102
- ART. XIII.** *Histoire d'une femme qui avoit une structure singulière des parties génitales, & qui cependant mit au monde un fœtus; par M. Olivier,* 105
- ART. XIV.** *Hydatides trouvées en grande quantité dans l'abdomen d'un ascitique; par M. J. Thorpe,* 108

SECTION III.

Maladies cutanées.

- ART. I.** *Procédé de l'inoculation de la petite vérole dans la nouvelle Angleterre; par M. Henri Newman,* 112

- ART. II. *Lettre de M. Nettleton, médecin à Halifax, dans le comté d'York, pages* 114
- ART. III. *Lettre du même M. Nettleton sur les progrès de l'inoculation de la petite vérole, 128*
- ART. IV. *Exemple remarquable de l'infec tion de la petite vérole; par M. Jurin, 131*
- ART. V. *Extrait de deux lettres sur une méthode de procurer la petite vérole, en usage dans la partie méridionale du pays de Galles; par M. Williams, 135*
- ART. VI. *Extrait d'une lettre du docteur Nettleton, à M. Jurin, sur l'inoculation de la petite-vérole & sur la mortalité de la petite-vérole naturelle, 137*
- ART. VII. *Lettre du docteur Caleb Cotchworth, sur le danger de la petite-vérole naturelle comparé à celui de la petite vérole inoculée, 141*

SECTION IV.

Des fièvres & autres maladies.

- ART. I. *De l'usage de l'eau froide dans les fièvres; par M. Cyrille, 150*
- ART. II. *Extrait d'une lettre écrite de Tunis par M. Shaw, sur les fièvres intermittentes qui règnent à Tunis, & sur les moyens de les guérir, 162*
- ART. III. *Résultat de l'ouverture du corps de plusieurs*

DES ARTICLES. xvii

plusieurs pestiférés qui périrent à Marseille avec la description des symptômes dont ils avoient été attaqués, & des expériences faites avec leur bile; par M. Woodward, pages 164

ART. IV. *Essai sur l'usage de la bile dans l'économie animale, fondé sur une observation d'une blessure dans la vésicule du fiel; par M. A. Stuard, 178*

ART. V. *Observations sur certains usages médicaux de l'arbre de la canelle; par M. Albert Seba, 195*

ART. VI. *Mouvemens convulsifs guéris par une grande évacuation des vers; par M. R. Oram, 200*

ART. VII. *Relation de deux cas extraordinaires de pierres biliaires; par M. J. Johnstone, 204*

ART. VIII. *Rapport d'une maladie qui eut lieu lors d'une assemblée de jurés à Oxford l'année 1577; par M. J. Ward, 214*

ART. IX. *Rapports de quelques effets extraordinaires causés par des convulsions; par M. G. Watson, 218*

ART. X. *Rapport d'un examen fait de certains lépreux à l'île de la Guadeloupe; par M. And. Peysonel, 222*

ART. XI. *Exemple extraordinaire de l'efficacité du quinquina contre un cas de délire febrile; par M. Munckley, 234*

ART. XII. *Relation d'une maladie extraordinaire*
Tome II. Chirurgie. b

- de l'œil ; par M. D. Layard , pages 238
 ART. XIII. *Observations sur les affections spasmodiques occasionnées par des vers ; par M. Wall ,*
 245
 ART. XIV. *Observations sur l'origine & l'usage des vaisseaux lymphatiques des animaux ; par M. Akenfide ,*
 254

S E C O N D E P A R T I E .

Chirurgie.

SECTION PREMIERE.

Lithotomie.

- ART. I. *Deux questions chirurgicales avec la réponse de M. Douglas ,* 269
 ART. II. *Description d'une nouvelle méthode de pratiquer la lithotomie ; par M. Douglas ,* 277
 ART. III. *Exemple remarquable de quatre calculs raboteux qui ont été trouvés dans la vessie urinaire d'un homme , contre ce qu'on avoit lieu d'en attendre , & qui ont été heureusement extraits par l'opération latérale ; par M. J. Warner ,* 283
 ART. IV. *Observation remarquable d'une opération de la taille par une nouvelle méthode qu'on appelle l'appareil latéral ; par M. G. Cheselden ,* 288

DES ARTICLES. xix

- ART. V. *Observation sur une opération de la saillie faite par le haut appareil ; par M. Lecat,*
pages 292

SECTION II.

Des blessures.

- ART. I. *Exemple de l'intestin ileum blessé par un coup de couteau & traité avec succès ; par M. P. Travers,* 296
- ART. II. *Cas remarquable d'un anévrysme ou d'une maladie de l'artère fémorale causée par une chute. On y a ajouté des réflexions sur l'incertitude des symptômes qui caractérisent cette maladie ; par J. Warner,* 300
- ART. III. *Extrait d'une lettre de M. J. Field, sur deux cas de blessures dans l'estomac,* 308
- ART. IV. *Extrait d'une lettre de M. Derante, sur une perte de l'omoplate & de la tête de l'humérus,* 311
- ART. V. *Description d'un instrument de nouvelle invention pour la fracture des jambes, consistant dans deux atelles, l'une supérieure & l'autre inférieure,* 313
- ART. VI. *Exposition d'une hydro-enterocèle qui ressembloit à un hydrosarcocèle, & qui se termina par la mort du malade, par M. Lecat,* 317.

SECTION III

Sur quelques opérations de Chirurgie

- ART. I. *Observations sur le spina ventosa; par*
M. Amyand, pages 318
- ART. II. *Lettre de M. Georges Martin, sur*
l'opération de la bronchotomie, telle qu'on la
pratique à l'hôpital Saint-André. 334
- ART. III. *Extrait d'une lettre de M. Antoine*
Benevoli, chirurgien de Florence, au docteur
Valsalva, 341
- ART. IV. *Tumeur extraordinaire venue au genou*
d'une personne dont la jambe fut amputée; par
M. Pierce, 344
- ART. V. *Observations de chirurgie sur la production*
du calus; par M. Sherman, 347
- ART. VI. *Blessure faite à la cornée de l'œil droit,*
heureusement guérie; par M. Baker, 350
- ART. VII. *Fièvre maligne contractée en faisant*
l'opération de la paracentèse sur le cadavre d'une
personne morte d'hydropisie; par M. Cox, 352
- ART. VIII. *Tumeur extraordinaire à la cuisse &*
sa description; par M. J. Chandler, 355
- ART. IX. *Cure remarquable d'une blessure de la*
tête compliquée d'une grande fracture & d'une
dépression du crâne, avec perte d'une partie de

DES ARTICLES. xij

- la dure-mère & du cerveau ; par M. J. Cagua,*
pages 358
- ART. X. *Remèdes & moyens chirurgicaux employés par les sauvages de la Virginie ; par M. Clayton ,*
364
- ART. XI. *Nouvelle méthode de traiter la fistule lacrymale ; par M. W. Blizard, .*
378
- ART. XII. *Calculs sur le nombre des accidens ou des morts qui surviennent à la suite de l'accouchement , & de la proportion des enfans mâles à ceux de l'autre sexe , aussi bien que des jumeaux , des productions monstrueuses & des fœtus nés morts ; par M. Robert Bland, 385*
- ART XIII. *Exemple d'une femme qui a eu la petite-vérole durant sa grossesse , & qui paroît avoir communiqué la même maladie au fœtus qu'elle portoit ; par M. J. Hunter. 407*
- ART. XIV. *Exemple d'un enfant qui eut la petite-vérole dans le sein de sa mère ; par M. Wright, 412*
- ART. XV. *Ossification du conduit thorachique ; par M. Cheston, 414*
- ART. XVI. *Luxation complete de l'os de la cuisse , dans un adulte , par une violence extérieure ; par M. Charles White , 427*
- ART. XVII. *Autre exemple d'une luxation complete de l'os de la cuisse ; par M. C. Young, 431*
- ART. XVIII. *Opération remarquable faite sur un bras fracturé ; par M. Charles White, 440*

- ART. XIX. Exemple d'un jeune homme qui avoit perdu l'usage de ses mains en nettoyant du fil de laiton; par M. S. More. pages 444
- ART. XX. Os trouvé dans le bassin d'un homme à Bruxelles; par M. Brady, 449
- ART. XXI. Lettre de Thomas Wolcombe, sur une plaie d'arme à feu qui devint mortelle. 451
- ART. XXII. Extrait d'une lettre de M. Latham, à M. Warner, 457
- ART. XXIII. Cas extraordinaire d'une dame qui avoit avalé de l'euphorbe; par M. Willis de Lincoln. 560

Notices des articles de médecine & chirurgie qui n'ont pu entrer dans ce volume.

- ART. I. Exemple peu ordinaire d'une hémoptisie; par Darwin, M. D. 469
- ART. II. Extrait d'une lettre avec quelques détails sur la tarentule; par M. D. Cirillo, 472
- ART. III. Abscess au foie avec des calculs dans la vésicule du fiel & la réunion des reins; par M. Edw. Tyson, 474
- ART. IV. Examen anatomique du corps d'une dame morte d'une attaque d'apoplexie; par M. G. Cole, 475
- ART. V. Exemple d'une paralyse périodique; par M. Musgrave, 476

DES ARTICLES. xliij

ART. VI. Convulsion invétérée des muscles du cou;
par M. Tuberville, pages 477

ART. VII. Exemple d'un homme qui ne devenoit
aveugle que le soir après le coucher du soleil;
par M. Parham, ibid.

ART. VIII. Duplicité de la vision & goutte sereine
survenue après de grandes douleurs de tête &
des convulsions; par M. Briggs, 478

ART. IX. Expérience sur la surdité; par M. Holder,
ibid.

ART. X. Exemple d'un polype du nez; par
M. Giles, 479

ART. XI. Preuves en faveur de l'usage de la
laryngotomie; par M. G. Musgrave, 480

ART. XII. Exemple d'un polype des poumons;
par M. Buffiere, 481

ART. XIII. Cure infaillible de la dyssenterie; par
M..... 482

ART. XIV. Mouvemens des maladies, naissances
& morts des animaux dans différentes époques
du jour naturel; par M. Paschal, 483

ART. XV. Espèce de rumination; par M. F.
Slare, 484

ART. XVI. Sur la réunion du corps de deux
fœtus; par M. Parsons, 486

ART. XVII. Description d'un monstre de l'espèce
humaine, dans deux lettres; observations com-
muniquées à M. Banki, 491

xxiv TABLE DES ARTICLES.

- ART. XVIII. *Maladie très-grave du rein ; par*
M. Coussper , pages 492
- ART. XIX. *Vers lombricaux & cucurbitains ; par*
M. Lyster. Le lumbricus latus ; par M. Ed.
Tyson. Le lumbricus teres ; par M. Tyson.
Remède contre les vers très-vanté ; par M. Moyern.
Vers trouvés dans différentes parties du corps ;
par M. Dent , 494
- ART. XX. *Tumeur stéatomateuse extraordinaire*
dans l'abdomen d'une femme ; par M. Hanly ,
 496
- ART. XXI. *Changement singulier qu'a éprouvé*
un ovaire humain dans sa structure ; par
MM. Baillie , 499

Fin de la Table des Articles.

ABRÉGÉ



A B R É G É
DES TRANSACTIONS
PHILOSOPHIQUES,

MÉDECINE ET CHIRURGIE.

PREMIÈRE PARTIE.
M É D E C I N E.

SECTION PREMIÈRE.

*Calculs sur la population & maladies épidé-
miques.*

ARTICLE PREMIER.

*Observations sur les calculs de mortalité de la ville
d'York ; par M. G White, Docteur en Méde-
cine & Membre de la Société Royale, lues
le 6 Décembre 1781.*

DES relevés exacts & fidèles du nombre des
naissances & des morts ; pris dans divers lieux, sont
Tome I. Médecine. Chirurgie. A

Année 1782.
Vol. XXII.

Année 1783.
Vol. LXXII.

d'une grande importance pour la chose publique. L'homme d'état, le philosophe & le médecin doivent également s'intéresser à des recherches qui nous démontrent infailliblement l'état réel de la nation quant à sa population, sa salubrité & ce qui en est une suite, sa vertu & sa tempérance.

Ce doit être un grand plaisir pour un homme qui réfléchit, que de reconnoître par des preuves incontestables que la nation Angloise paroît être sous ces différens points de vue dans un état général & progressif de prospérité. Les naissances sont devenues plus nombreuses, & les morts ont été moins fréquentes en proportion, presque dans tous les lieux où on a consulté les registres. Je puis renvoyer en preuve de ces assertions à ce qui a été rapporté dans les Transactions Philosophiques vol. LVII, LIX, LXI, LXIV, LXV, &c. & à l'ouvrage de M. Wales qui a pour titre : *Recherches sur l'état présent de la population dans l'Angleterre & le pays de Galles.*

Il ne seroit peut-être pas difficile, & comme médecin je me livrerai avec plaisir à ces recherches, de découvrir les diverses causes auxquelles on peut rapporter ces effets; mais il s'ouvre là une carrière immense. Il sera cependant nécessaire d'indiquer ce qui peut être particulier à cette ville, dans la suite de ce mémoire.

M. Drake, membre de la Société Royale,

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 3

dans ses antiquités de la ville d'York, nous a
 donné le nombre des naissances & des enterre-
 mens pour sept années, depuis le 5 Août 1728
 jusqu'au 5 Août 1735 inclusivement, c'est ce
 qui me fournit une occasion favorable de com-
 parer notre état présent après une période de
 45 années. C'est dans cette vue que les registres
 des paroisses ont été soigneusement consultés depuis
 le 1^{er} Janvier 1770 jusqu'au 31 Décembre 1776
 inclusivement. J'ai ajouté les nombres respectifs
 des personnes de l'un & de l'autre sexe, ce que
 M. Drake a omis de faire.

Année 1782.
 Vol. LXXII.

La première table de M. Drake qui comprend
 les naissances & les enterremens de la ville
 d'York, depuis le 5 Août 1728 jusqu'au 5 Août
 1735, rapporte la liste des paroisses, & il en
 résulte pour la totalité des naissances 2803 &
 pour celle des enterremens 3488. Le nombre de
 ces dernières excède par conséquent dans sept ans
 celui des naissances de 685, ce qui fait annuelle-
 ment 95.

La seconde table, en rapportant aussi la liste des
 paroisses de la même ville, comprend le nombre des
 naissances & des enterremens depuis le 1^{er} Janvier
 1770 jusqu'au 31 Décembre 1776 inclusivement,
 & il se trouve que dans cet intervalle de tems
 le nombre des naissances s'est porté à 3323, &
 celui des enterremens à 3175; d'où il résulte

A ij

4 ABRÉGÉ DES TRANSACT. PHILOS.

Année 1782.
Vol. LXXII.

que les naissances dans sept ans ont excédé les enterremens de 148 ou de 21 par année moyenne. En comparant maintenant les deux tables on voit que les enterremens de cette dernière période ont diminué de 313 ou de $44 \frac{1}{7}$ par année moyenne. Les naissances ont aussi augmenté respectivement de 520, ou de $74 \frac{2}{7}$ par année.

TABLE III. *Nombre des naissances & des enterremens, avec la proportion des hommes & des femmes annuellement, depuis le 1^{er} Janvier 1770 jusqu'au 31 Décembre 1776.*

Années.	Naissances.	Mâles.	Femelles.	Enterremens.	Mâles.	Femelles.
1770	467	237	230	417	203	214
1771	451	225	226	485	215	260
1772	490	238	252	508	210	288
1773	474	244	232	499	241	258
1774	453	214	239	382	173	209
1775	490	255	243	488	237	251
1776	498	255	243	396	177	219
	3313	1666	1657	3175	1476	1699

Nombre des mâles nés en sept années, 1666 ou 238 par année.

Nombre des mâles enterrés en sept années; 1476 ou $210 \frac{6}{7}$ par année.

MÉDECINE ET CHIRURGIE: 5

Nombre des filles nées en sept années, 1657
ou $236 \frac{4}{7}$ par année.

Année 1781;
Vol. LXXII.

Nombre des femmes ou filles enterrées en
sept années, 1699 ou $242 \frac{5}{7}$ par année.

TABLE IV. *Mortalité suivant l'ordre des saisons:*

<i>En Hiver.</i>	<i>Au-Printemps.</i>	<i>Été.</i>	<i>Automne.</i>
Janv. 310	Avril 277	Juillet 110	Octob. 237
Fév. 282	Mai 265	Août 137	Nov. 230
Mars 316	Juin 274	Sept. 225	Dec. 292
<u>918</u>	<u>816</u>	<u>682</u>	<u>759</u>

POUR trouver le nombre des habitans dans les villes, où, soit pour l'étendue, soit pour d'autres raisons, on ne peut parvenir à un calcul numérique, on peut employer deux méthodes; la première est de multiplier le nombre des maisons par le terme moyen des habitans de chacune; le second qui est recommandé par M. Mohean, dans un ouvrage qui a pour titre : *Recherches & Considérations sur la Population de la France*. Il trouve par des calculs très-pénibles que le nombre des habitans peut être connu par celui des naissances, le dernier étant le vingt-septième du premier.

Par un exposé communiqué à la Chambre des Communes en Mars 1781, le nombre des maisons

Année 1782.
Vol. LXXII.

d'York soumises à la nouvelle taxe fut de 1285 : si on ajoute à cela celles qui sont trop petites pour être sujettes à la taxe & qu'on peut faire monter avec assez de probabilité à un tiers de plus, le nombre total des maisons d'York sera d'environ 3000. Ce nombre multiplié par $4\frac{1}{4}$ qui est à peu près le terme moyen des personnes qui habitent chaque maison, on aura à peu près 12,798 pour le nombre des habitans.

Par la seconde nous avons 12798 pour le nombre des habitans, ce qui est le résultat de 474, compte des naissances annuelles multiplié par 27.

La coïncidence remarquable des deux précédentes méthodes de supputation rend très-probable que si on porte le nombre des habitans à 12800, on s'éloigne très-peu de la vérité.

Toutefois quel que puisse être le nombre des habitans, il ne peut influer sur l'objet principal de mes recherches qui est de montrer combien nous avons fait de progrès relativement à la population & à la salubrité depuis 40 ans.

Pour le prouver nous n'avons qu'à chercher le nombre des habitans durant l'année 1735 par la première table, nous trouverons que les naissances annuelles se portoient à 400. Ce nombre multiplié par 27 donne 10,800 pour le nombre des habitans à cette époque. Ce nombre divisé par celui des morts annuelles 498, donne la proportion d'un

sur 21 $\frac{1}{4}$. Tel étoit l'état de mortalité des habitans de cette ville il y a 46 ans.

Année 1782.
Vol. LXXII.

Ce résultat est très-différent de notre position actuelle, puisque la proportion des morts est maintenant d'un sur 28 $\frac{1}{4}$, qui est le quotient de 12,800, nombre des habitans, divisé par 453, nombre actuel des morts annuelles. C'est là certainement avoir fait de grands progrès relativement à la salubrité. Loin que notre ville offre un séjour aussi peu salubre que Londres, elle a encore un avantage marqué sur plusieurs endroits des campagnes, comme on pourra le reconnoître par un examen comparatif de la proportion des morts dans divers lieux.

A Vienne la mortalité est chaque

année.	d'un sur 19 $\frac{1}{2}$
A Londres.	1 sur 20 $\frac{3}{4}$
A Edimbourg.	1 sur 20 $\frac{2}{3}$
A Berlin.	1 sur 21
A Rome.	1 sur 22
A Amsterdam.	1 sur 22
A Dublin.	1 sur 22
A Leeds.	1 sur 22
A Northampton.	1 sur 26
A Shrewsbury.	1 sur 26
A Liverpool.	1 sur 27 $\frac{7}{13}$
A Manchester.	1 sur 28
A York.	1 sur 28 $\frac{1}{4}$

A iv

Année 1781.
Vol. LXXII.

On voit par-là qu'en 1735 il auroit fallu 21 années & trois quarts pour enterrer un nombre égal à celui des habitans; mais qu'en 1775 il auroit fallu 28 ans & un quart pour qu'ils eussent tous péri, si les générations ne s'étoient point renouvelées. Il en périt maintenant un tiers de moins que dans l'autre période de tems, & nous faisons de jour en jour des progrès, puisqu'en 1777 la proportion des naissances a été encore plus considérable, & que le nombre s'en est porté à 516, pendant qu'il n'y a eu que 464 enterremens.

Comme il n'y a point ici de manufacture établie; il y a peu d'accroissement ou de décroissement du nombre des habitans à raison des acquisitions ou des émigrations, & probablement ce qui peut arriver dans un cas, est contrebalancé par l'autre.

Il paroît, d'après la table quatrième, que l'été est à Yorck la saison la plus salubre, que l'automne vient après, ensuite le printems & que l'hiver est le plus funeste. Le docteur Percival a trouvé le même résultat à Manchester. A Chester; le docteur Haygarth remarque que le mois de Novembre est le moins sain. Les différences des registres empêchent de rapporter les maladies dont périssent les individus; cependant on en peut prendre une idée générale d'après la même table. Les soins & l'attention que donne à cet objet l'archevêque de la province, rendront des résultats plus exacts pour l'avenir.

Il paroît que routes les maladies qui regnent dans cette ville sont d'une nature inflammatoire, & les medecins savent que les maladies de cette espèce sont surtout propres à l'hiver & au printems. Celles de l'été & de l'automne viennent plus particulièrement de putrescence & d'acrimonie, comme des fièvres remittentes, des dysenteries, des *colera-morbus* & autres affections semblables. Le docteur Wintringham nous a donné des observations sur la température des saisons, avec leurs maladies correspondantes dans la ville d'Yorck pendant seize années successives. C'est dans son *Commentarium Nosologicum* qu'il les a consignées, & c'est à cet écrit que je renvoie le lecteur curieux.

Année 1781
Vol. LXXII.

Parmi les causes générales de l'accroissement de notre population & de notre salubrité nous pouvons compter l'inoculation ; les progrès qu'on a faits aussi dans le traitement & la cure de plusieurs maladies ; le regime rafraichissant dans les fièvres, l'admission d'un air frais, l'usage général des antiseptiques & de la diète, ont eu une influence étendue & salutaire sur la vie des hommes, & ont beaucoup diminué la malignité de quelques-unes de nos maladies les plus dangereuses. On peut ajouter à cela des principes plus sûrs & une plus grande attention à l'éducation des enfans.

On peut joindre à ces causes générales de salu-

Année 1781.
Vol. LXXII.

brité celles qui sont locales & propres à la ville d'York & qui ont été encore plus favorables ces dernières années. Les rues ont été élargies dans plusieurs endroits, en abattant un grand nombre de vieilles maisons qui se rapprochoient tellement par leurs étages supérieurs, que l'air & le soleil ne pouvoient pénétrer dans les rues & les appartemens bas. La ville a été nouvellement pavée; on y a pratiqué des tranchées pour l'écoulement des eaux, & par la méthode actuelle de conduire l'eau de la pluie, les maisons sont devenues moins humides & plus propres qu'elles n'étoient auparavant. La construction des digues, environ quatre milles au-dessous de la ville, a produit de grands avantages; car avant cela la rivière étoit souvent très-basse & laissoit de grandes quantités de vase & de boue au cœur de la ville, ainsi que les saletés des égoûts que les eaux ne pouvoient entraîner. La digue a prévenu ces inconveniens pour l'avenir, la rivière se conservant par ce moyen haute, large & spacieuse, & on a contribué ainsi à la salubrité aussi bien qu'à la beauté de la ville d'York. Dans ces établissemens ainsi que dans ceux qui sont projetés, dans les soins & les dépenses nécessaires pour l'entretien des promenades publiques autour de la ville, les magistrats ont déployé un grand amour du bien public & ils ont contribué à la santé & aux commodités des habitans.

ARTICLE II.

Supplément à un écrit qui a pour titre : Observations sur la population de Manchester; par M. Thomas Percival, Docteur en Médecine & Membre de la Société Royale.

IL paroît par les relevés du nombre des garçons & des filles baptisés en divers lieux (1), que la proportion des premiers est par rapport aux autres à peu près comme 13 à 12, suivant le calcul de M. Desham; mais dans d'autres listes qui ont succédé le nombre des filles vivantes excède beaucoup celui des garçons dans un grand nombre de lieux, & le nombre des veufs est presque double du nombre des veuves.

Année 1776.
Vol. LXVI.

Table comparative du nombre des hommes & des femmes dans différentes villes.

<i>Villes.</i>	<i>Hommes.</i>	<i>Femmes.</i>
Manchester.	10548 . . .	11933
Salford.	2248 . . .	2517
Dans la juridiction de la même ville.	947 . . .	958

(1) Voyez le Vol. XLV. des Transactions Philos.

12 ABRÉGÉ DES TRANSACTIONS PHILOS.

Année 1776, Vol LXVI.	Villes.	Hommes.	Femmes.
	Paroisse de Manchester. .	6942 . .	6844
	Bolton.	2159 . .	2392
	Little Bolton.	361 . .	410
	Monton.	196 . .	190
	Hale.	140 . .	136
	Horwich.	149 . .	136
	Darwen.	900 . .	950
	Cockey.	320 . .	391
	Chowbent.	554 . .	606
	Ackworth.	340 . .	388
	Eastham.	451 . .	461
	Chinley.	181 . .	168
	Brownside.	40 . .	47
	Busgworth.	80 . .	95
	Asthon under Line. . .	1406 . .	1453
	Paroisse d'Arthon. . .	2584 . .	2513
	Paroisse de Tattenhal. .	382 . .	399
	Paroisse de Waverton. .	310 . .	332
		31238	33339

TABLE comparative du nombre des veuves & des veufs de différens lieux.

Lieux	Veuves.	Veufs.
Manchester.	432 . .	1064
Salford.	89 . .	149
Jurisdiction de la même ville.	21 . .	42

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 13

<i>Lieux.</i>	<i>Veuves.</i>	<i>Veufs.</i>	Année 1776 Vol. LXVI.
Paroisse de Manchester. :	232 . .	315	
Monton.	14 . .	13	
Hale	8 . .	12	
Horwich.	9 . .	8	
Darwen.	30 . .	48	
Cockey.	10 . .	27	
Chowbent.	26 . .	43	
Chinley, Brownside, Bugf- worth.	15 : :	18	
Asthor Under Line. . :	50 . .	81	
Paroisse de la même ville. .	67 . .	95	
	1003	1915	

Ne peut-on point tirer des preuves contre la polygamie d'après ces tables? Cet usage est brutal, destructeur de toute amitié & de tout sentiment moral; il est opposé au vrai but du mariage qui est l'éducation des enfans, & il renverse les droits naturels de plus de la moitié du genre humain. Cette tyrannie de l'homme sur le sexe le plus foible & le plus aimable n'est point favorable à la population; car quoique le nombre des femmes vivantes puisse excéder beaucoup celui des hommes, cependant il y a encore plus d'hommes capables de propager leur espèce, qu'il n'y a de femmes propres à faire des enfans. L'accouchement devient de

Année 1776.
Vol. LXVI.

plus en plus dangereux & moins fréquent à mesure que la roideur des fibres augmente, & cette faculté cesse entièrement à cinquante ans; c'est ainsi que son issue funeste est prévenue, & que les consolations d'une vie sur le déclin ne sont point interrompues par la tâche pénible de l'allaitement. Une institution par conséquent qui met dans la servile dépendance d'un usurpateur plusieurs femmes qui sont dans la fleur de l'âge, en doit laisser un grand nombre destitué des moyens que la nature leur a accordés pour perpétuer & augmenter l'espèce humaine. Et c'est un fait bien connu que l'Armerie dans laquelle la pluralité des femmes n'est point permise, contient beaucoup plus d'habitans que toute autre province de l'empire Turc.

P. S. Depuis que l'écrit précédent a été communiqué, M. Craddock m'a envoyé un relevé pris dans la ville & la paroisse d'Ashton à huit milles de Manchester. Les habitans consistent en manufacturiers & en fermiers.

Recensement des habitans de la ville & de la paroisse d'Ashton Under Line, fait en 1775.

	Ville.	Paroisse.
Habitans.	2859	5097
Maisons.	553	241
Familles.	592	271

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 15

	Ville.	Paroisse.	Année 1776. Vol. LXVI.
Hommes.	1406	2584	
Femmes.	1453	2513	
Mariés.	982	1679	
Veuves.	50	67	
Veufs.	81	95	
Au-dessous de 5 ans.	509	896	
Depuis 5 jusqu'à 10 ans.	396	764	
Depuis 10 jusqu'à 20 ans.	541	1011	
Depuis 20 jusqu'à 50 ans.	1044	1832	
Depuis 50 jusqu'à 70 ans.	307	471	
Depuis 70 jusqu'à 90 ans.	62	73	

M. Peploe, chancelier du diocèse de Chester, m'a communiqué les relevés suivans, pris sur les paroisses de Waverton & Tattenhall, qui sont l'une & l'autre aux environs de Chester. Les habitans en sont fermiers & laboureurs.

*Recensement des habitans de Tattenhall, fait en
Août 1774, par M. Brice Storr.*

Maisons habitées.	148
Maisons inhabitées.	2
Chefs de famille.	176
Personnes âgées au-dessus de 14 ans.	462
Hommes & garçons.	382
Femmes & filles.	399

Année 1776.
Vol. LXVI.

Les baptêmes comptés pendant 10 ans & comparés avec les enterremens ont été dans la proportion suivante :

<i>Années.</i>	<i>Baptêmes.</i>	<i>Enterremens.</i>
1764	28	8
1765	21	9
1766	19	12
1767	29	11
1768	28	16
1769	24	15
1770	37	15
1771	30	9
1772	26	15
1773	38	20
	280	130

*Recensement des habitans de Waverton, fait en
Août année 1774, par M. Biffett, ministre de
cette paroisse.*

Maisons habitées.	109
Maisons inhabitées.	9
Chefs de famille.	116
Personnes au-dessus de l'âge de 14 ans.	406
Hommes & garçons.	310
Femmes & filles.	322
<i>Années.</i>	

<i>Années.</i>	<i>Baptêmes.</i>	<i>Enterremens.</i>	
1764	19	10	Année 1764. Vol. LXVI.
1765	26	2	
1766	17	7	
1767	18	10	
1768	22	10	
1769	17	7	
1770	20	8	
1771	23	9	
1772	18	12	
1773	13	9	
	193	84	

Dans un ouvrage estimable que j'ai souvent consulté, le docteur Price a donné plusieurs preuves convaincantes & mélancoliques de la décadence de la population de l'Angleterre. L'accroissement des grandes villes, les progrès du vice & de la débauche, les découragemens du mariage, la destruction des chaumières & autres causes ont eu l'influence la plus contraire à l'accroissement du genre humain. Mais il faut espérer que ces maux ne sont pas universels, & qu'il en peut même naître quelque bien pour arrêter leurs effets funestes. Il est certain que dans cette partie de l'Angleterre les habitans se multiplient avec rapidité, & quoique l'accroissement puisse être dû surtout aux re-

Année 1776.
Vol. LXVI.

crues tirées des autres campagnes, cependant l'état florissant de nos manufactures ne peut manquer d'accroître notre population, en fournissant des moyens abondans de subsistance aux pauvres. L'évêque de Chester m'instruit que dans divers registres de paroisses qui ont été consultés, les naissances sont devenues progressivement plus nombreuses de génération en génération. A Boxley, dans le comté de Kent, où l'évêque a été jadis vicaire, il a divisé le tems écoulé depuis le commencement du règne d'Elizabeth, en périodes de 21 années, & il a trouvé que le nombre des naissances, dans la première période, a été de 310, & dans la dernière de 525. Cet accroissement a été progressif durant tout ce tems.

ARTICLE III.

Sur l'accroissement & la mortalité des habitans de l'Isle de Madère, par M. Th. Heberden, Membre de la Société Royale.

Année 1767.
Vol. LVII.

QUAND je considère le nombre des habitans de l'Isle de Madère & leur état, je n'en connois point de plus propre à former une évaluation de l'accroissement & de la mortalité de l'espèce humaine que cette Isle; car le nombre des habitans est à peu près de 60,000 & presque tous vivent & meurent dans ce même lieu où ils ont reçu l'existence; le trans-

port des étrangers & l'émigration des natutels y sont si peu considérables, que si l'un ne balance pas exactement l'autre, la différence peut-être négligée & ne peut influencer sur l'évaluation.

Année 1767.
Vol. LVII.

C'est ce qui a excité ma curiosité; & par les soins du vicaire général de ce diocèse, je me suis procuré un registre de maison en maison dans chacune des paroisses respectives; c'est de-là & des registres de la paroisse que j'ai déduit le calcul suivant.

Hypothèse.

Le nombre des personnes dans cette île, en l'année 1743, étoit de 48,234, à l'âge de 7 ans ou au-dessus; maintenant supposant que ceux qui sont au-dessous étoient alors dans la même proportion que dans la présente année, le total des habitans étoit de 53,057. Par conséquent, par une règle d'anatorisme, ils ont augmenté dans le rapport de 1,008 par cent chaque année, & par la même règle, ils ont doublé en 84 années 4 mois & 25 jours.

D'après un relevé exact pris au commencement de l'année 1767, le nombre des habitans de l'île de Madère est ce qui suit :

Personnes âgées de 7 ans ou au-dessus.	58669
Jeunes gens au-dessous de 7 ans. . .	5945

T O T A L . . 64614

B ij

26 ABRÉGÉ DES TRANSACT. PHILOS.

Année 1767. Vol. LVII.	Années.		Baptisés.		Enterrés.		Dans le voyage
			Garçons.	Filles.	Garçons.	Filles.	
	1759	1021	905	542	594	438	
	1760	1198	1111	643	713	421	
	1761	1035	1022	837	909	513	
	1762	1128	1125	662	704	491	
	1763	1118	1115	540	578	476	
	1764	1112	1085	620	705	469	
	1765	1183	1143	618	649	495	
	1766	1172	1138	506	531	462	
		8 67	8644	4968	5383	3765	

TOTAL 17611

10351

Personnes baptisées	Terme moyen pour
en 8 ans. 17611	chaque année. . 2201 $\frac{2}{3}$
enterrées	Terme moyen pour
en 8 ans. 10351	chaque année. . 1293 $\frac{2}{3}$
Augmentation oc-	Accroiss. annuel. 907 $\frac{2}{3}$
tennale. 7260	

Proportion des naissances annuelles,
 au nombre des habitans, comme 1 à 29,35
 des enterremens annuels,
 au nombre des habitans, comme 1 à 49,89
 des naissances, aux en-
 terremens, ... comme 100 à 58,77
 des garçons nés, aux filles, comme 100 à 96,39
 des filles ou femmes en-
 terrées, aux hommes, . . comme 108 à 100

M É D E C I N E. 21

Veuvages de chaque année, pour terme moyen, 470 $\frac{1}{2}$

Proportion des veuvages aux naissances, ... comme 1 à 4,68
des veuvages aux enterremens, ... comme 1 à 2,75

Année 1767;
Vol. LVII.

Mortalité des saisons.

Hiver.	Printems.	Été.	Automne.
Janv. 93	Avril 108	Juillet 129	Octob. 87
Fév. 84	Mai 105	Août 135	Nov. 111
Mars 132	Juin 120	Sept. 84	Dec. 84
309	333	348	382

LA mortalité du printems & de l'été est à celle de l'automne & de l'hiver, comme 115 à 100.

N. B. Cette évaluation de la mortalité des saisons n'est pas déduite de tout le nombre des habitans de l'île, parce que je n'ai pas pu me procurer des matériaux authentiques pour procéder avec exactitude; le nombre des personnes d'après lesquelles j'ai calculé est de 6880.



ARTICLE IV.

Calculs sur la mortalité de l'année 1723, pris des mémoires de Breslaw.

A B R E S L A W.

DEPUIS le 25 Décembre		Enterremens	
jusqu'au 31 du même mois.			
Année 1727.			
Vol. XXXV.			
Année 1772.	2		Le nombre des
Janvier 1723.	118		baptêmes pendant
Février.	114		la même année, a
Mars.	122		été de 1395; sur
Avril.	102		lesquels on a compté
Mai.	115		711 garçons & 684
Juin.	119		filles.
Juillet.	93		Il y eut 422 ma-
Août.	124		riages. Parmi les
Septembre.	124		morts on compta
Octobre.	85		220 hommes ma-
Novembre.	114		riés & 118 femmes
Décembre jusqu'au 24.	69		mariées; 150 veufs
			ou veuves, 369 gar-
		1321	çons jusqu'à l'âge
			de 10 ans & 306 filles, aussi au-dessous de
			cette époque de l'âge.

A V I E N N E.

Année 1717.
Vol. XXXV.

Le nombre des enterremens fut de 5443. On comptoit dans ce nombre 1079 hommes & 974 femmes, 1758 garçons & 1632 filles. Le nombre des baptêmes fut de 4457.

A D R E S D E.

Le nombre des enterremens fut de 1654; c'est-à-dire, qu'il mourut 165 hommes mariés, 136 femmes mariées, 36 veuves & 138 veufs, 68 jeunes gens en âge d'être mariés & 64 filles nubiles, 580 enfans mâles & 467 jeunes filles.

Enfans nés avant d'avoir vu le jour, 54 du sexe masculin & 46 de l'autre sexe. Il y eût 1510 baptêmes, c'est-à-dire, qu'il naquit 756 garçons & 754 filles. On comptoit de ce nombre 66 bâtards du sexe masculin & 41 de l'autre sexe. Le nombre des mariages fut de 396.

A L E I P S I C K.

928 enterremens; c'est-à-dire, qu'il mourut 126 hommes mariés & 88 femmes mariées, 53 jeunes gens en âge d'être mariés & 36 filles nubiles, 199 enfans du sexe masculin & 164 filles dans l'âge aussi de l'enfance, 21 femmes en couche, 60 nouveaux nés mâles & 46 femelles, outre 37 garçons

Année 1717.
Vol XXXV.

venus morts au monde & 30 filles; 68 veufs ou veuves. Le nombre des baptêmes fut de 966; c'est-à-dire, qu'il naquit 489 garçons & 477 filles; on comptoit dans ce nombre 11 jumeaux & 99 bâtards; il y eut 306 mariages.

A B E R L I N.

Le nombre des enterremens fut de 1618 & celui des baptêmes de 2770; on comptoit dans ce nombre 289 bâtards.

Dans les villes & villages qui composent la partie de la Prusse appelée *Old, Middle & Uckermark*, le nombre des baptisés fut de 19,058; parmi lesquels on comptoit 995 bâtards. Il y eut 4943 mariages & 13,317 enterremens. Parmi ce nombre on trouva 23 personnes qui avoient atteint l'âge de 90, 100 & un 112 ans. L'excès donc du nombre des naissances sur celui des enterremens fut de 5741. Dans le reste du royaume de Prusse le nombre des naissances s'est trouvé cette année de 83,515, celui des mariages de 21,059, & celui des enterremens de 55,830. Parmi ce nombre on comptoit 2157 bâtards, & parmi les morts il s'est trouvé 77 personnes au-dessus de l'âge de 90 & de 150 ans; de sorte que les naissances ont excédé les enterremens de 27,685, (ce qui suppose que les états du Roi de Prusse étoient alors dans un état croissant de prospérité.)

A C O P E N H A G U E .

Année 1717.
Vol. XXXV.

Le nombre des naissances fut de 2604, celui des enterremens de 1914, celui des mariages de 701. Il y eut par conséquent un excès de 690 des naissances sur les enterremens.

A A M S T E R D A M .

Il mourut 7119 individus, & il y eut 2289 mariages.

A D A M T Z I C .

Le nombre des naissances s'éleva à 2002, celui des enterremens à 1495, & celui des mariages à 337.



ARTICLE V.

Lettre au Rev. Guillaume Brakenidge, recteur de Saint-Michel Bassishaw à Londres, & membre de la Société Royale concernant le terme & le période de la vie humaine, dans laquelle les inégalités dans la construction & les fausses conclusions tirées des tables de Breslaw sont pleinement prouvées; la salubrité extraordinaire qu'on suppose à cette ville est particulièrement examinée & réfutée, & son état réel mis au niveau de plusieurs villes d'Angleterre; on montre aussi l'imperfection de toutes les tables formées sur 1000 vics, & on propose une méthode pour obtenir une table beaucoup meilleure; par T. W. A. M.

« Il seroit à désirer qu'on trouvât quelque ville dans
 » l'Angleterre où on conservât un registre annuel
 » des naissances & des enterremens avec l'âge des
 » personnes décédées, en supposant que dans cette
 » ville il n'y eût point un concours d'étran-
 » gers. »

Docteur Brakenidge Phil. Transf. vol. XLIX.

Année 1761.
 Vol. LII.

EN comparant les enterremens de Londres & de Breslaw, vous dites, Monsieur, qu'il meurt à Londres 8110 enfans au-dessous de deux ans, & 202 à Breslaw; je sais que cela tient à une opinion reçue comme un premier principe, qu'à Bres-

law il meurt environ le $\frac{1}{3}$ des enfans au-dessous de cet âge, & que cette ville a été vantée pour sa salubrité, pour les tendres soins qu'on prend de l'enfance en particulier, & pour la bonne constitution & la longévité de ses habitans en général. Maintenant j'admets que les nombres 145 & 57 font 202, & qu'il ne reste sur 1000 enfans nés que 798 après la deuxième année de l'âge, suivant la table du docteur Halley, Mais je ne puis aucunement adopter la conclusion, (& je suis surpris qu'on ait jamais imaginé que de 1000 enfans nés à Breslaw, il en meurt 202 seulement au-dessous de l'âge de 2 ans) & cela pour de bonnes raisons qu'on peut déduire de la dissertation du Docteur Halley.

En même tems qu'il me soit permis d'observer combien il seroit à désirer que tous ceux qui écrivent sur cet objet voulussent commencer par la naissance ou par ^e d'années, & donner un registre annuel exact de l'âge tendre, de l'âge adulte & du déclin de la vie, par quelque méthode dirigée de manière à rendre chaque objet visible à la fois, sans permettre au lecteur de choisir les nombres particuliers dans chaque occasion. Car pendant que quelques-uns comptent depuis la conception (1),

Année 17614
Vol. LII,

(1) Observations de Grant sur les *bills* de la mortalité, 5^e édit. pag. 22, 84, 85, & là les abortifs & les fœtus nés morts sont renfermés dans les enterremens.

Année 1761.
N^ol. LII.

d'autres depuis la naissance des enfans en vie, comme vous le faites & comme je crois que c'est la meilleure méthode, d'autres depuis le sixième ou neuvième mois, ou à la fin de la première année, comme l'ont fait le docteur Halley & M. Kerseboom, (& c'est un grand passage que celui de ^o d'années ou du moment de la naissance à la fin de la première année,) il doit y avoir de la confusion au premier coup d'œil & des contradictions, si-non réelles au moins apparentes, en comparant un compte rendu avec un autre. On doit se rappeler aussi, que si on prend un moindre nombre de morts dans le premier âge de la vie qu'on ne doit le faire, il s'en trouvera d'autant plus à retrancher dans les autres décades des années; & ainsi toute la table peut être fondée sur la première année inexactement représentée comme celle du docteur Halley.

J'ai dit que je ne pouvois admettre que sur 1000 enfans nés à Breslaw, il en mourût seulement 202 au-dessous de l'âge de deux ans; voyez les notions préliminaires ci-dessus & je vais en donner la raison. Le docteur Halley fait monter les naissances à 1238, & il ajoute de plus, que sur ce nombre 348 meurent dans le cours de la première année, & qu'il n'en reste par conséquent que 890 à la fin de la première année, & que 198 périssent dans le cours des cinq années suivantes. Sur ces données j'établis six années de vies locales & de

morts, & leurs nombres proportionnels pour 1000 naissances dans l'ordre qui suit :

Année 1761.
Vol. LII.

Année	Naissances.	Morts.	Naissances.	Morts.
1	1238	348	Sur 1000	281
2	890	76		719
3	814	49		618
4	735	35		590
5	730	23		571
6	707	15		12
7	692	comme dans la table; mais seulement si on commence par 1000 naissances.		

Delà je crois qu'il est manifeste que sur 1238 enfans nés à Breslaw, 424 sont morts avant l'âge de deux ans, & que par conséquent sur 1000, il en meurt 342 avant ce terme, ce qui est un peu plus que ce que j'ai observé dans ma paroisse, quoique mon rapport excède celui de M. Kerseboom, & j'aime à croire que ce que j'ai pris pour vrai est entre ce qu'ils établissent. J'ose vous assurer en somme, que ramené à une proportionnalité convenable pour 1000 naissances seulement, le rapport de Breslaw se trouve entre ceux de ma paroisse & celle de *tous les saints* de Northampton; de sorte que dans la réalité, il n'y a rien de remarquable dans la salubrité ou la longue vie des habitans de Breslaw, comme on l'avoit imaginé en

Année 1761.
Vol. LII.

entendant mal le sens de l'auteur, qui peut-être a compté depuis le milieu de la première année. Toutefois quelque dessein qu'il ait eu, le nombre 692 (reste de 1238 après les morts, de six années) se trouve dans sa table, & si nous prenons 692 & ce qui s'ensuit, nous ne devons pas oublier avec quel nombre l'auteur commence, ni croire, conformément à d'autres tables, qu'il débute par mille naissances, parce qu'il compte mille personnes dans la première année.

C'est avec grand regret que je relève ces inexactitudes dans cette table si justement estimée & qui a servi de guide à tant d'autres, mais que je ne puis dire exacte. Car en partant de son discours préliminaire dans les six premières années, & en variant sa table depuis les proportions établies jusqu'à leurs âges respectifs qui y sont établis, il est certain que l'une n'est pas conforme avec l'autre jusques vers les 57 à 62 ans, & dans chacune des années 72 & 80, & il seroit très-à-désirer que les écrits de M. Newman fussent rendu publics, pour découvrir l'origine & la justesse de ces nombres proportionnels, combien ils prouvent d'année en année & de quelles proportions primitives ils sont déduits.

Toutefois si la considération de la première année étoit la seule raison qui les fit désirer, cela ne seroit pas nécessaire, puisqu'il y a un autre passage dans

la même dissertation, qui confirme en outre ce que j'ai avancé ; là, parlant de ces tables de M. Newman comme devant être disposées sous une forme particulière par lui-même, il fait cette observation. Il paroît par-là qu'une moitié de ceux qui sont nés périt dans les 17 ans, puisque 1238 sont réduits à cette époque à 616 ; car nous ne pouvons, par aucun moyen, appliquer ces mots au nombre 1000 dans sa propre table, puisqu'il n'est réduit à la moitié qu'à la 34^e année. On peut assurer tous ceux qui se connoissent dans ces matières, que 1000 naissances & 1000 personnes, les unes prises au commencement de la vie & les autres au commencement de la table, sont des choses très-différentes, & que les conclusions qu'on en doit tirer sont très-fausSES, lorsqu'on les transporte de l'une à l'autre.

Si quelques erreurs & des comparaisons inexactes peuvent provenir de diverses tables qui ne commencent pas au même point ; si dans Londres les abortifs & les fœtus nés morts doivent être rejetés, & si on prend cette liberté, parce que la plus grande partie meurt dans la première année, (pendant que les 1238 naissances de Breslaw sont réduites seulement à 1000 personnes) avant qu'on puisse établir une juste comparaison avec la table de M. Halley, comme on le fait, les 8110 de Londres doivent être réduites, ou bien ailleurs les

Année 1762
Vol. LII.

Année 1761.
Vol. LII.

202 ou plutôt les 342 ci-dessus mentionnés doivent être augmentés, en ayant égard aux abortifs ou aux fœtus morts. Et lorsque le changement sera fait, les rapports des deux villes ne paroîtront pas si excessivement différens dans la proportion de leurs nombres respectifs.

Outre l'inconvénient de ces différens rapports qui ne commencent point ensemble, j'ajouterai une autre objection non moins importante, c'est que ces tables sont formées sur de trop petits nombres, & que par ce moyen elles retranchent 20 ou 30 années du terme de la vie & les omettent sur les annuités comme de nulle valeur. Celui qui commence avec 1000 seulement ou s'arrête court à l'âge de 90, ou il va entre la 95^e & 100^e année & ne va point au-delà, sous prétexte que sur 1000 naissances on ne doit pas attendre que guère plus d'un atteigne la 100^e année (1). Mais d'après des relevés très-nombreux pris à Londres, (par exemple durant 30 ans, depuis 1728 jusqu'en 1757 inclusivement) 2979 sont parvenus à 90 ans, 242 à 100 ans, 10 à 110 & un jusqu'à

(1) M. Monchoux forme son compte de 529623, desquels 181 ont vécu jusqu'à 100 ans & au-delà; cependant en commençant avec 1000, il forme sa table à la 95^e année. Il n'est pas nécessaire de relever cette faute, générale dans laquelle de petits nombres peuvent faire tomber.

138. Ces objets doivent-ils être omis par ceux qui prétendent donner l'état vrai de la vie humaine ? le premier nombre étant trois fois plus grand que celui avec lequel commencent les tables ordinaires, ne doit-on point y faire attention si la supputation commence par 100,000 ou un million ?

Année 1761.
Vol. LII.

Note du traducteur. J'ai cru devoir présenter d'abord cet objet intéressant de recherches relatives à la population, à la salubrité publique & aux moyens de constater l'état d'accroissement ou de décadence des nations : les Anglois, en effet, paroissent plus avancés qu'aucun peuple sur les calculs de mortalité qui ont été faits chez eux avec la plus grande exactitude, & dont ils ont tiré tant de résultats utiles pour reconnoître si certaines parties de l'Angleterre prospèrent de plus en plus, & pour trouver des bases solides à certaines considérations politiques ou à des calculs sur les annuités. Il est bien à désirer que ces objets qui ont été si négligés jusqu'ici en France, soient cultivés avec zèle, & qu'à l'époque de la régénération de la nation on puisse constater les progrès qu'elle fera par l'effort que ne peuvent manquer de prendre le commerce, l'agriculture & l'industrie. C'est dans cette vue que j'ai choisi quelques exemples qui puissent servir d'encouragement & de modèle.

Tome I. Médecine.

C

Année 1761.
Vol. LII.

J'ajouterai encore ici un extrait d'un ouvrage récent qui a été publié en Angleterre par le docteur Price, sur les annuités, doctrine entièrement fondée sur les calculs de la mortalité des peuples.

Les tables de mortalité, faites d'après des relevés des registres des grandes villes & des campagnes, offrent d'abord des différences très-remarquables. Il paroît en effet que dans le pays de Vaud en Suisse, ainsi que dans un village du Brandebourg, la proportion des personnes qui meurent durant une année est de 4 sur 180; elle a été de 4 sur 130 dans une paroisse près de Shrewbury en Angleterre; de 4 sur 83 à Londres; de 4 sur 78 à Vienne en Autriche; enfin de 4 sur 106 à Berlin. Cette comparaison fait voir combien on a eu raison d'appeler les grandes villes les tombeaux de l'espèce humaine. Dans les campagnes les hommes parcourent plus souvent leur carrière naturelle & éprouvent en plus grand nombre que dans les villes, le dépérissement graduel & inévitable qu'entraîne la décadence de l'âge.

Des relevés exacts pris en Suisse, en Prusse, en Hollande, font voir que dans tous les âges les hommes périssent en plus grande proportion que les femmes. Suivant une table dressée par Sufmich à Berlin, il est mort, même dans la première année de l'âge, 489 enfans mâles pour 395 de

l'autre sexe; ce qui fait voir que cette mortalité plus grande des hommes (1) tient à d'autres circonstances qu'aux accidens de la vie. M. Deparcieux à Paris, & M. Wargentin en Suède, ont non-seulement observé que les femmes vivent en général plus longtems que les hommes, mais encore que les femmes mariées ont à cet égard un avantage sur celles qui ne le sont pas. Cet avantage est tel qu'on a reconnu dans un canton de la Suisse, que la proportion est double. On a donné pour raison que les femmes mariées sont l'élite de leur sexe, & qu'elles jouissent en général d'une constitution plus saine & plus robuste; mais il est probable que c'est plutôt le prix d'une vie conforme à la destination naturelle de la femme, qui est l'exercice de la fécondité.

On a cherché aussi à reconnoître par des calculs;

(1) Par un calcul fait durant quatre ans à Berlin, il est né 9219 enfans mâles & 8743 de l'autre sexe, c'est-à-dire dans la raison de 21 à 20. Il est mort dans les deux premières années de l'âge 3118 enfans mâles & 2623 de l'autre sexe, c'est-à-dire dans la proportion de 7 à 6 ans. Il n'est parvenu au-delà de l'âge de 80 ans que 135 hommes & 215 femmes, c'est-à-dire, dans la raison de 5 à 8. Parmi ceux qui sont morts entre la 91^e & la 105^e année on a compté 22 hommes & 55 femmes. On voit donc que l'avantage est du côté des femmes, excepté pour le nombre des naissances.

Année 1761.
Vol. LII.

si la vie des hommes étoit dans le mariage d'une plus ou moins longue durée que celle des femmes. On a trouvé à Breslaw que, dans l'espace de huit ans, il étoit mort 1891 hommes & 1196 femmes, les uns & les autres pris dans l'état du mariage. Par un relevé exact pris dans toute la Poméranie durant neuf ans, il a été reconnu qu'il étoit mort 13,556 hommes mariés, & 10,007 femmes mariées, c'est-à-dire à peu près dans le rapport de 15 à 11. On a fait aussi des calculs semblables en Écosse, pour constater le degré de probabilité qu'avoit la femme de plus que l'homme de lui survivre dans l'état du mariage, & il a été constaté que sur 32 mariages, par exemple, il périssoit 20 hommes pour 12 femmes dans un tems déterminé; mais l'avantage est au contraire du côté des hommes dans l'état de veuvage. A Dresde on a tenu pendant quatre années un registre exact des personnes mortes dans cet état, & on s'est convaincu qu'il étoit mort 584 veuves & seulement 149 hommes veufs. A Gotha, le rapport s'est trouvé de 760 veuves sur 210 veufs. Dans les campagnes l'avantage est encore en faveur de l'homme; car en Poméranie, on a trouvé que dans neuf ans il étoit mort 411 hommes & 1553 femmes, pris les uns & les autres dans l'état de veuvage.

Quant à l'accroissement ou au décroissement de

la population dans les campagnes ou les grandes villes, les résultats tirés de l'observation indiquent combien peu ces dernières sont favorables à l'espèce humaine. Suivant des relevés exacts faits à Paris, à Vienne, à Amsterdam, à Berlin, à Copenhague, la liste des naissances est toujours de beaucoup inférieure à celle des morts ; c'est-à-dire que dans un tems déterminé on avoit compté à Berlin 3855 naissances & 5054 enterremens. Au contraire dans les campagnes où les mœurs sont plus simples & où l'agriculture est surtout encouragée, on trouve que la population croît toujours d'une manière plus ou moins rapide. Le docteur Heberden a observé que le nombre des habitans de l'île de Madère avoit doublé dans 84 années. L'accroissement est bien plus rapide dans les colonies Angloises de l'Amérique. On a reconnu que dans la nouvelle Jersey le nombre des naissances excédoit celui des enterremens de 2000 par année, & que dans 22 ans, à compter de l'année 1738, la population avoit presque doublé. On a fait des observations semblables à Rhode-Island. Quelle prodigieuse différence, ajoute M. Price, doit-il y avoir entre la force de la constitution & le bonheur de la vie humaine, si on compare une habitation pareille à celle de Londres !

Année 1761
Vol. LII,

ARTICLE VI.

Description de la peste de Constantinople : Extraite d'une lettre de M. Mackensie, docteur en médecine à M. J. Porter, ministre plénipotentiaire de Sa Majesté à Bruxelles, & membre de la Société Royale, lue le 23 Février 1764.

Année 1764.
Vol. LIV.

Il y a tant de medecins qui ont déjà écrit sur la peste, comme Prosper-Alpin, Sydenham, Hodges, Diemerbroek, Muratori, Mead, &c. qu'il paroîtra y avoir de la présomption de ma part d'écrire sur un pareil sujet après tant d'auteurs célèbres. Mais comme j'ai reconnu qu'ils diffèrent dans quelques circonstances; & que quelques-uns d'eux n'ont eu occasion d'observer que la peste d'une année, qu'il me soit permis de vous écrire quelques remarques que j'ai faites pendant près de 30 années que j'ai vécu dans un pays affligé de cette maladie, sans compter d'autres connoissances ou de nouvelles confirmations que j'ai puisées dans divers auteurs; ce qui pourra peut-être concilier les différentes opinions des auteurs célèbres dont j'ai parlé. J'ai mieux aimé choisir cette tâche que de les contredire; car je suis persuadé que chacun écrit suivant sa propre conviction, comme je le

fais moi-même, sans aucune intention d'induire les autres dans la moindre erreur.

Année 1764
Vol. LIV.

Il est hors de doute que la peste se montre d'une manière différente dans diverses contrées, & qu'elle a des symptômes différens dans le même pays en différentes années; car nous observons que la plupart des autres maladies changent plus ou moins, suivant la constitution & la disposition de l'air dans le même climar; & que pendant certaines années les fièvres sont épidémiques & très-inor-
telles; d'autres années, elles sont épidémiques sans être meurtrières; il en est de même de la petite vérole, &c. ainsi de la peste qui est certaines années plus violente & offre quelques symptômes différens de ceux qu'elle présente dans d'autres années; ce qui, je pense, doit être la raison de la différence qui paroît dans les remarques des auteurs célèbres déjà mentionnés. Il y a un phénomène extraordinaire dont la plupart des auteurs font mention, quoiqu'aucun d'eux ne le prouve ou prétende l'avoir vu, qui semble répugner & être incompatible avec l'économie animale, & se rapporter à la toute puissance & la vengeance divine, (*les médecins ne connoissent point ces distinctions de la peste dont il est parlé dans l'écriture-sainte*). J'entends par-là, qu'une personne ne peut mourir de la peste (comme cela paroît parmi nous) presque subitement, ou dans

Année 1764.
Vol. LIV.

peu d'heures, ou même le même jour qu'il reçoit la contagion. Car vous savez, Monsieur, par une longue expérience dans ces contrées, que tous ceux qui ont eu la peste, la cachent aussi longtems qu'ils le peuvent & se promènent autant qu'il leur est possible; & je présume qu'il en doit-être de même dans les autres pays pour la même raison, qui est la crainte d'être abandonnés & laissés seuls, & ainsi en combattant plusieurs jours contre la maladie, ils tombent enfin dans la rue & ils meurent subitement, ce qui fait penser au peuple que ce n'est qu'alors qu'ils ont reçu la contagion & qu'ils sont morts à l'instant; car on ne peut que supposer, suivant les règles de l'économie animale, que les émanations nuisibles doivent avoir employé quelque tems à se mêler avec le sang avant qu'elles puissent produire la fièvre, & après cela la corruption & la putréfaction dans le sang & les autres fluides, ce qui enfin arrête leur circulation & produit la mort: tel fut le cas de ce Grec, qui parloit avec votre écuyer à la fenêtre en 1752, & qui mourut une heure après cela dans une vigne voisine; on le dit mort subitement, quoiqu'il fût très-connu qu'il avoit contracté la peste plusieurs jours avant cela.

Madame Chaponis se trouva elle-même indisposée pendant plusieurs jours l'année 1758, & se plaignit beaucoup avant qu'on la soupçonnât d'a-

Voir la peste. Un matelot du capitaine Hill reçut la contagion en Candie en 1736. La traversée jusqu'à Smyrne dura quinze jours, suivant le rapport du capitaine du vaisseau; cependant le malade resta encore cinq jours dans l'hôpital avant de mourir. Le jardinier de M. Lirle resta indisposé douze jours avant de s'aliter, & il resta huit jours dans le lit avant de mourir en Juillet 1745.

Année 1764.
Vol. LIV.

Il est vrai que Thucydides, dans sa description de la peste d'Athènes, rapporte que quelques personnes en étoient mortes subitement, ce qui peut avoir entraîné d'autres auteurs dans la même opinion. Mais Thucydides, avec tout le respect qui lui est dû, doit être regardé comme ayant eu très-peu de connoissance sur l'économie animale; car il n'étoit point medecin, quoiqu'il fût un historien célèbre, & il avoua en outre que quand la peste attaqua d'abord le Pirée, il y avoit tant de personnes à Athènes qui ignoroient la nature de la maladie, qu'ils croyoient que les Lacedemoniens, qui faisoient alors le siège de la ville, avoient empoisonné leurs sources, & que telle avoit été la cause de leur mort. En outre il prétend affirmer, d'après le peu d'expérience qu'il a de la peste, que la même personne ne peut l'avoir deux fois, ce qui est absolument faux. Le père Grec, qui a eu la direction de l'hôpital Grec de Smyrne pen-

Année 1764.
Vol. LIV.

dant 50 ans, m'a assuré qu'il avoit été attaqué de la peste douze fois dans cet intervalle de tems, & il est très-certain qu'il en mourut en 1736. M. Brossard en a été attaqué en 1745, à son retour de France, & il est bien connu que le même, avec toute sa famille, en moururent en Avril 1762. L'abbé qui a la direction de l'hôpital François de Pera, me rapporta l'autre jour qu'il avoit eu cette maladie ici & à Smyrne quatre fois différentes. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'une jeune femme qui l'avoit eue en Septembre dernier avec tous les signes pathognomoniques, comme des bubons, des charbons, après la fièvre, l'eut de rechef le 11 Avril, & en mourut quelques jours après, pendant qu'on n'avoit eu aucune connoissance d'aucun accident à Constantinople ou aux environs, depuis le mois de Décembre excepté celui-là; mais il mourut quatre personnes dans la même petite maison en Septembre, & comme elle n'avoit pas été nettoyée & que cette jeune femme y vivoit toujours, elle en fut attaquée une seconde fois & elle en mourut.

Ce que j'ai pu observer avoir précédé cette maladie, est une grande mortalité parmi le bétail : en Mai 1745, & au commencement de Juin de la même année, il y eut des essaims de papillons qui voltigeoient çà & là, & un grand nombre d'insectes qui se portoit par-tout; & après cela il y

ent une violente peste : d'après les observations faites en 1752 & 1748, vous pouvez vous rappeler ce que je vous dis, que nous aurions une violente peste dans ces années, ce qui arriva de même surtout durant les mois d'Août & de Septembre 1758, lorsqu'il mourut plusieurs personnes dans les familles de Marsellini, de Spathari, de Skwackhim, de Charlani, Rembeault, &c.

Année 1764
Vol. LIV.

La peste est maintenant plus fréquente dans le Levant qu'elle n'étoit lorsque je me transportai pour la première fois dans ces contrées, il y a environ 30 ans ; car alors on la connoissoit à peine à Alep & à Tripoly de Syrie, & on ne l'avoit vue que très-rarement à Smyrne, pendant qu'on l'éprouve maintenant fréquemment à Alep, & l'été & l'hiver à Smyrne, quoiqu'elle ne soit jamais aussi violente en hiver ; ce qui doit être attribué à une grande communication par-tout le Levant, & qui est plus étendue dans les villages qu'elle n'avoit coutume de l'être. Je regarde la peste comme une contagion communiquée par le contact d'un corps sur un autre, c'est-à-dire communiquée à un corps sain par un corps infecté, dont les émanations vénéneuses, les miasmes subtils & les courans volatils pénètrent les pores cutanées des personnes saines auxquelles ils parviennent, ou se mêlent avec l'air qu'ils respirent & s'avancant ainsi par les vaisseaux inhalans,

Année 1764.
Vol. LIV.

se mêlent avec le sang & les fluides animaux dans lesquels, par leurs qualités actives & nuisibles, ils augmentent leur mouvement & leur vitesse, & dans quelques jours produisent la fièvre, en sorte que plus le contact est immédiat & fréquent, plus le danger est grand, en ce que les parties nuisibles qui s'exhalent d'une personne infectée doivent être plus nombreuses & avoir par conséquent une plus grande force & une plus grande activité en proportion de leur distance.

Quelques personnes pensent que l'air doit être infecté, & que c'est-là la principale cause de la peste, pendant que je pense que l'air environnant n'y contribue point d'une autre manière que comme un véhicule qui transmet les particules vénéneuses d'un corps dans un autre, au moins dans les pestes que j'ai jusqu'ici observées à Smyrne & à Constantinople; mais je conviens toujours que la différente constitution de l'air contribue beaucoup à propager la peste, car l'air chaud dilate & rend plus volatiles & plus actives les émanations vénéneuses, pendant que l'air froid les contracte & leur fait perdre leur activité. Une personne qui a la peste, peut-être dite avoir un air vénéneux & empoisonné dans sa chambre & au-tour d'elle, pendant qu'en même tems l'air du dehors est exempt de toutes exhalaisons dangereuses, de sorte que je

n'ai jamais craint d'aller dans une grande maison dans laquelle il y eût un pestiféré, pourvu qu'il fût confiné dans une chambre.

Année 1764
Vol. LIV,

La fièvre pestilentielle se déclare d'abord par des frissons, même dans les mois de Juillet & d'Août, qui sont si ressemblans au début d'un accès de fièvre, qu'il est impossible de les distinguer l'une de l'autre à la première vue. Cet accès de froid est aussi-tôt accompagné de dégoût, de nausées & d'une envie de vomir qui oblige d'abord le malade d'évacuer une grande quantité de matière bilieuse, avec un grand malaise & une oppression de la poitrine & de l'orifice de l'estomac, accompagnés souvent d'une toux sèche comme dans une fièvre intermittente, & même dans cet état il est très-difficile de distinguer l'une de l'autre. Après cela le malade a un violent mal de tête avec des vertiges & quelques légers mouvemens convulsifs. Sa respiration est gênée; son haleine & sa sueur ont une odeur fétide ou putride; ses yeux sont hagards, son regard effrayé, terne & pâle; il a une soif qu'il ne peut étancher, sa langue a une couleur jaune avec des bords rouges; il y a une perte totale de l'appétit, une grande agitation, une grande chaleur interne & plus qu'on ne devoit l'attendre de la fièvre, qui est quelquefois très-moderée, mais qui devient souvent plus forte vers la nuit; le malade saigne souvent du nez. Il continue d'être dans ce triste état pendant

Année 1764.
Vol. LIV.

quelques jours, jusqu'à ce que la matière véné-
neuse commence à se séparer en quelque degté du
sang, & se débarrasse par une évacuation critique à
la surface, par des éruptions cutanées, des bubons,
des charbons, des ulcérations, des pétéchies &
quelques petites vésicules ou empoules. Mais on
n'observe pas tous ces symptômes dans la même
personne. Quand les éruptions cutanées paroissent
& deviennent sensibles, le malade se trouve lui-
même mieux & un peu soulagé de l'oppression
dont il avoit été accablé auparavant. Quelques
personnes ont, dans cet état, une très-violente
fièvre, quelquefois accompagnée de délire & de
phrénésie; d'autres sont dans un état de stupidité,
de somnolence & ne se plaignent de rien, comme
un des matelots du capitaine-Hill, dont j'ai déjà
parlé, & le jeune homme qui est mort de la peste
l'année dernière & qui étoit dans notre palais; car
je ne l'eus pas plutôt vu avoir la fièvre & être en
même tems dans un état de stupidité & d'insensi-
bilité, que je conclus qu'il avoit la peste, quoique
les domestiques m'assurassent fortement qu'il n'é-
toit pas sorti de la cuisine depuis un mois; mais
en l'examinant avec soin, je trouvai qu'il avoit
plusieurs symptômes de la peste, comme des bu-
bons, des charbons, &c. sur son corps, & qu'il
étoit allé, il y avoit une douzaine de jours, dans une
maison voisine du palais où il y avoit des pesti-

ferés, & il n'y avoit point de doute qu'il n'y eût reçu la contagion. Ceux qui sont dans un délire furieux vivent rarement aussi longtems que ceux qui sont dans un état de somnolence & de stupeur; mais s'ils vivent assez longtems pour que leurs éruptions cutanées se fassent abondamment, & que leur phrénésie commence après cela à s'abattre, ils peuvent guérir plus probablement que ceux qui sont somnolens & qui n'ont qu'une fièvre modérée, quoique j'en aie vu quelques-uns mourir de cette manière, comme Delurin, interprète François, qui vint à cheval le Samedi à Giamderé, se regardant comme hors de danger, & qui mourut le Dimanche matin suivant. L'ainé de M. Marfellini se croyoit très-bien après les éruptions des bubons en 1738, de sorte qu'il sortit de la ville & vint dîner à Therapea, & revenu le même soir à la ville il y mourut, après avoir été dans le délire quelques jours auparavant, & il avoit eu la fièvre de la peste depuis qu'il avoit quitté Buinkderé, environ dix jours avant.

Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne soyez convaincu que rien dans ces contrées, soit l'air, soit le régime, ne produit la peste, quoique l'un & l'autre contribuent beaucoup à ses progrès & à sa violence, après qu'elle y a été portée de quelques autres lieux infectés; car vous savez par une longue expérience qu'elle exerce sa fureur durant

Année 1764
Vol. LIV.

Année 1764.
Vol. LIV.

les mois chauds de Juillet, d'Août & de Septembre, pendant que le régime de la plupart des pauvres habitans (qui en sont en très-grand nombre les victimes) consiste en fruits qui ne sont point mûrs, en concombres, melons, courges, raisins, &c.

La peste se déclare quelquefois ici & à Smyrne de manière qu'il n'est pas possible de dire de quel lieu elle a été apportée; car quelques maisons qui ont été infectées sans être convenablement nettoyées après que le pestiféré en a été transporté, retiennent quelques-unes des molécules vénéneuses dans la laine, le coton, le poil, le cuir, les peaux, &c. pendant tout l'hiver. Ces molécules mises en mouvement par la chaleur d'Avril & de Mai, s'exhalent des foyers où elles résidoient & recouvrent leur activité de manière à pénétrer les pores cutanées de la personne qui vient dans leur sphère & l'infectent ainsi, comme c'est arrivé au palais de France, aux maisons de M. Hubsch. & Caraja pendant deux ou trois années. Mais ces sortes de pestes s'étendent rarement & elles ne sont jamais aussi funestes que celles qui viennent de loin.

Plusieurs pensent que la chaleur tue la peste; pour me servir de leurs expressions, ce qui doit être attribué à une folle superstition des Grecs, qui prétendent qu'elle doit cesser le 24 Juin, jour de la S. Jean, quoiqu'ils puissent observer que le contraire arrive chaque année; & la plus forte peste

peste qui a régné à Smyrne de mon tems, en 1736, étoit la plus violente vers ce tems-là, & continua avec une grande violence jusqu'à la fin de Septembre qu'elle commença à s'abattre, mais elle ne finit point entièrement avant le 12 Novembre, époque à laquelle les Capucins chantèrent un *Te Deum* dans leur couvent.

Année 1764.
Vol. LIV.

Cette opinion erronnée peut aussi, jusqu'à un certain degré, être due à ce qu'on a mal entendu Prosper Alpin, qui reconnoît que la peste du Caire commence à cesser aux mois de Juin & de Juillet, lorsque les vents forts du nord, appelés embats ou vents étiéniens, commencent à souffler, ce qui rend ce pays beaucoup plus froid que dans les mois de Mai, d'Avril & de Mars, quand la peste est dans sa plus grande fureur; ce qu'il attribue avec raison à de grandes chaleurs suffocantes & aux vents du sud qui règnent durant ce mois dans ces contrées: & c'est alors que les vaisseaux qui sont chargés de ris, de lin & d'autres marchandises qui viennent de Constantinople, reçoivent l'infection & la transportent avec eux; & ces marchandises étant portées à différentes personnes, dans différentes parties de la ville, la peste se déclare à la fois avec une violence extrême parmi les traficans Grecs, Arméniens, Juifs; car j'ai observé ici & à Smyrne que les Turs sont ordinairement les derniers des quatre nations qui sont infectés; mais

Année 1764.
Vol. LIV.

lorsqu'une fois la peste se répand parmi eux ils en ont le plus à souffrir, parce qu'ils ne prennent point la moindre précaution & le moindre soin, & que leurs familles sont beaucoup plus nombreuses.

La peste, ainsi que toutes les autres maladies épidémiques, a ses commencemens, ses progrès, son état & sa déclinaison, quand elle commence à perdre sa virulence & que plusieurs malades en guérissent. Quelquefois elle règne spotadiquement pendant tout l'hiver, & nous apprenons quelques accidens de ce genre au Phanar, parmi les Grecs, les Juifs, les Turcs & les Arméniens, & même parmi les Francs, car vous vous rappelez qu'à Pera, en 1762, on n'en fut point entièrement exempt. Certaines années la peste se fait sentir dans des villages sur le Bosphore; mais durant l'hiver elle n'est jamais si violente.

Quant à la cure de cette maladie, quelques-uns sont d'avis de saigner abondamment, comme Léonard Botal, le docteur Dover, &c. Mais dans ce pays-ci on regarde comme une mort infaillible d'ouvrir la veine, & par conséquent on n'emploie jamais la saignée. Je crois cependant qu'un milieu entre ces deux extrêmes peut mieux remplir le but, car comme c'est une maladie inflammatoire la saignée & les émétiques doivent être en usage au commencement, aussi-tôt que le malade est pris de la fièvre, surtout si la fièvre est très-vive

& qu'elle soit accompagnée de délire & d'un violent mal de tête ; mais après que la séparation de la matière morbifique commence à se faire , & que cette matière est portée à la surface du corps en bubons & en charbons par la force de la nature & l'agitation de la fièvre , la saignée & les purgatifs sont très nuisibles ; mais les doux vomitifs doivent alors être très - utiles , en ce qu'ils poussent plus puissamment au dehors les éruptions cutanées que la nature ne le feroit sans ce secours. Les vomitifs doivent aussi empêcher le retour de la matière dans le sang , ce qui arrive souvent par la délitescence des bubons , &c. & par la prompte mort du malade. Comme la fièvre pestilentielle a plusieurs remissions , je pense que l'usage du quinquina doit-être très-utile , comme cela fut prouvé en 1752 , lorsqu'un domestique de l'ambassadeur de France fut sauvé à Buiukderé , par le moyen du quinquina & de l'ipécacuanha que je lui envoyois , avec des avis au père Joseph ; & ce fut le seul qui guérit de tous les pestiférés du village. • Voici quelle est la pratique qu'on suit à l'hôpital. Lorsque quelqu'un est soupçonné de la contagion , on lui donne une forte dose d'eau-de-vie , avec une boisson de Thériaque de Vénise ; après cela on le couvre bien pour le faire suer : pendant les trois premiers jours il ne mange rien que du vermicelle bouilli dans l'eau avec un peu de suc de

Année 1764.
Vol. LIV.

limon. Le quatrième jour on lui donne du riz & de l'eau, & ce régime s'observe strictement jusqu'au quinzième & vingtième jours, & alors on permet au malade un léger bouillon de poulet, qu'on appelle communément *brodo longo*, & on ne donne alors à boire, depuis le premier jusqu'au dernier, que de l'eau chaude.

On applique d'abord, sur les bubons & les parotides, un cataplasme de mauve & de lard de cochon, pour hâter la maturation, & après que ces tumeurs sont molles & ouvertes, on les panse avec l'onguent basilicon.

On applique pendant quelques jours du caïmack & du sucre sur les charbons pour les rafraîchir, & quand ils commencent à se séparer on y met un digestif qui est la térébenthine de Chio, mêlée avec un jaune d'œuf. On n'applique rien aux *vibices* & aux *petechies* qui paroissent & qui disparaissent tous les trois ou quatre jours sur toutes les parties du corps.

Pendant tout ce tems on ne donne point d'autre médicament au malade, sinon de la thériaque de Venise pour les pauvres, & quelques doses de Bezoard à ceux qui sont en état de les payer, & on n'a jamais pu persuader de changer de méthode; car quand vous leur avez donné de la poudre du docteur James, on ne l'a jamais essayée pour en reconnoître les effets.

Je pense qu'on doit user de tous les antiphlogistiques avant les éruptions, & de tous les alexipharmques & antiseptiques après eux, plus particulièrement du camphre & de quelques doses de quinquina, toujours dans les remissions de la fièvre. Les vésicatoires doivent être d'un grand usage contre la stupeur & la somnolence des pestiférés, pour relever les esprits animaux & leur communiquer quelque mouvement; mais on n'en use jamais ici, & comme on se conduit par l'habitude, il est impossible d'obtenir un changement.

Quant aux préservatifs, je crois que le meilleur est de s'éloigner des personnes & des maisons infectées, & de se tenir pendant quelques jours à une certaine distance d'elles.

Quelques-uns font d'avis que le feu préserve de la peste & qu'il purifie l'air : je pense autrement; car j'ai remarqué que les cuisiniers & leurs aides, qui sont toujours près du feu, souffrent plus de la peste que toute autre classe du peuple proportionnellement à leur nombre. En outre, le feu met en activité & donne de l'énergie aux émanations vénéneuses qui se trouvent aux environs, qui, sans cela, se seroient dissipées & dispersées dans l'air libre si elles y avoient été suffisamment exposées. En outre le feu ouvre les pores, relâche les fibres; & de même que la saison des chaleurs propage la peste, le feu doit faire plus ou moins la même

D üj

Année 1764.
Vol. LIV.

Année 1764.
Vol. LIV.

chose ; & pour la même raison , j'imagine que tous les parfums doivent être très-peu utiles.

Je regarde comme le meilleur préservatif , la modération & une nourriture d'une digestion facile , d'une qualité balsamique , succulente & capable de produire un sang riche & généreux. C'est aussi un grand préservatif d'être exempt de crainte , & autant qu'il est possible , des idées sombres & des objets tristes auxquels on se livre dans de semblables occasions.

Ainsi , Monsieur , je vous ai exposé en peu de mots ce qui s'est présenté à moi sur cette maladie ; comme la plupart des exemples qui sont rapportés , sont arrivés de votre tems & sont encore dans votre souvenir , j'espère que vous en attesterez la vérité , si vous les jugez dignes d'être présentés à la société royale. Sinon vous pourrez en disposer à volonté , car je vous prie de le recevoir comme un témoignage du profond respect avec lequel je suis , &c. Mackenzie.



SECTION II.

MALADIES ORGANIQUES.

ARTICLE PREMIER.

Extrait d'une lettre du docteur Kinneir de la société d'Edimbourg à M. Campbell, du collège des médecins de Londres, sur l'efficacité du camphre contre la manie.

J'AVANÇAI un jour, Monsieur, dans une de nos conversations, que j'avois employé avec succès le camphre contre la manie, que je n'avois point été jusqu'ici trompé dans mon attente à cet égard, ainsi que dans d'autres cas où le genre nerveux & le sang paroissent affectés d'une manière analogue. Pour répondre à votre demande je vous envoie l'histoire de quatre cas avec toute l'exactitude dont ma mémoire est susceptible. Je crois que d'après les effets de ce remède, les médecins peuvent être conduits à une manière de raisonner plus sûre sur les affections nerveuses.

1^{er}. Une femme de 19 ans, après un jeûne obstiné de deux jours & une aversion pour la société;

D iv

Année 1774
Vol. XXXV,

Année 1717.
Vol. XXXV.

par des sentimens de dévotion, à l'approche de Pâques, tomba dans une mélancolie profonde, sans pouvoir parler ni répondre aux questions qu'on lui faisoit; elle marmotoit seulement & pouffoit continuellement des soupirs, & elle dormit pendant dix jours, ce qui arriva au déclin de la lune. La nuit qui précéda le changement de lune elle parla, & demanda de l'eau à boire, ce qui lui ayant été accordé, elle éprouva immédiatement des tressaillemens & un rire immodéré; les yeux en même tems parurent très-brillans, suivant le rapport d'un de ses parens, & alors elle commença de parler d'une manière farouche & persévéra toute la nuit dans cet état. Le lendemain matin elle tomba dans un délire très-furieux. Le medecin qui fut appelé pour lui donner du secours la fit saigner quatre fois dans la semaine; elle fut émétiquée, purgée, on lui fit prendre des bains froids, & on employa d'autres moyens usités en pareil cas, le tout sans effet; c'est dans ces circonstances que je fus appelé.

Je débutai par un émétique antimonie, qui n'eut d'autre effet que de la tenir endormie pendant douze heures. Le lendemain je lui donnai un demi-gros de camphre dans un bol & autant la nuit. Elle continua de reposer pendant toute la nuit; sa peau fut recouverte d'une douce moiteur, & pendant le jour elle évacua beaucoup d'urine.

C'est ainsi que je la traitai pendant quatre jours , & après cela je lui prescrivis des pillules d'Æthiops, de résine de gayac, de cinnabre, d'antimoine & de poudre de guttère , & la nuit une dose de camphre ; son état s'améliora de jour en jour , & dans trois semaines elle reprit le libre usage de sa raison & elle jouit depuis neuf ans d'une bonne santé.

Année 1737.
Vol. XXXV.

II. Un jeune homme de famille , âgé de 17 ans devint très-malade & stupide à la suite d'un chagrin. Il resta pendant longtems dans cet état, quoiqu'on lui donnât les meilleurs conseils. Il avoit un extrême penchant à mâcher tout ce qu'il trouvoit sur ses pas , quelque chose que ce fût. Il se trouvoit assez bien pendant les nuits , & il aimoit beaucoup la vue des objets brillans. Il cachoit tout ce qu'il trouvoit sous sa main , qu'il fût en compagnie ou seul , & quoiqu'il fût d'un bon naturel. Il resta dans cet état pendant six mois , après quoi il devint si furieux que deux hommes pouvoient à peine l'empêcher de frapper tous ceux qui se présentoient à lui. Cette fureur dura trois ou quatre jours sans sommeil ; le calme succéda après quelque tems de sommeil , mais il étoit toujours à craindre. Tel étoit son état depuis la nouvelle lune jusqu'à la pleine ; alors il devint malade & mélancolique , parlant peu , regardant toujours en bas & n'envi-

Année 1727.
Vol. XXXV.

sageant personne en face. Quatorze mois se passèrent ainsi.

Quand je vins le voir, il se plaignit des mauvais traitemens qu'on lui faisoit éprouver, & si je ne l'avois observé avec soin, j'en aurois reçu quelque coup; mais j'obtins de lui qu'il prit les remèdes ci-dessus, & en le nourrissant abondamment & lui faisant prendre une grande quantité de boissons délayantes, il recouvra la raison en six semaines, & il a joui après cela d'une bonne santé & d'un jugement sain, ayant été entièrement rendu à ses affaires.

III. La femme d'un mercier, âgée de 36 ans; & qui étoit naturellement vive & d'une disposition active, se trouva subitement malade un jour au sermon, de sorte que ce fut avec beaucoup de peine qu'on la fit sortir de l'église avec décence; elle brisoit tout ce qui se présentait à elle & prononçoit des juremens horribles. Son aliénation fut enfin portée à un point extrême. Elle consulta les plus habiles medecins d'Edimbourg, qui n'obtinrent aucun succès & qui l'abandonnèrent. Je fus ensuite consulté, six mois après, & je la traitai de la manière précédente: dans quatre jours on apperçut déjà un changement sensible, & dans huit jours elle sortit dehors. Je continuai encore l'usage des remèdes quatorze jours après le réta-

blissement, & maintenant elle se porte aussi bien qu'elle se soit jamais portée de sa vie.

Année 1727.
Vol. XXXV.

IV. Un jeune homme âgé de 20 ans, d'une constitution pléthorique, perdit la tête & tomba dans un si grand désespoir qu'il se blessa lui-même avec les dents & les mains, de sorte qu'on fut obligé de le lier. Je lui donnai deux fois l'émétique & quelques autres remèdes usités en pareil cas, & je prescrivis ensuite le camphre, qui ramena en dix jours l'usage de la raison. Il fit une rechûte au changement de lune, se trouva maniaque pendant trois jours, mais non pas autant qu'auparavant. Il sortit de nouveau & passa le changement suivant de lune sans éprouver autre chose qu'un peu de pesanteur. Le jour qui précéda la pleine lune il éprouva aussi un peu de mal-aise & parut semblable à un homme fortement hypochondriaque. Je fis continuer l'usage du camphre, ainsi que celui des autres remèdes altérans pendant quelque tems, mais à une moindre dose que je ne les avois donnés pendant sa maladie; de sorte que dans neuf semaines il fut parfaitement guéri, & qu'il continua de jouir d'une bonne santé.

Remarque du traducteur. Comme l'emploi du camphre contre la manie est un des objets les plus intéressans de la médecine, je vais joindre à ce qui vient d'être dit ci-dessus le cas suivant, tra-

Exposition des effets du camphre dans un cas de manie. Par M. G. Olivier, medecin du prince de Galles.

Je fus appelé, le 23 Février 1781, pour voir un homme qui avoit été attaqué depuis peu de la manie ; il resta dans cet état avec quelques intervalles lucides jusqu'au mois d'Octobre de la même année. On employa les moyens usités sous la direction du docteur Monro.

Je me proposai alors d'essayer le camphre. Le docteur Monro parut n'avoir point de connoissance de l'emploi de ce médicament dans ce cas, non plus que le docteur Bartie; mon avis donc prévalut & on donna deux scrupules de camphre dans une boisson, le 16 Octobre vers midi. Le malade étoit alors plus tranquille qu'il ne l'avoit été précédemment, car il se promenoit dans le jardin, jouoit aux quilles avec ceux qui étoient chargés de sa garde, & n'attaquoit personne. En lui rendant visite le lendemain, je trouvai qu'un quart d'heure après qu'il eut pris sa boisson, il étoit tombé à terre dans une allée du jardin où il avoit pris le remède. Ceux qui étoient auprès de lui me dirent qu'avant de faire sa chute il étoit

devenu pâle & s'étoit senti incommodé. On le prit, on le porta dans son lit & peu de tems après il revint à lui-même. Il avoit eu précédemment la parole embarrassée, & plusieurs symptomes de paralysie avoient précédé sa manie.

Année 1717.
Vol. XXXV.

On lui offrit de nouveau du camphre, mais il ne voulut point en prendre. Depuis ce jour il devint plus raisonnable & se trouva sensiblement mieux; on le fit promener chaque jour au grand air en voiture; il reprit ses habits ordinaires & son ancienne manière de vivre, & le 30 Octobre il nous dit: que dans la nuit précédente, pendant qu'il étoit dans son lit, les sens lui étoient revenus, & que quelque chose comme un éclair avoit précédé ce retour. Il quitta alors le lieu où il avoit été renfermé, & on eut lieu de s'assurer de sa conduite raisonnable dans différentes sociétés & dans différentes maisons. On fit des parties de plaisir pour lui dans sa maison; il devint paisible, poli envers tout le monde, & il s'amusoit au jeu chaque soir, sans aucune absence d'esprit. On renvoya un de ses gardes & on fit tenir l'autre à l'écart & hors de sa vue. C'est ainsi qu'on tâchoit de l'amuser, d'augmenter & de fortifier son retour à la raison par une société agréable jusqu'au 21 Novembre, époque à laquelle il partit avec un de ses parens pour la campagne, où il vecut au sein d'une famille sôbre, tranquille & qui se réjouissoit

Année 1727.
Vol. XXXV.

de son rétablissement. Il forma les plus fortes résolutions de mener une vie tempérante & d'y joindre un exercice constant; ce qu'il observa très-exactement, & c'est ainsi qu'il recouvra sa force & son embonpoint & qu'il devint même gras.

En Février 1783, ses affaires l'appelèrent à Londres & il suivit les séances du parlement; je le vis à son arrivée, je lui rendis de fréquentes visites, & il me parut bien portant & doué d'une raison saine.

Le 9 Avril suivant, il se plaignit d'une affection de l'estomac; il devint triste & abattu, & tomba dans une véritable hypochondrie qui fut bientôt portée au plus haut point de mélancolie; il resta dans cet état tout l'été, durant les mois de Juillet, Août & Septembre. Son domestique lui donnoit en général les alimens, & toutes ses excrétiions paroissoient involontaires.

Je me rappelai alors que l'accès qu'avoit produit la dose du camphre que je lui avois donnée en 1781 avoit été alors la cause de son rétablissement, & comme je n'avois personne avec qui je pusse consulter; je résolus d'essayer de nouveau le camphre à la dose de deux scrupules, comme le dit Hoffman, dont je n'avois pas lu l'observation en 1781. En conséquence, le 15 Octobre 1783, je lui donnai de ma propre main ce remède, & dans environ dix minutes il chan-

Année 1727,
Vol. XXXV.

cela & tomba dans mes bras. Je le plaçai sur un fauteuil ; il étendit ses membres en bâillant, mais il ne rendit rien par le haut ; il devint pâle & tremblant de toutes les parties de son corps ; ses yeux se fermèrent ; il enveloppa sa tête & une humeur épaisse coula de sa bouche. Son pouls étoit foible & intermittent , tantôt lent & tantôt accéléré ; dix minutes après son visage devint rouge ; il tomba dans une grande sueur & ses yeux se rouvrirent. Il continua à suer, pendant que l'humeur couloit de sa bouche, l'espace d'environ trente minutes ; sa respiration , qui avoit été d'abord laborieuse, devint plus libre ; & après cinquante minutes, à compter de la prise de sa boisson, il se leva de son fauteuil, à l'aide d'un appui, en chancelant un peu, mais il reprit aussitôt l'usage de ses jambes, se promena dans sa chambre comme un homme qui éprouve un grand étonnement.

Quelques minutes après je le fis sortir de la chambre où il venoit d'essuyer l'accès, & je me promenai avec lui une heure dans son antichambre. Durant tout ce tems il parla peu si ce n'est pour demander où il étoit & pour me faire quelques autres questions. Deux heures après il descendit pour se mettre à table comme à l'ordinaire ; il découpa une pièce de mouton, parla à son ami qui étoit avec lui & il mangea assez bien. Je le vis le soir & je le trouvai assoupi, rendant de la bave

Année 1717.
Vol. XXXV.

par la bouche & sa tête appuyée sur le dos du fauteuil. Il se coucha de bonne heure, mais il ne put dormir; il rendit le soir une légère selle. Je le vis le lendemain matin & je le trouvai dans la même situation que la veille. Je le mis sur son sofa & il resta ainsi toute la journée sans rien manger. On lui administra un clystère & il se coucha de bonne heure; il s'endormit bientôt après; son corps devint très-chaud, son visage rouge, & il éprouva une sueur copieuse avec une grande liberté de la respiration. Il éprouvoit 90 battemens de l'artère dans une minute.

Je le vis de bonne heure le lendemain 17^e du même mois, je le trouvai encore suant & profondément endormi, avec la face rouge & le pouls de 85 battemens; il passa ainsi tout le jour à dormir & à suer. Le lendemain matin je le vis à huit heures; je le secouai & il s'éveilla; il demanda aussi-tôt du thé & une rôtie, & se servit de ses propres mains pour le manger & le boire; sa face étoit beaucoup moins rouge; il étoit foible & maigre; sa respiration étoit courte & sa voix enrouée; son pouls étoit foible, petit & d'environ 84 battemens par minute. Ses amis craignoient pour ses jours & on appela le docteur Warren pour dire son avis. Un clystère qu'on lui avoit donné la veille avoit fortement opéré. On le mit sur un sofa & on lui appliqua un emplâtre vesicatoire

toite entre les épaules. Il mangea peu ce jour là, dormit un peu sur le sofa & encore davantage durant la nuit. Il parloit peu, mais d'une manière assez raisonnable. Le docteur Warren crut que le camphre avoit produit un changement favorable, & il prescrivit le 19 le même remède à la dose de dix grains deux fois par jour.

Le 20, le malade prit de la nourriture ; mais il passa une nuit agitée, sua beaucoup & salit son lit. Les potions camphrées continuèrent le 22 de tenir libre la respiration ; la force & l'embonpoint revinrent avec la tranquillité.

Le 3 Novembre il avoit gagné beaucoup de force, & il se promenoit jusqu'à un mille de distance presque chaque jour. Il n'avoit plus besoin d'aide pour prendre sa nourriture depuis le 15 Octobre. Le docteur Warren le vit ce jour-là & crut qu'il étoit assez fort pour entreprendre un voyage ; ce qui fut déterminé par ses parens qui crurent que le séjour de la campagne seroit le plus propre pour rétablir sa santé. Le 5 Novembre il se mit dans une chaise de poste sachant bien qu'on le conduisoit à sa maison ; il étoit gai, raisonnable & décrivait tous les lieux par lesquels il passoit ; il mangea avec appétit & se trouva très-bien ce jour-là. On avoit cependant observé quelque changement en lui après le dîner avec des signes d'aliénation de la raison ; il continua d'être ainsi dans la

Année 1727.
Vol. XXXV.

même position avec quelques intervalles d'une humeur sombre, mais en général dans un état de rétablissement. Ses excréments ne furent plus involontaires pendant tout le voyage; il étoit en général raisonnable excepté l'après dîner qu'on observoit quelques signes d'aliénation de la raison; tel fut son état jusqu'au 14 Novembre que j'ai cessé de le voir.

Il est digne de remarque que dans les années 1781 & 1783, après avoir pris du camphre à la dose de deux scrupules, on avoit observé un changement dans le *senforium commun*, & un rétablissement dans ses facultés intellectuelles.

Je regrette de n'avoir point eu occasion de répéter le même remède à la dose de deux scrupules; car il y a tout lieu de croire qu'un remède qui avoit produit un avantage notable, auroit pu, par sa répétition, produire un effet permanent; mais je n'oserois point le prescrire de cette manière, sans être moi-même le témoin de ses effets. J'ai été privé de cette occasion par la foiblesse du malade qu'on a soustrait à mes soins après six mois d'observations.

Cet exemple fournit une autre preuve qu'il n'est point convenable de transporter les malades dans leurs propres maisons qui ne sont jamais assez favorables pour rétablir leurs facultés morales, parce qu'elles retracent à leur mémoire des affaires im-

portantes ou des objets de réflexion qui finissent par renverser leur raison. Une circonstance des plus contraires & qui auroit dû dissuader de faire conduire le malade dans son ancienne maison, c'est qu'un de ses parens y étoit resté enfermé, comme maniaque, pendant plusieurs années, & qu'il y avoit fini sa vie.

Année 1717.
Vol. XXXV.

Le changement notable qui arrivoit souvent au malade dans l'après-dîner, fit que je donnai ordre qu'on ne lui préparât jamais un repas à une heure réglée, mais qu'on lui donnât des alimens indistinctement quand il le désireroit; mais ce point fut encore négligé, & je crois que ce fut encore un des obstacles de son rétablissement. Depuis le 14 Novembre je n'ai point appris directement quelle conduite on avoit tenue à son égard, mais j'ai su depuis qu'on l'avoit fait sortir de sa propre maison & qu'on l'avoit fait enfermer.

Il arrive quelquefois qu'un concours d'heureuses circonstances nous seconde dans le traitement des maladies; mais dans ce cas elles m'ont été toutes contraires; & c'est là sans doute la cause de mon peu de succès.



ARTICLE II.

Cas remarquable & traitement d'une femme d'où on a tiré un fœtus qui avoit resté treize ans dans une des trompes de fallope ; par le docteur Monsey, médecin des armées de la Czarine.

Année 1748.
Vol. LXIII.

LA femme d'un soldat de la ville d'Abo en Finlande, d'une stature moyenne & qui avoit été mère de deux enfans, devint grosse pour la troisième fois l'année 1730. Elle éprouva des violentes douleurs, des tranchées dans les intestins, des syncopes fréquentes, des vomissemens & un grand nombre d'autres affections, soit au dos, soit au bas ventre. Ces symptômes & ces incommodités diverses continuèrent de l'affecter jusqu'à ce qu'enfin elle trouva que son fardeau augmentoit ; il lui sembloit qu'il se portoit tantôt d'un côté tantôt de l'autre, à mesure que son corps changeoit de position ; sa main pouvoit le faire passer d'un lieu dans un autre, mais il paroissoit que son siège de préférence étoit le côté droit.

A l'époque à laquelle le fœtus commença à s'animer, la santé de la mère devint meilleure ; son ventre devint plus volumineux qu'à l'ordinaire, & on présuma qu'elle portoit des jumeaux. Vers

l'époque de l'accouchement elle éprouva de violentes douleurs qu'elle rapportoit à l'intérieur du bas ventre; mais elle n'en éprouvoit point au dos, & rien n'annonçoit les efforts qui déterminent l'accouchement. Le lendemain ces douleurs disparurent, ce qui lui fit supposer qu'elle s'étoit trompée dans son calcul. Mais après cela ses seins dégorgèrent & donnèrent du lait en abondance, & ses menstrues revinrent, accompagnées de douleurs plus violentes que celles qu'elle avoit éprouvées auparavant. Il lui arrivoit aussi de tems en tems des pertes uterines si abondantes, qu'elle ne pouvoit ni se mouvoir, ni parler. Après que ces pertes eurent cessé, ses forces & son sang parurent entièrement épuisées; elle tomboit par fois en défaillance & on la laissoit pour morte.

Elle continua de rester malade les dix années suivantes, & durant tout ce tems le fruit de sa conception étoit mobile & se portoit d'un côté à l'autre. Mais au mois de Septembre 1741, elle éprouva une douleur au-dessous de l'ombilic avec gonflement & rougeur, & cette tumeur prit dans trois semaines l'apparence d'un petit furoncle; on le perça & il en sortit un liquide coloré en jaune, mais sans odeur; trois semaines après la matière de l'écoulement prit une forme purulente.

Au mois de Juin il sortit par cette petite plaie deux os qui furent donnés à examiner au chirurgien.

E.ijj

Année 1748.
Vol. LXIII.

Année 1748,
Vol. LXII.

gien qui lui donnoit ses soins. Celui-ci se contenta d'appliquer un emplâtre, regardant la cure comme impossible. D'autres petits os sortirent aussi par la blessure jusqu'en Octobre 1742, que l'armée Russe prit son quartier d'hiver à Abo. Cette infortunée s'adressa à M. Mounsey, qui, après un examen attentif, entreprit de la délivrer, ayant demandé pour aide M. Geirle, chirurgien d'un régiment; une sonde à rainure fut introduite dans la fistule, & on fit avec le bistouri une incision en haut & obliquement, depuis la ligne blanche jusques dans la cavité de l'abdomen. On n'alla pas plus loin ce jour-là, & on se contenta d'extraire quelques os qui étoient libres. La plaie fut pansée avec des tentes & des compresses pour la tenir ouverte.

A la prochaine opération l'incision fut faite en bas, & celle qui avoit été déjà faite en haut fut continuée en suivant, autant qu'il étoit possible, la direction indiquée par l'adhésion du corps au peritoine, & en évitant de faire l'ouverture extérieure plus grande que ce qui étoit absolument nécessaire, de peur que l'épiploon & les intestins ne sortissent, & surtout de peur que la suppuration ne finît par consumer toutes les forces de la nature qui étoient déjà épuisées.

L'ouverture se trouvoit assez grande, mais le fœtus se trouvant exactement enveloppé dans le

fac qui le contenoit, le docteur Mounsey n'osa point le tirer par violence, de peur que quelques os mis à nud ne déchirât les parties internes. C'est pourquoi dilatant le sac avec la pointe d'une paire de ciseaux courbes, dirigés par les doigts de la main gauche, il perça & mit en pièces le crâne qu'il tira ensuite pièce par pièce.

La matière qui sortit d'abord avoit une odeur fétide & consistoit en membranes, en graisse & en chair corrompue. En ouvrant le crâne, le cerveau parut dans sa couleur naturelle. L'opération ayant été longue & la femme ayant des défaillances, la plaie fut pansée, sans qu'on s'efforçât alors de rien extraire davantage. Le soir elle éprouva des vomissemens, mais à l'aide de médicamens convenables & de la flanelle trempée dans le vin qu'on appliqua sur tout le ventre & qu'on renouvela souvent, elle se trouva mieux. La perte du sang pendant toute l'opération avoit été peu considérable.

Le lendemain on fit l'extraction des os du tronc & de la plupart des grands os avec leurs ligamens & la chair corrompue. La manière de l'écoulement pendant plusieurs jours fut d'une couleur foncée, ce qui provenoit du sang qui sortoit des pores dilatés du sac; mais cette couleur changea par degrés & finit par devenir blanche. Le docteur Mounsey imagina que cet écoulement

Année 1748.
Vol LXIII.

ressembloit aux lochies qui succèdent à l'accouchement; car après l'extraction du fœtus les seins se gonflèrent & donnèrent du lait en abondance pendant deux mois, & ce lait, pour la quantité, la couleur & la consistance, étoit semblable à celui d'une femme parvenue à terme.

Le docteur examina le sac très-exactement avec ses doigts; il étoit mince & non-contracté, mais disposé en replis, & il sentoit à travers cette membrane le rectum & la vessie urinaire comme dans le fond d'un uterus. Plusieurs petits os étoient restés dans les replis; mais comme la femme ne se plaignoit point de douleur, on laissa leur expulsion aux soins de la nature.

Outre les fomentations, les balsamiques, les bandages convenables, &c., les injections détergentes vulnéraires furent très-utiles en les rendant copieuses, soit pour entraîner les chairs putrides, soit pour expulser les fragmens d'os qui étoient encore cachés dans les replis du sac, qui se contracta de lui-même de jour en jour, devint uni & blanc en dedans, & sembla très-rapproché de l'uterus, ce qui fit penser que c'étoit une des trompes de fallope.

La plaie fut guérie en six semaines, & la femme délivrée d'une longue suite de maux, devint grasse & vigoureuse, & jouit maintenant d'une bonne santé.

En rapprochant les circonstances il est raisonnable de penser que le produit de la conception ne fut point reçu dans la cavité de la matrice, mais que l'ovum imprégné s'étoit arrêté au passage d'une des trompes de fallope où il avoit pris son accroissement & où il avoit été retenu plusieurs années. Il paroît aussi que l'inflammation qui survint au-dessous du nombril n'étoit pas due à la corruption du fœtus, ou à quelque os nud qui cherchât une issue, mais plutôt à une friction accidentelle du sac contre le péritoine, produisant là une adhésion, une obstruction, une inflammation, &c. Le fœtus avant l'accident avoit resté entier pendant toute cette suite d'années, & sans se corrompre, & il ne se putrifia que lors de sa communication avec l'air extérieur, de même qu'un sujet frais qu'on auroit laissé exposé au même degré de chaleur.

Les observations du docteur Mounsey sur les os extraits, ont été rapportées de la manière suivante : ceux du crâne répondoient à ceux d'un fœtus de neuf mois, & même les fibres étoient plus compactes & les jointures plus fortes. Rarement les germes des dents des nouveaux nés sont aussi avancés qu'on l'observa dans le cas ci-dessus, ce qui fait croire que le fœtus n'étoit point mort au terme ordinaire de la grossesse, & qu'il lui

Année 1748.
Vol. LXIII.

Année 1748.
Vol. LXIII.

étoit survenu différens accidens dus surtout à sa position contre nature.

Quelques endroits du crâne paroissent être cariés & corrodés par quelque humeur âcre, & la nature en fournissant des suc osseux avoit réparé ces vides, & les avoit rendus plus solides & plus fermes, mais plus rudés & plus scabreux, à cause des différentes époques & des directions de l'ossification. Il y avoit aussi des exostoses aux extrémités du fémur & de quelques autres os.

Il est très-difficile de déterminer dans quel tems ces excroissances ont commencé & fini. En supposant que ce fût à l'époque des affections qui étoient survenues dans les premiers mois de la grossesse, une telle maladie n'auroit-elle point causé la mort au fœtus, avant qu'il fût parvenu à son dernier accroissement. Si c'est en conséquence des violens accidens qui survinrent vers le 9^e mois de la grossesse, le fœtus auroit dû continuer de vivre quelque tems après, dûtant que ces excroissances osseuses se formoient; il y avoit en effet une ossification parfaite comme celle qui se fait en vertu des loix de la circulation, & indépendamment de toute propriété de végétation ou de pétrification comme dans les corps inanimés. Il étoit passé deux ou trois apophyses latérales de l'épine à travers le petit ulcère; le reste des os

(excepté un petit nombre qui s'étoit perdu durant les pansemens) fut remis par le docteur Mounsey au musée de la société royale. Ils conservent encore une odeur singulière & très-forte quoique nettoyés des chairs corrompues.

Cette femme s'est rendue à Stockholm après sa cure & s'est présentée à l'académie dans un état de parfaite santé.

On a cru devoir joindre ici le cas suivant, pris du même volume; lettre de M. Huxham à M. de Mortimer, secrétaire de la société royale, sur un fœtus né avec une tumeur extraordinaire à l'anus qui contenoit quelques rudimens d'un embryon.

La femme de J. Perrine, de la paroisse de Chartelon, dans la campagne, accoucha d'une fille à terme le 11 Juillet 1746. L'enfant n'avoit rien de défectueux, pour les membres, la tête, le corps; mais depuis la région au-dessus du sacrum, les muscles fessiers & entre les cuisses, on remarquoit une grande excroissance que l'accoucheuse appelloit une loupe & qui avoit la ressemblance d'un estomac de mouton. Elle paroissoit par sa couleur & sa forme être une continuation de la peau du reste du corps; mais elle étoit pleine de vaisseaux sanguins. Elle pendoit en dedans & descendoit au-dessous des genoux; elle étoit même

Année 1742.
Vol. LXIII.

Année 1748.
Vol. LXIII.

plus grosse que tout le corps de l'enfant lui-même; elle étoit molle & elle sembloit contenir une matière flottante; mais on sentoit au milieu une substance dure.

Le pudendum aussi bien que l'anus étoit dans l'état naturel, & l'urine & les selles étoient régulières; mais l'anus étoit placé plus en-devant & immédiatement sous la vulve, de sorte que les déjections suivoient en sortant la même direction que les urines.

Je fis une ouverture dans la partie déclive de la tumeur & j'en tirai près de deux pintes d'un fluide d'un rouge pâle & sans odeur. Ayant laissé l'orifice ouvert il y eut un écoulement continu du même liquide pendant plusieurs jours, mais par degrés la matière devint de plus en plus glutineuse, & enfin semblable à du pus blanc & très-féride. Comme l'écoulement étoit considérable l'enfant dépérit peu à peu & il mourut à l'âge de 15 jours.

Le lendemain j'ouvris la tumeur & je trouvai près de l'os coccx un abcès avec un kyste dans lequel il y avoit au moins quatre onces d'un pus blanc très-épais, & après un examen ultérieur, je trouvai différentes articulations cartilagineuses qui ressembloient en quelque sorte à la queue d'un mouton. Elles avoient environ deux pouces de long & étoient enveloppées d'une espèce de sub-

tance charnue couverte de graisse. A l'extrémité de ces articulations étoit quelque chose qui ressembloit à la tête & au cou d'un embryon qui auroit été aussi volumineux qu'un gros œuf; en ouvrant cette espèce de tête on y trouvoit une substance semblable au cerveau & à la partie postérieure une sorte de cervelet. Il y avoit une bouche & une langue du côté de la face, mais on n'y reconnoissoit aucun vestige, ni des yeux ni du nez; cependant il y avoit une oreille assez apparente. *

Dans la même tumeur on voyoit suspendue une membrane lâche qui ressembloit assez au placenta & aux autres membranes d'un petit fœtus.

Note du traducteur. On pourroit joindre ici comme une autre monstruosité l'exemple d'un enfant double, ou plutôt de deux jumeaux qui étoient réunis par le ventre, & dont on donne la description dans le même volume; mais comme on a déjà rapporté un exemple de cette sorte dans le volume de physiologie du présent *Abrégé des Transactions philosophiques*, il seroit superflu d'en ajouter ici un nouveau. Il y a seulement cette différence que dans le cas présent les deux jumeaux dont le corps étoit réuni par-devant sont morts en venant au monde, au lieu que les deux sœurs jumelles qui faisoient un double corps, & dont on a parlé dans le volume de physiologie, étoient

Année 1748.
Vol. LXIII.

réunies par leur partie postérieure & qu'elles vé-
curent jusqu'à l'âge de 22 ans.

On trouve dans le même volume un exemple
de la même monstruosité parmi les animaux,
c'est-à-dire un veau double; on y a joint la gravure
des parties examinées après la dissection comme
dans le cas précédent.

ARTICLE III.

*Muet qui recouvre l'usage de la langue par le
moyen d'un songe effrayant, après en avoir
été privé pendant quatre ans; observation com-
muniquée par le R. M. Squire, membre de la
société royale.*

Année 1748.
Vol. LXIII.

HENRI AXFORT avoit été sujet à des convul-
sions dans sa jeunesse, & il n'en avoit été délivré
que vers l'âge de 25 ans. Après cette époque il
jouit d'une bonne santé & devint même très-
robuste. Vers l'âge de 28 ans, en allant avec quel-
ques dames pour voir la maison de campagne du
lord Weymouth, il s'aperçut qu'il lui survenoit
un enrouement qui fut bientôt accompagné de tous
les symptômes d'un rhume ordinaire; six jours après
l'invasion de cette maladie, il perdit entièrement
l'usage de la parole & devint incapable, non-seu-

lement de faire usage de sa langue pour articuler des sons, mais encore pour produire le moindre bruit avec cet organe. Son rhume se termina de la manière ordinaire, & il devint aussi bien portant qu'il l'eût été jamais, mais il continua d'être muet. Il consulta les médecins voisins, mais sans succès; car aucun remède ne put parvenir à lui rétablir l'usage de la langue.

Il resta muet pendant quatre ans; à cette époque, se trouvant un jour à la campagne avec des amis, il but beaucoup & de manière qu'en s'en retournant à sa maison il fit deux ou trois chûtes de cheval, & qu'enfin on l'arrêta dans une maison voisine de la route où on le fit coucher: il s'endormit aussi-tôt profondément; alors, comme il l'a ensuite rapporté lui-même, il lui sembla qu'il étoit tombé dans une chaudière bouillante de mout de bière, ce qui le jeta dans une si grande frayeur, que faisant les plus grands efforts pour appeler du secours, il fit, en effet, entendre sa voix, & qu'il recouvra l'usage de sa langue comme auparavant; sans le moindre reste d'enrouement ou d'altération dans le son de sa voix. Il n'étoit point accoutumé à boire beaucoup; il vit encore & il jouit d'une bonne santé & de la liberté de sa langue d'une manière aussi parfaite qu'il le faisoit antérieurement.

Année 1748.
Vol. LXIII.

Année 1748.
Vol. LXIII.

On croit devoir joindre ici l'exemple d'une difformité singulière de la langue, dont on a trouvé l'exposé dans le même volume.

DANS la vie de M. Henri Wharton, chapelain de l'archevêque de Sancroft, écrite par lui-même, on trouve le passage suivant :

En sortant du sein de ma mère on observa que j'avois deux langues, l'une & l'autre de la même figure & de la même grandeur; la sage-femme prétendit qu'il en falloit couper une, mais ma mère ne voulut point le permettre, & la suite montra qu'elle avoit raison & qu'elle n'avoit point obéi aux sentimens d'une fausse pitié. En effet, la langue inférieure tomba peu à peu dans le dépérissement, & finit par se contracter en un si petit volume, qu'elle n'est pas aujourd'hui au-delà de la grosseur d'un petit poids. La langue supérieure prit son accroissement ordinaire, quoiqu'elle eût plusieurs sillons profonds, comme si elle avoit reçu des bleisures; ces sillons parallèles ont augmenté avec la langue, & il ne paroît pas que la réunion puisse jamais s'effectuer.

Il paroît, par le journal de la vie de l'auteur lui-même, qu'il a été toujours infirme & dans un état de maladie.

ARTICLE

A R T I C L E I V.

Extrait d'une lettre de M. Acry, D. M., à M. Mortimer, secrétaire de la société royale, sur les particularités de la cure d'une blessure de la cornée & une lacération de l'uvée.

UNE pauvre femme, âgée de 26 ans, d'une complexion délicate, avoit été sujette plusieurs années à des douleurs de colique qui se renouvoient de tems en tems. Le 26 Décembre 1744 elle reçut une blessure dans la cornée de l'œil droit, par un éclat d'un morceau de bois, qui divisa aussi l'uvée. Une partie de l'humeur aqueuse s'écoula & l'œil perdit sa transparence; la douleur étoit violente & l'œil ne pouvoit distinguer les objets que quand la femme regardoit en bas. Je lui ordonnai un collyre préparé avec le baume de Tolu, le camphre dissous dans l'esprit-de-vin, l'eau de plantin, avec un peu de teinture de mars de Mynsicht. On appliquoit souvent quelques gouttes de cette composition à différentes reprises; la saignée du bras fut pratiquée & le régime consista dans l'usage d'un gruau léger, de l'eau d'orge & du bouillon recent.

Le lendemain la douleur de l'œil fut dissipée;

Tome I. Médecine.

F

Année 1748.
Vol. LXIII.

Année 1748.
Vol. LXIII.

mais la malade se plaignit d'avoir la vue troublée par des atômes qui lui sembloient flotter dans l'air; je lui prescrivis, pour la purger, une infusion de séné & une fomentation astringente sur les tempes & les paupières. Le jour suivant l'œil fut enflammé, les sourcils ruméfiés, & il se déclara une douleur de tête; on changea le collyre & on substitua le suivant :

Eau rose, } de chaque demi-once.
Vinaigre, }

Alun de roche, cinq grains.

On en appliquoit trois gouttes deux fois le jour.

Le 29^e l'inflammation ayant augmenté, l'infusion du séné & la saignée furent répétées & les parties furent seulement fomentées avec l'esprit-de-vin. Le 31^e l'inflammation continua de diminuer. Le 5 Janvier l'inflammation se renouvelant, les côtés de la blessure devinrent un peu protubérans. Le séné fut répété, on appliqua un vésicatoire derrière l'oreille, & on employa un collyre émollient.

Le lendemain l'enflure des paupières fut dissipée. Le 11 ses menstres parurent & la blessure fut comme cicatrisée. Depuis le 15 jusqu'au 24 l'inflammation continua de s'abattre; elle augmenta seulement à force de frotter & d'humecter l'œil; mais une saignée produisit un mieux marqué qui continua jusqu'au 30, excepté un jour qu'ayant con-

tracté un rhume, l'œil devint excessivement enflammé, mais la saignée produisit un prompt soulagement. Le 4 Février il y eut un peu de douleur dans l'œil, & la conjonctive fut un peu rouge. Aussi-tôt après y avoir mis deux gouttes d'eau froide, les paupières se gonflèrent, & il s'ensuivit une violente inflammation de l'œil, avec une petite tache qui se rendit sensible; mais ces symptômes se dissipèrent par des applications répétées des sangsues, & au moyen d'un purgatif mercuriel. Le 19 on ordonna un sternutatoire d'hellebore & d'euphorbe.

Peu de jours après l'inflammation de l'œil se dissipa; la malade se plaignit cependant de voir les objets, mais ce symptôme cessa bientôt après.

L'œil est resté myope, & elle voit un peu avec obscurité le côté droit des objets. Les parties divisées de l'uvée ne se sont point réunies, mais cette membrane conserve encore sa faculté naturelle de contraction; la transparence des humeurs & la convexité de la cornée sont les mêmes qu'auparavant. Il n'y a point de cicatrice sur la cornée; mais la forme de la pupille est beaucoup altérée.

Toutes les fois que la personne s'enrhume, elle est sujette à une légère douleur de l'œil. Il ne reste à présent d'autre altération que celle que j'ai rapportée, & qui suit nécessairement de la contraction de la pupille, qui n'admet point le passage

Année 1748.
Vol. LXIII.

d'une assez grande quantité de rayons de lumière ; & leur transmission sur la rétine. Sa manière de voir les objets obscurcis d'un côté peut provenir d'une partie artificielle de la pupille qui est située plus près du grand canthus de l'œil que dans l'état ordinaire ; ce qui fait que les rayons, en tombant sur un côté de la cornée près du petit canthus de l'œil, sont en partie interceptés & doivent causer une défecuosité dans la peinture de l'objet. Nous pouvons attribuer la douleur qui survient lors d'un rhume, à la foiblesse des vaisseaux de cet organe. Il arrive souvent à ceux qui ont éprouvé de fortes ophtalmies, que durant leur vie leurs vaisseaux sont trop foibles, & que par-là étant distendus par les causes les plus légères, ils deviennent douloureux & souvent rouges.

On peut faire quelques remarques sur les cas précédens :

1°. La cure auroit été plus prompte si les circonstances avoient permis à la malade de s'astreindre, à un régime exact.

2°. Lorsque l'œil a peu ou n'a point du tout d'apparence d'inflammation, j'ai essayé l'eau froide, mais avec un mauvais succès. Toutes les applications froides sur les yeux enflammés, les astringens ou répércussifs demandent la plus grande précaution dans leur usage ; car s'ils ne produisent pas un bon effet, ils nuisent. Dans des cas légers ils

ont souvent de très-bons effets. Mais lorsque la matière obstruante est si bien fixée, qu'elle ne peut être facilement répercutée, les vaisseaux étant resserés, les fluides coagulés, la maladie augmente; ce qui arrive dans ce cas à cause de l'application de l'eau froide.

3°. Les bons effets des évacuations sur la diminution de l'inflammation ont été très-sensibles. Les blessures de la cornée, accompagnées d'une blessure de l'uvée & d'une ophtalmie incommode, se guérissent sans cicatrice.

4°. On sent la nécessité de changer de topiques; suivant l'état de la maladie; ce qui a été remarqué par divers auteurs célèbres.

A R T I C L E V.

Remarques faites sur l'état du cerveau de trois personnes mortes d'épilepsie; par M. W. Rhori.

COMME j'ai trouvé, à Venise, plusieurs occasions favorables d'assister à l'ouverture des cadavres, chez le célèbre Santorius, j'ai cru devoir publier les trois résultats suivans.

Un homme de 35 ans, d'une habitude de corps grêle, éprouvoit depuis deux ans une douleur gravative de tête vers la partie antérieure du

F iij

Année 1748.
Vol. LXIII.

Année 1717.
Vol. XXXV.

Année 1727.
Vol. XXXV.

front, & il fit en vain usage de plusieurs remèdes qui lui furent prescrits par des médecins habiles; après deux années il survint une forte hémorragie des narines qui cessa d'elle-même. Après cette hémorragie il perdit le sens de l'odorat, & ensuite ayant éprouvé pendant deux années des accès d'épilepsie il mourut. Ayant ouvert le crâne, nous vîmes le cerveau dans sa partie antérieure, vers la dure-mère, autour de la région du *crista-galli* dur & calleux dans sa partie droite & fortement adhérent à la dure-mère; dans la même partie antérieure du cerveau, vers la gauche, on trouva une certaine quantité de matière sanguinolente extravasée. Le reste étoit dans l'état naturel.

Une femme attaquée d'anasarque, & âgée de 60 ans, éprouva des accès d'épilepsie très-violens & fréquemment répétés, nous trouvâmes dans les ventricules antérieurs du cerveau une assez grande quantité de lymphe extravasée, de sorte que les ventricules en étoient gonflés. Dans les plexus choroïdes on remarquoit plusieurs corps blanchâtres, transparens, &c., qui contenoient au-dedans une sérosité aqueuse & qui étoient de différens volumes (c'étoient des hydatides). Le plus grand étoit du volume d'une semence de chanvre.

Ayant ouvert le cadavre d'une vieille femme qui avoit été sujette pendant plusieurs années à

des accès d'épilepsie, nous vîmes entre la pie-mère & le cerveau une médiocre quantité de sérosité extravasée; dans les ventricules antérieurs du cerveau il y avoit une si grande quantité de sérosité qu'ils menaçoient de se rompre. Chaque plexus choroïde avoit de côté & d'autre la forme d'un raifin. On y trouvoit plusieurs vesicules (hydatides) rondes, transparentes & de diverses grandeurs; le tout avoit la forme de perles très-élégantes.

M. Rheti parle aussi d'une cataracte, d'une couleur perlée qui n'étoit nullement due à une altération du cristallin, mais seulement à une membranule qui étoit libre dans la chambre postérieure de l'œil & qui n'adhéroît à l'uvée que par deux fibrilles très-subtiles.

Année 1727.
Vol. XXXV.

A R T I C L E V I.

*Gros calcul rendu à travers les voies urinaires,
par une femme; observation communiquée par
le D. R. Beard, médecin de Worcester.*

P A R M I les observations variées qu'on a faites du pouvoir de la nature, celle qui suit mérite une place distinguée. Une pauvre femme de la paroisse de Flatbury, âgée de 63 ans, éprouva les symptô-

Année 1727.
Vol. XXXV.

Année 1727.
Vol. XXXV.

mes ordinaires d'une pierre dans les reins & en suite dans la vessie. Les accès de douleur s'accroissoient à mesure que la pierre prenoit de volume ; elle parvint enfin à un tel degré de maigreur , qu'on jugea son état désespéré. Eprouvant du soulagement vers la fin de l'été , d'un usage copieux du thé , elle persévéra dans cet usage pendant longs-tems , lorsque subitement , en présence de quelques femmes , elle sentit un poids extraordinaire & une force intérieure qui , étant secondée par des efforts & par la suspension de la respiration , fit sortir en dehors une pierre avec un bruit qui surprit beaucoup toute la compagnie , & avec moins de douleur , d'effusion du sang & de mal par la suite qu'on n'auroit dû l'attendre. Elle est maintenant bien portante & n'éprouva d'autre inconvénient que celui qui étoit inévitable , c'est-à-dire une incontinence d'urine.

La pierre qu'on a gravée , est de la même couleur & de la même texture que les autres calculs de la vessie. Son poids est de deux onces un gros & 55 grains (1), *Avoirdupois*. Sa plus grande circonférence est de sept pouces & demi ; la longueur de la convexité est de quatre pouces $\frac{7}{8}$.

(1) La différence que l'auteur donne entre la livre *Avoirdupois* & la livre dite *troy* , est que la première contient 14 onces & la seconde 16.

Note du Traducteur. Le thé est regardé par Linné non-seulement comme un préservatif du calcul , mais encore comme très-utile contre les affections calculeuses : *Urinam pellit*, dit-il, *renes alluit*, à *calculo liberat*. Outre les avantages que produit l'usage du thé, à raison de l'abondance du liquide qu'on prend en même tems , il est encore utile comme astringent. On fait en effet que si on verse une infusion de thé dans une dissolution de vitriol , on produit une couleur noire , ce qui est la preuve d'une vertu stiptique non équivoque. Or tous les auteurs de médecine parlent de la vertu singlière dont jouissent les stiptiques ou astringens contre le calcul. Heucher , autrefois professeur de Wirtemberg , a fait une dissertation qui a pour titre : *Calculus per astringentia pellendus*. L'observation ci-dessus confirme l'opinion de Heucher , quoi qu'en dise Cullen , qui présume que dans les cas où les astringens ont paru réussir , l'on avoit cru faussement que le calcul lui même étoit expulsé pendant que les symptômes étoient simplement modérés. Si les calculs sont assez petits pour pénétrer à travers l'urètre de l'homme , on peut espérer beaucoup de l'usage des astringens , comme du thé & surtout de la décoction de l'oreille d'ours. Pour prouver cet effet je vais rapporter l'extrait d'une observation qui a été insérée dans le journal de M. Fourcroy.

Année 1727.
Vol. XXXV.

Année 1717.
Vol. XXXV.

Le frère Damien , augustin de la place des Victoires à Paris, ressentoit des douleurs insupportables dans la vessie , & on constata à la charité la présence d'un calcul , à l'aide de la sonde, en 1789. Durand l'hiver de la même année & de la suivante , il fit usage d'une décoction de la Bourserole ou *uva ursi* , & il rendit en divers tems cinq petits calculs qu'il regarda comme des fragmens d'un calcul plus gros , suivant l'opinion populaire qui attribue une vertu lythotriptique à cette plante , & qui lui a fait donner le nom vulgaire de *Cassépierre*. Un sixième calcul étoit resté engagé dans la portion du canal de l'urètre qui est au-dessous du scrotum , & M. Barnabe, un des religieux de la Charité , fut obligé de se servir de la pince de Hunter pour l'extraire.

Après avoir quelque tems suspendu l'usage de la Bourserole , il la reprit de nouveau & il rendit encore un calcul en présence de M. Deschamps, chirurgien major de la Charité. Le malade a rendu ainsi plusieurs petits calculs qui ont tous une forme pyramidale irrégulière. Il en conserve dix dans une boîte ; je les ai vus & examinés avec soin , & quoique le malade soit dans l'idée que ce sont des fragmens d'un calcul qui a été rompu par la Bourserole , je n'y ai vu que de petits calculs indépendans les uns des autres , & qui avoient seulement une ressemblance générale de forme. Depuis un

an le malade n'éprouva plus aucune affection calculieuse.

ARTICLE VII.

Perforation contre nature trouvée dans la partie supérieure de l'estomac, avec les symptômes qui en avoient été la suite; par M. C. Rawlinson.

J. SKIDMORE se plaignoit depuis trois ou quatre ans d'une douleur violente à l'estomac & aux intestins, & il ne lui étoit possible de rester la nuit dans son lit que lorsqu'il avoit vomi la plus grande partie de ce qu'il avoit mangé & bu pendant le jour. Il comparoit souvent sa douleur à un grand poids rapporté à la région de l'estomac, & cette douleur étoit diminuée par une forte pression exercée avec la main sur cette partie. Quand il se tournoit lui-même dans le lit d'un côté à l'autre, il sentoît, disoit-il, distinctement un fluide ou toute autre matière qui se porroit du côté où il étoit couché, avec un certain bruit; c'est ce fluide qu'il regardoit comme la cause de son mal. C'est pour cela qu'il disoit souvent qu'il auroit voulu, & qu'il faisoit même des instances aux chirurgiens pour les engager à lui ouvrir le ventre & le débarrasser de cette matière.

Année 1727.
Vol. XXXV.

Année 1727.
Vol. XXXV.

Il n'y avoit point de tumeur apparente dans cette partie, & le ventre n'étoit pas même plus volumineux qu'à l'ordinaire. Il consulta plusieurs médecins avant de se rendre à l'hôpital, mais sans éprouver aucun soulagement des remèdes qui lui avoient été prescrits. A sa mort nous desirâmes de faire l'ouverture de son corps & d'examiner si on pourroit reconnoître la cause de sa maladie. Aussi-tôt que nous eûmes ouvert le péritoine, il coula une liqueur blanchâtre assez semblable au petit-lait, mais seulement un peu plus épaisse & féculente. Son odeur n'étoit pas aussi fétide qu'on auroit dû l'attendre du long séjour qu'elle avoit fait dans l'abdomen. Autant que nous pûmes en juger, il y avoit plus de quatre pintes de cette liqueur dans cette cavité.

Etant parvenus à l'estomac nous le trouvâmes percé à sa partie supérieure, à peu près à égale distance des deux orifices; l'ouverture étoit assez grande pour recevoir l'extrémité d'un doigt. Nous ouvrîmes l'estomac suivant sa longueur, & nous le trouvâmes presque entièrement rempli d'une matière glutineuse, épaisse, un peu jaunâtre; & à sa tunique intérieure vers le bas, il adhéroit fermement un noyau de prune ou de quelqu'autre fruit semblable. A l'intérieur, près du trou contre nature qu'on avoit observé, la gangrène s'étendoit à deux ou trois pouces, & de l'autre côté du

trou il y avoit un ulcère qui avoit presque la même grosseur. Tout l'estomac étoit beaucoup plus épais qu'à l'ordinaire, mais la partie qui étoit près du pilore étoit environ quatre fois plus épaisse que dans l'état naturel. L'estomac adhéroit à toutes les parties environnantes, & il étoit si fermement attaché au pancréas, qu'il n'étoit pas possible de l'en séparer sans le déchirer. La rate ne pesoit pas plus d'un quart d'once; le pancréas étoit squirreux, quoiqu'il eût son volume naturel. Dans le foie & les reins il n'y avoit pas de défecuosité apparente; les parties du thorax n'avoient reçu aucune altération sensible, excepté que les poumons étoient plus adhérens à la plèvre que dans l'état ordinaire. Les intestins & tous les viscères contenus dans l'abdomen étoient d'une couleur plus blanche qu'ils n'ont coutume de l'être, sans doute à cause de leur macération dans la liqueur où ils flottoient.

Polype rendu par l'expectoration, (extrait d'une lettre écrite par M. Samber, medecin à Salisbury, à M. Jurin, secrétaire de la société royale).

LE 15 Décembre, à dix heures de la nuit, M. Tompson fut pris d'un violent flux de sang, en sorte qu'il en perdit à peu-près trois livres au-

Année 1717.
Vol. XXV.

tant que je pus en juger. Quand je le vis il se trouvoit mieux, il lui sembloit seulement, quand il touffoit, que quelque chose s'arrêtoit au passage & qu'il ne pouvoit la rendre. Le lendemain à ma visite il me dit qu'il avoit rendu ce qui le gênoit dans la trachée artère, & il ajouta qu'il le conservoit sur du papier. Je l'examinai avec soin, après l'avoir mis dans de l'eau, & je reconnus que c'étoit un polype (1) dont j'ai fait graver la figure. Le malade étoit goutteux & avoit été tourmenté de la toux depuis plus de six mois. Il succéda à cette expectoration un ulcère au poumon, qui fut suivi de tous les symptômes de la consommation & de la phthisie, & qui se termina par la mort.

ARTICLE VIII.

Calcul trouvé dans l'urètre ; extrait d'une lettre écrite par M. Huxham à M. Ratty, docteur en médecine & secrétaire de la société royale.

Année 1730.
Vol. XLIV.

RIEN n'est plus ordinaire que de trouver des calculs dans les reins & la vessie urinaire, mais qui auroit jamais cru qu'on eût pu trouver un calcul de cinq onces & demi dans l'urètre.

(1) Tout ce que l'auteur dit de ce polype est fort vague, & il est inutile de s'y arrêter.

Un homme avoit perdu la plus grande partie de la verge, à la suite d'une maladie vénérienne; le traitement chirurgical avoit été mal dirigé, puisque la cicatrice qui s'étoit formée permettoit à peine un passage aux urines, dont il ne pouvoit sortir qu'un très-petit filet & même avec de grands efforts. Bientôt il se déclara de vives douleurs lorsque la personne les rendoit, & enfin à la partie supérieure du scrotum il se forma une petite tumeur qui augmenta peu à peu & qui devint très-volumineuse en se portant vers l'aîne gauche. Il devint donc incapable de darder son urine qui s'écouloit continuellement goutte à goutte; mais cela ne suffit pas pour rendre tout ce fluide excrémentiel, puisqu'il se forma trois ou quatre fistules au scrotum, & que la plus grande partie de l'urine s'échappoit par cette voie avec un mélange de pus. La tumeur qui étoit très-dure, au lieu de diminuer, ne faisoit que s'accroître.

C'est au milieu de ces tourmens & d'un abandon général qu'il passa plusieurs années d'une vie très-malheureuse, & qu'il fut enfin transporté à l'hôpital: là dans un effort très-violent pour rendre l'urine il expulsa un énorme calcul qui pesoit cinq onces & demi (mesure Avoirdupois) je lui rendis aussi-tôt visite & je trouvai une partie du scrotum déchirée, & la tumeur disparue, & je reconnus alors que le calcul étoit sorti de

Année 1790.
Vol. XLIV.

Année 1730.
Vol. XLIV.

l'urètre. Ce qu'il y eut encore d'étonnant c'est que cette déchirure fut bientôt guérie en y appliquant du baume de térébenthine, à cela près qu'il restoit seulement une fistule urinaire dans la partie supérieure du scrotum, & ce malheureux, qui auparavant pouvoit à peine se remuer, avoit recouvré la liberté de faire sans gêne quelques promenades.

Je ne pense pas que ce calcul ait été produit primitivement dans l'urètre par la concrétion des graviers, mais je présume qu'un petit calcul, formé d'abord dans les reins, avoit été porté dans l'urètre, & qu'ayant été retenu dans ce canal dont l'extrémité étoit presque obstruée, il y avoit acquis un très-grand volume par l'accession d'une nouvelle matière du calcul.

On trouve dans la même lettre l'exemple d'un nouveau né qui avoit une tumeur lymphatique à la partie inférieure des lombes, dont l'ouverture entraîna la mort du sujet. Ces tumeurs sont connues sous le nom de *spina bifida*, & ce n'est plus un objet nouveau.



ARTICLE

A R T I C L E I X.

Nombreux calculs rendus par l'usage des eaux de Pyrmont ; l'homme qui fait le sujet de l'observation, n'avoit jamais éprouvé d'affection calculieuse, mais il tomba bientôt après dans un pissement de sang (hematurie) & dans un ulcère de la vessie ; par M. A. Vater, docteur en médecine & membre de la société royale.

UN Poméranien vigoureux & bien portant, comme il le disoit lui-même, & n'ayant jamais éprouvé aucune maladie, fut invité par un de ses amis de se joindre à lui & de venir lui tenir compagnie pour prendre les eaux de Pyrmont : il lui arriva qu'après en avoir pris pendant quelques jours, il rendit en urinant quelques petits calculs sans aucune douleur : se persuadant que c'étoit un effet avantageux pour lui, il commença d'augmenter la dose des eaux, & dans l'espace de quatre ou cinq jours il rendit plus de 40 ou 50 calculs toujours sans douleur. Il continua de boire les eaux gaiement & avec courage, s'en promettant les plus heureux effets. Ayant pris une trop grande quantité de ce fluide, il éprouva une rétention d'urine, si violente, qu'il resta trois jours sans

Année 1723.
Vol. XLIV.

pouvoir en évacuer la moindre quantité, à moins de recourir à la sonde.

Il s'abstint dorénavant de ces eaux, par l'avis des médecins qui attribuèrent la génération des calculs à cette cause. Peu de tems après ce malade se mit à voyager, & il éprouva des efforts continuels pour rendre l'urine, en sorte qu'il étoit obligé sans cesse de descendre de sa voiture & qu'il finit par pisser du sang tout pur, au milieu des douleurs les plus cruelles. Cette hématurie douloureuse continua pendant tout le voyage & ne cessa qu'à son arrivée dans sa maison, par le repos & la tranquillité, en sorte qu'il ne lui restoit plus aucune douleur. Mais toutes les fois qu'il alloit à cheval ou en voiture, les mêmes symptômes se renouveloient & ne dispaïssoient que par le repos. Il lui arriva quelquefois de rendre un ou deux calculs, mais c'étoit très-rare, & toujours sans douleurs, parce que ces concrétions étoient plus petites que celles qu'il avoit rendues lors de l'usage des eaux de Pyrmont. L'usage des médicamens délivra enfin le malade de ces accidens qui faisoient depuis deux ans le tourment de sa vie. L'hématurie cessant entièrement il ne craignit plus rien, & se croyant en pleine santé, il ne voulut plus faire de remèdes, mais voici ce qui arriva : la strangurie augmenta de jour en jour, & l'envie d'uriner se renouvela

continuellement, ce qui dure encore. L'urine qui sort en petite quantité & avec douleur, est épaisse & abondante en pituite visqueuse qui se précipite aussi-tôt comme du gluten de farine ; elle est d'une si grande tenacité, qu'elle est filante entre les doigts. Le malade jouit d'ailleurs d'un bon appétit ; il dort bien & ne sent nulle douleur dans aucune partie du corps.

Année 1724.
Vol. XLIV.

ARTICLE X.

Ouverture du corps d'une personne qui avoit éprouvé des affections calculeuses ; par M. P. Williams.

M.... âgé d'environ 40 ans avoit éprouvé depuis environ sept ans des symptômes ordinaires de calcul dans la vessie & les reins, avec l'excrétion d'une urine sanglante. Il mourut en Mai 1722, son corps ayant été ouvert, on trouva dans la vessie six calculs ovales dont la surface étoit polie & qui étoient tous de la même figure & presque de la même grandeur. Il y avoit aussi trois cellules dans chaque rein dont la forme étoit très-analogue à celle des calculs qui avoient été rendus. Les uretères étoient excessivement distendus & très-propres à laisser passer le calcul le plus volumineux du rein dans la vessie. Les viscères paroissent être dans l'état naturel.

Année 1723.
Vol. XLIV.

Année 1723.
Vol. XLIV.

On peut joindre ici l'histoire d'un autre calcul des reins, qui est contenue dans le même volume; par M. Hardiswai, Docteur en Médecine.

UN homme de 70 ans éprouva une colique des plus violentes le 19 Octobre 1722. Il survint des vomissemens & une grande difficulté d'uriner, la violence des douleurs l'empêchoit de se tenir droit & lui faisoit pousser des cris nuit & jour. Le 6^e jour de sa maladie son urine se supprima; il éprouva un resserrement douloureux autour des hypochondres, comme s'il avoit été lié avec une corde, & il sentoît dans la vessie un poids incommode & qui lui paroissoit de la grosseur d'une rave. Les symptômes empirant, il mourut le 12^e jour de sa maladie.

A l'ouverture du cadavre nous fîmes la dissection de la vessie, où nous ne trouvâmes aucun vestige de calcul; mais dans l'un & l'autre rein qui étoit en même tems rempli de fluide, on trouva un calcul volumineux, herissé & qui sembloit envoyer plusieurs rameaux dans le parenchime de ce viscère; nous ne pûmes l'obtenir dans son entier, qu'après avoir découpé par morceaux toutes les chairs. Le plus grand des rameaux s'insinuoit dans l'extrémité de l'uretère, de manière qu'il en bouchoit toute l'ouverture. Nous ne

poussâmes pas plus loin notre examen ; nous ajouterons seulement que l'épiploon étoit contracté comme une bande étroite, & étoit caché sous le foie. Cet homme avoit une habitude de corps athlétique & avoit toujours joui d'une bonne santé, à cela près que depuis quelques années il rendoit du gravier par les urines.

Année 1724.
Vol. XLIV.

ARTICLE XI.

*Conformation remarquable des voies urinaires ;
observation communiquée par M. J. Budgen.*

DANS une maison de campagne, nommée Okely, naquit en 1711 une petite enfant au dos de laquelle, vers les vertèbres inférieures, il parut une tumeur indolente, qui conservoit la couleur de la peau & qui étoit de la grosseur d'un petit œuf ; cette tumeur augmenta avec l'âge, en sorte que vers l'âge de dix ans elle avoit la forme d'une vessie de veau distendue par l'air, mais sans aucune apparence de cou. En 1728 cette tumeur égaloit en grosseur la grandeur d'une vessie de bœuf. Le 29 Janvier, lorsque cette fille fut couchée dans son lit, cette tumeur se creva & il en sortit une grande quantité de liqueur analogue à l'urine. En l'examinant de près nous y trouvâmes

Année 1729.
Vol. XXXVI.

Année 1719.
Vol XXXVI.

des tuniques, & à l'intérieur une matière muqueuse; elle offroit en outre des uretères, des veines, des artères, telles que celles que la vessie présente ordinairement. On y trouvoit une certaine communication avec les parties internes par un trou du diamètre du petit doigt, par lequel elle recevoit les vaisseaux dont je viens de parler. Le 2 Février 1728, cette petite fille mourut vers les dix heures du soir; mais les parens se refusèrent à l'ouverture du corps, & il y a apparence que si elle eût été faite, on auroit trouvé dans l'abdomen le cou de cette vessie & on n'auroit pas trouvé d'autre vessie dans l'abdomen; après la rupture de cette tumeur cette petite fille n'urina plus par le conduit naturel.

ARTICLE XII.

*Accouchement contre nature d'un fœtus par l'anus ;
observation communiquée par M. Nourse, démonstrateur d'anatomie.*

Année 1730.
N°. 416.

LE cas extraordinaire qui fait le sujet de cette observation est très-analogue à celui que M. Littre a inséré dans les mémoires de l'académie des sciences, année 1702, par lequel il conste que le fœtus dont il parle étoit dans l'ovaire, & qu'il étoit sorti au-dehors à travers le rectum. Il fust

donc de rapporter les principaux traits de cette observation.

Année 1739.
N^o. 416.

M. Nourse ayant été appelé au moment où se déclaroient les symptômes d'une fausse couche ou d'un accouchement, il introduisit les deux doigts dans le vagin, pour examiner par le toucher si l'orifice de la matrice commençoit à s'ouvrir & à s'étendre. Il trouva que le corps de la matrice étoit descendu très-bas, qu'il distendoit beaucoup le vagin, & pressoit tellement le rectum, que les excréments ne pouvoient passer aisément, & que par la pression exercée sur le cou de la vessie, la sortie des urines étoit très-gênée; mais il ne put trouver l'orifice de la matrice, ce qui lui fit juger que le fond de ce viscère s'étoit éloigné de sa position (1) naturelle, & que son orifice étoit tourné vers le rectum.

Quelques jours après le mari de la femme vint trouver M. Nourse en lui disant que la sage-femme avoit fait avancer le fœtus, mais qu'elle ne pouvoit finir l'accouchement. A son arrivée il trouva en effet que le fœtus étoit sorti par l'anüs; le cordon ombilical pendoit au-dessous de l'anüs de deux ou trois pouces; il introduisit donc les

(1) On trouvoit l'orifice de l'utérus un peu au-dessus du pubis & du même côté; c'est ce que M. Nourse reconnut avec ses doigts quoiqu'avec peine.

Année 1730.
N^o. 416.

deux doigts dans l'an^{us}, en suivant la direction du cordon, & en remontant trois pouces en haut, il trouva une ouverture qu'il jugea pénétrer dans l'utérus; cette ouverture étoit assez grande pour recevoir les extrémités de trois ou quatre doigts, & c'est par-là que passoit le cordon ombilical. Je m'assurai par-là que le fœtus avoit suivi cette voie, & en pénétrant par cet orifice dans l'uterus, je tachai d'en extraire le placenta; mais comme il étoit corrompu il se déchita entre mes doigts, de sorte que je fus obligé de le titer par lambeaux & même d'en laisser une grande partie. Le septum ou la partition qui étoit entre l'an^{us} & le vagin étoit entière, & on n'y voyoit aucun trou.

Il s'écoula beaucoup de sang grumelé par l'an^{us} ainsi que d'autres substances; ce qui continua jusqu'au 26^e jour que la femme mourut. Il se trouva à l'ouverture du corps que l'ovaire étoit distendu en une sorte de sac membraneux d'une forme irrégulière, & qui s'étendoit derrière l'utérus, où il étoit adhérent; le même sac s'étendoit du côté gauche & étoit uni à cette partie du colon qui se termine dans le rectum. Dans ce sac se trouvoit une partie du placenta & le reste des membranes déchirées. Il faut aussi remarquer que la trompe de fallope, du côté droit, s'ouvroit dans le même sac & s'y unissoit d'une

manière confuse. Il y avoit dans le même sac un autre trou d'environ quatre pouces de diamètre qui s'ouvroit au milieu du rectum & qui avoit donné passage au fœtus. Au reste ce fœtus étoit entier dans toutes ses parties, mais flétri & comme putréfié.

Année 1730.
N°. 416.

A R T I C L E X I I I.

Histoire d'une femme qui avoit une structure singulière des parties génitales, & qui cependant mit au monde un enfant ; par M. Olivier, docteur-médecin & membre de la société royale.

UNE femme de vingt-trois ans, mariée à un matelot & approchant de son terme de grossesse, consulta M. Bonnet, accoucheur, sur l'obstacle qui pourroit naître d'une structure singulière & originaire de ses parties naturelles. Or voici ce qu'on trouva d'après un examen attentif.

Année 1723.
N°. 375.

On voyoit au lieu ordinaire de l'ombilic une substance charnue, spongieuse, d'une couleur rouge fleurie, & d'une sensibilité extrême au moindre attouchement. De cette excroissance qui resta plusieurs années sans augmenter ni diminuer, on voyoit continuellement couler l'urine qui n'avoit point d'issue par aucune autre partie du corps, &

Année 1723.
N^o. 37.

qu'on ne pouvoit faire sortir en jet continu par les plus violens efforts, en sorte qu'elle saisissoit sans cesse ses vêtemens. Un peu au-dessous, à la distance environ de deux pouces, on trouvoit une autre ouverture dans laquelle on pouvoit à peine introduire le bout du doigt. C'est par cette ouverture que sortoient les menstrues depuis la puberté, ce qui faisoit voir qu'elle conduisoit au vagin & à l'utérus. A la même distance & encore au-dessous étoit un autre orifice moindre qui paroissoit communiquer avec le rectum, puisque les parties les plus liquides des déjections en sortoient. Outre ce faux anus, il y en avoit un autre qu'on pouvoit regarder comme le véritable, puisqu'il donnoit issue aux parties les plus dures des excréments, & qui occupoit l'endroit où sont dans l'état ordinaire les parties naturelles. Il y avoit des poils clair-semés autour de tous ces orifices.

Malgré cette conformation elle jouit d'une bonne santé dans sa jeunesse, & tous ceux qui connoissoient son état, la croyoient condamnée à une éternelle virginité. Un matelot l'épousa &, ce qu'on a de la peine à croire, il l'a fécondé. Le tems de la grossesse n'offrit rien de remarquable; mais il y avoit lieu de soupçonner que l'accouchement seroit très-difficile. L'orifice du vagin n'avoit pas été dilaté par l'approche de l'époux, en sorte qu'il s'étoit élevé des disputes

plaisantes entre des matrones sur la manière dont cette femme avoit été engrossée.

Année 1723.
N°. 375.

Les symptômes de l'enfantement s'étant déclarés on appela un chirurgien qui dit qu'il falloit, par une incision, ouvrir une voie au fœtus. On résista d'abord & on trouva cette opération trop cruelle; mais la femme ayant été abandonnée, comme dans un état désespéré, on laissa le chirurgien le maître de faire ce qu'il jugeroit convenable. Aussi-tôt il ouvrit par une incision tout l'isthme qui étoit entre l'orifice du vagin & le faux anus, ou ce qu'on pouvoit appeler improprement le périné. Après avoir disséqué les tégumens extérieurs, il se trouva une membrane fort épaisse, & située transversalement, qui divisoit le vagin du petit canal inférieur ou *pseudo-anus*. Après avoir ouvert cette partie, il s'offrit une voie assez ample pour parvenir à l'utérus; l'accoucheur introduisit donc sa main, il dilata l'orifice de l'utérus avec ses doigts, & ayant saisi l'enfant par la tête, il acheva facilement l'accouchement & sauva la mère.

M. Olivier a vu dans la suite cette femme qui éprouvoit seulement une chute de l'utérus, à cause de l'ouverture artificielle qu'on avoit été obligé de pratiquer.

ARTICLE XIV.

Hydatides trouvées en grande quantité dans l'abdomen d'un ascitique; par M. J. Thorpe, docteur-médecin & membre de la société royale.

Année 1721.
N°. 370.

UN homme de 58 ans, d'un tempérament cholérico phlegmatique, doué d'une santé robuste & faisant bien toutes ses fonctions, sans être adonné au vin ni aux liqueurs spiritueuses, vint me consulter pour un gonflement de l'abdomen qui étoit très-tendu & semblable à celui d'un ascitique; l'urine étoit cependant d'une bonne qualité & assez abondante; les pieds n'étoient point odémateux, la respiration étoit libre, mais comme le gonflement du ventre continuoit d'augmenter, le sang resta stagnant dans les vaisseaux hémorroïdaux, avec des nodosités souvent douloureuses; cependant l'appétit n'étoit point perdu & les forces se soutenoient.

J'avoue que ce fut une énigme pour moi & que je ne pouvois dire si cette humeur étoit sèche où humide. Pour satisfaire cependant aux indications, surtout à la suppression des hémorroïdes, je donnai des martiaux mêlés avec les purgatifs, ce qui rétablit le flux hémorroïdal, apaisa les douleurs &

débarrassa les intestins d'une grande quantité de matières qui furent évacuées. Je donnai ensuite, comme le prescrit Etmuller, contre l'hydropisie sèche, du nitre & des diurétiques de toutes les sortes, sans pouvoir produire aucun effet favorable.

Depuis cette époque le malade, lassé de remèdes, s'adressa, comme c'est l'ordinaire, aux Empyriques qui lui firent de grandes promesses & ne parvinrent qu'à lui extorquer en vain de l'argent, en finissant ensuite par l'abandonner.

L'abdomen étant énormément distendu, on alloit procéder sans retard à la paracentèse qui fut faite par M. Anel, suivant l'avis des médecins; mais le fluide contenu avoit une consistance gélatineuse & ne pouvoit sortir par le trou de la canule; il fallut donc faire une incision avec la lancette, ce qui donna issue à une matière gélatineuse d'une couleur grise-jaunâtre, plus épaisse que le blanc d'un œuf; il sortit en même tems une grande quantité de globules blancs, les uns sphériques, les autres triangulaires, vermiculaires, oblongs, réunis ou séparés, &c. Ils étoient en général de la grosseur d'une noisette, & après leur évacuation les forces du malade parurent se soutenir. Le lendemain, comme il étoit facile de juger que l'incision qui avoit été faite, n'étoit pas assez grande pour donner issue à des globules d'un plus grand volume, on augmenta l'ouverture

Année 1712.
Nº. 370.

Année 1711.
N^o. 170.

avec la lancette & il sortit encore des globules (hydatides) qui étoient plus gros qu'un œuf de pigeon; il sortit en même tems une grande quantité de matière gélatineuse & un grand lambeau d'une masse blanche qui ressembloit à une portion de l'épiploon. A cette masse adhéroient par des filamens fibreux plusieurs des globules dont on vient de parler.

En examinant la matière évacuée & en la mettant sur les charbons, la gélatine se durcissoit, devenoit blanche, & il se formoit au-dessus une pellicule. En y versant successivement de l'esprit de vitriol, de l'esprit de sel ammoniac volatil, de l'huile de tartre par défaillance, de l'esprit de vin rectifié, du vinaigre, on n'apercevoit qu'un léger endurcissement de la matière, quelle que fût la nature des réactifs dont on se servoit. Les globules étoient d'une couleur très-blanche & résistoient au toucher; en les déchirant ils répandoient une liqueur blanche, entièrement semblable au chyle, & ils étoient composés d'une pellicule ou membrane manifeste. Cette masse blanchâtre qui représentoit une portion de l'épiploon, avoit un ponce d'épaisseur & étoit d'une substance membraneuse. Le nombre des globules se portoit, autant qu'on en peut juger, à sept. à huit mille.

Le 16^e jour de l'opération le malade se trouvoit beaucoup mieux; le ventre étoit mou & sans

gonflement; la plaie offroit un bel aspect; l'urine, le pouls, la respiration étoient tels qu'on pouvoit le desirer; il n'y avoit point de fièvre & le sommeil étoit tranquille. L'évacuation de la matière gélatineuse, durant treize jours, avoit été copieuse, inodore, & quelquefois simplement sereuse avec une forte odeur, & noircissant la canule d'argent qu'on introduisoit dans l'abdomen, ce qui avoit été attribué plutôt à des corps hétérogènes corrompus qu'à une gangrène des viscères, parce que le malade éprouvoit en même tems la fièvre. Le 13^e jour après l'injection d'une décoction d'énula campana, d'aigremoine, de miel, avec une teinture d'aloës, de myrrhe & de baume de commandeur, on fit sortir la pellicule d'un de ses corps vésiculaires qui étoit certainement d'une capacité égale à celle d'un œuf de poule.

J'administre les traumatiques, les alexitères; & les fortifiants, combinés avec un régime analeptique; & j'ai lieu d'attendre un heureux succès.

Note du traducteur. On peut rapprocher ce cas des autres exemples d'évacuation d'hydatides, rapportés dans le volume d'anatomie du présent Abrégé des Transactions philosophiques.

Année 1722.
N^o. 170.



SECTION III.

MALADIES CUTANÉES.

ARTICLE PREMIER.

Procédé de l'inoculation de la petite vérole dans la nouvelle Angleterre ; par M. Henri Newman.

Année 1722.
N°. 37°.

Nous faisons ordinairement deux incisions au bras ; quelquefois une seule incision au bras & l'autre à la jambe. Nous y mettons ensuite un peu de charpie trempée dans la matière varioleuse qu'on conserve dans une fiole & qu'on a prise des pustules d'une personne qui a eu une petite vérole de la meilleure qualité, inoculée ou naturelle ; nous couvrons ensuite le tout avec l'emplâtre de diachilon. Après 24 heures on ôte la charpie & on panse les plaies une ou deux fois par jour avec les feuilles de choux. La personne inoculée continue de vivre à l'ordinaire, en évitant seulement de s'exposer à l'air par un tems orageux.

Vers le septième jour le malade éprouve les symptômes ordinaires de la petite vérole, & alors on le traite comme s'il étoit attaqué d'une fièvre putride,

putride; s'il ne peut point se tenir levé, il reste dans son lit; s'il se plaint trop de la tête on applique un cataplasme ordinaire sous la plante des pieds, & s'il se plaint beaucoup de l'estomac, on lui donne un doux émétique; cependant c'est dans la préparation du malade qu'on administre le plus souvent ce remède. Si la fièvre est trop forte, comme dans certaines constitutions, on ne balance pas de pratiquer une petite saignée, & enfin pour hâter l'éruption ou applique quelquefois un emplâtre de vésicatoires.

Vers le 3^e jour de la fièvre l'éruption commence & on fait que le nombre des pustules varie dans les divers individus; l'éruption finie, la personne inoculée ne se sent plus malade, & il ne reste plus qu'à la faire tenir chaudement, lui faire prendre du thé, lui faire manger du gruau, du potage au lait, de la panade, du pain, du beurre & autres substances simples & innocentes; quelquefois, quoiqu'elle se trouve assez bien pendant le jour, cependant elle ne peut point jouir du sommeil pendant la nuit; alors on ne lui donne point des anodins & des opiates, parce qu'on les a trouvés nuisibles, mais on se repose sur les soins de la nature & le sommeil revient avec les forces.

Le 7^e jour les pustules sont ordinairement à leur point de maturité, & elles se dessèchent

Tome I. Médecine.

H

Année 1712.
N^o. 370.

Année 1711.
N°. 370.

ensuite comme dans la petite vérole naturelle. La personne se trouve quelquefois mieux portante ensuite qu'auparavant. On a inoculé des femmes nouvellement accouchées depuis huit à dix jours & avec succès. On a vu des personnes qui avoient depuis longtems des ulcères sordides dont elles ont été guéries par l'inoculation. Des personnes débiles & d'une constitution délicate sont devenues vigoureuses & n'ont plus été sujettes à leurs maladies.

Les plaies des incisions ont paru se sécher un peu trois ou quatre jours après la fièvre d'éruption, mais après cela il s'y forme un écoulement abondant qui continue même quelques tems après que la personne est guérie à d'autres égards ; mais enfin ces plaies finissent par se cicatrifer plutôt ou plus tard ; si elles viennent à s'enflammer & à devenir douloureuses on les panse comme des plaies ordinaires.

ARTICLE II.

Lettre de M. Nettleton, médecin à Halifax dans le comté d'York, adressée à M. Whitaker, sur l'inoculation de la petite vérole.

Année 1721.
N°. 370.

J'ai déjà inoculé avec succès plus de quarante personnes & je n'en ai perdu qu'une seule dont

j'exposerai l'histoire avec impartialité. Ma manière de les préparer consistoit principalement dans un purgatif avec la rhubarbe pour les enfans, & quelquefois un émétique & une saignée pour les adultes. Plusieurs d'entr'elles ont été inoculées sans aucune préparation; mais j'ai en général reconnu, autant que j'ai pu en juger, que celles qui avoient été préparées par des méthodes convenables à leur diversité d'âge & de constitution avoient, toutes choses d'ailleurs égales, des symptômes plus favorables que celles qui avoient négligé ces précautions.

Ma méthode est de faire deux incisions, l'une au bras & l'autre à la jambe du côté opposé. Il n'importe pas, pour la marche de la maladie, que les incisions soient grandes ou petites, mais j'ai vu en général que lorsqu'elles sont très-grandes, la quantité de l'écoulement en étoit plus considérable, & les autres symptômes en général moindres; c'est aussi un moyen de prévenir les inconvéniens secondaires qui peuvent survenir après la terminaison de la petite vérole.

J'ai d'abord rassemblé un peu de matière des pustules d'une personne qui avoit eu la petite vérole naturelle, & je les ai mises dans une fiole; c'est de cette matière dont je me servoais pour l'inoculation en en versant deux ou trois gouttes dans l'incision; mais je trouvai ensuite

Il ij

Année 1722.
N°. 370.

Année 1721.
N°. 370.

qu'il étoit trop incommodé & trop difficile d'ob-
tenir une certaine quantité de matière, & je pensai
d'ailleurs avec raison que la moindre quantité
imaginable pouvoit également remplir mes vues,
je pris de petits plumasseaux de coton & je les
imbibai de matière variolense, en ouvrant avec
une lancette des pustules parvenues à leur dernier
degré de maturité. Je mettois un de ces petits
plumasseaux sur chacune des incisions, & je le
recouvrais avec un emplâtre ordinaire jusqu'au
lendemain; j'ôtois alors le coton & l'emplâtre
en laissant la plaie seulement couverte avec une
bande pour la défendre du contact de l'air. J'ai
quelquefois seulement frotté le plumasseau sur la
plaie sans l'y attacher, ce qui n'a pas manqué
de produire l'effet désiré de la même manière;
d'après les observations que j'ai faites, j'ai été
quelquefois surpris de voir en résulter la petite
vérole, lors même que j'étois assuré que la quan-
tité de matière reçue dans les vaisseaux n'étoit
pas un centième de grain.

Les personnes inoculées n'ont été assujetties
à aucun régime, mais on les a tenues seu-
lement dans un état moyen de chaleur; celles
qui étoient levées vivoient d'une manière sôbre
& régulière; elles étoient invitées à se tenir calmes
& tranquilles pour les affections de l'ame, &
d'éviter soigneusement les frayeurs & le chagrin.

Quelques-unes ont été invitées de s'abstenir, depuis l'époque de l'incision, de viande & de liqueurs fortes ; mais j'ai reconnu après cela que l'éruption n'avoit point une marche aussi régulière lorsqu'on s'assujétissoit à un régime trop propre à affoiblir. Peut-être que dans les pays chauds, où on n'est point accoutumé à se nourrir de viande, une pareille abstinence est nécessaire ; mais ici il convient de laisser manger & boire les inoculés à l'ordinaire, quoiqu'avec un peu de ménagement, jusqu'à ce que la fièvre commence à se déclarer, & c'est alors seulement, & non avant, qu'on prescrit le régime qui convient dans les cas de fièvre.

Le premier symptôme qui survenoit après l'incision étoit l'inflammation des plaies, ce qui arrivoit ordinairement vers le quatrième jour ; c'est à cette époque que les environs paroissent rouges & qu'il y a de la douleur ; deux jours après ils commencent à suppurer & à couler. Dans quelques cas l'écoulement commence plutôt, & la quantité de matière est plus considérable que dans d'autres. En général j'ai remarqué que dans ceux qui éprouvoient par cette voie un écoulement plus considérable, la fièvre étoit plus légère & les pustules de la petite vérole moins nombreuses, quoique cependant j'aie aussi observé que quelques malades alloient très-bien, lorsque le lieu de l'incision avoit paru seulement être très-rouge, sans qu'il

Année 1722.
N°. 170.

s'en fût écoulé aucune matière, comme cela arrive ordinairement lorsque l'incision est si superficielle qu'elle ne pénètre pas dans la peau proprement dite.

Vers le 7^e jour les symptômes de la fièvre commencent à se déclarer & ils sont de la même nature que ceux qu'on observe dans la petite vérole naturelle, comme un pouls accéléré, une grande chaleur & une forte soif, une douleur de tête & du dos ainsi que de la région de l'estomac, des vomissemens, des tressaillemens, & quelquefois des convulsions. Tous les inoculés ne sont point attaqués des mêmes symptômes, ni au même degré, non plus que dans le même tems; quelquefois la maladie se déclare le 7^e jour & continue sans relâche jusqu'au 11^e; d'autres fois le 8^e ou 9^e jour, & la fièvre est modérée avec de grandes intermissions; il y a des inoculés qui n'éprouvent absolument aucun mal. Durant tout ce tems les lieux de l'incision continuent à être très-affectés & à se gonfler beaucoup, de manière que la plaie paroît large & profonde, & que l'écoulement est très-considérable.

Le 10^e jour la petite vérole se montre le plus ordinairement, & quelquefois le 9^e, tandis que d'autres fois l'éruption est retardée jusqu'au 11^e; mais je n'ai jamais observé que les différences d'âge ou de constitution, ou toute autre cause, aient produit une variété de plus d'un jour, à

compter le 10^e. Le nombre des boutons étoit très différent dans divers individus; quelques inoculés n'en avoient que 10 ou 20, & plus fréquemment depuis 50 jusqu'à 200. D'autres en avoient une quantité innombrable; mais la petite vérole n'étoit jamais de l'espèce confluyente. Les boutons étoient comme dans la petite vérole discrète; ils étoient très-ronds & fleuris, & plusieurs fois ils étoient aussi gros que ceux qu'on voit quelquefois dans la petite vérole naturelle, & ils formoient ensuite une croûte ou écaille comme dans les cas ordinaires. Il arrive aussi certaines fois, surtout lorsque les incisions laissent couler une grande quantité de matière, que les boutons sont peu nombreux, qu'ils acquièrent un petit volume, & qu'après s'être montrés pendant quatre ou cinq jours, ils se dessèchent & tombent.

Après que l'éruption est formée, les symptômes fébriles s'abattent par degrés & quand l'éruption est finie, ils cessent ordinairement sans aucune fièvre secondaire & sans d'autre incommodité. A mesure que les pustules croissent & après qu'elles ont disparu, les plaies continuent à se gonfler, & à couler beaucoup; plus l'écoulement est long plus on doit être assuré d'un plein succès; mais elles ne manquent jamais de guérir d'elles-mêmes après un certain tems.

J'ai eu rarement occasion d'administrer des

H iv

Année 1711.
N^o. 370.

Année 1711.
N^o. 370.

médicamens durant le cours de la maladie, & ce n'a été que lorsque les symptômes ont été portés à un trop haut degré, que j'ai donné un doux anodin, en le répétant autant que les symptômes le demandoient; je n'ai cru l'application des vésicatoires nécessaire qu'une ou deux fois, ainsi que l'emploi des remèdes qu'on croit les plus avantageux dans la petite vérole naturelle. Après que les pustules se sont dissipées, mes inoculés ont été toujours purgés deux ou trois fois & quelquefois saignés, ce qui est la seule chose que j'ai coutume de faire, Mais quoique cette pratique puisse paroître très-facile, il y a cependant des cas qui demandent la plus grande attention, & je pense qu'on ne doit jamais entreprendre, sans l'avis des médecins, de prescrire une méthode convenable de préparation avant l'incision, non plus que le régime qu'il faut suivre dans la suite, de surveiller chaque symptôme & prêter une main secourable à la nature, lorsque les circonstances le demandent.

Il est arrivé que dans un ou deux cas les symptômes ont été plus violens qu'à l'ordinaire, & quelques inoculés ont eu après la petite vérole, des indispositions d'un autre genre : ce sont là des objets qu'il me reste à exposer.

Le premier enfant que j'ai inoculé étoit âgé d'environ un an & demi; il commença à se

trouver malade le 8^e jour & il eut une fièvre très-vive pendant deux jours. Les boutons commencèrent alors à paroître; ils furent peu nombreux devinrent très-gros. L'enfant fut aussi-tôt dans un bon état & continua à se bien porter pendant un mois; mais à cette époque ayant été transporté & tenu longtems dans un lieu froid, il tomba dans une fièvre accompagnée de toux & il fut malade pendant quatre ou cinq jours; il se rétablit après cela & depuis il a joui d'une bonne santé.

Année 1712.
N^o. 370.

Le second enfant que j'ai inoculé étoit une petite fille de deux ans & appartenoit à une famille qui venoit de perdre successivement trois autres enfans de la petite vérole; & on craignoit que le quatrième ne subît le même sort; la fièvre se déclara le 7^e jour & l'enfant continua d'être malade jusqu'au 10^e jour, époque à laquelle il éprouva vers midi de fortes convulsions. La petite vérole parut le soir, & quoique les boutons fussent plus nombreux qu'à l'ordinaire, la maladie eut une marche régulière & le rétablissement fut prompt.

Je fus appelé pour donner mes soins à l'aîné d'une famille où il restoit encore quatre enfans qui n'avoient point eu la petite vérole. Cet aîné l'eut par la voie naturelle & de l'espèce la plus maligne que j'aie jamais vue; elle étoit accom-

Année 1712.
N. 370.

pagnée des symptômes les plus effrayans, en sorte qu'il mourut le 4^e jour tout couvert de pourpre & de tâches livides. Les parens desiroient qu'on mît en usage tous les moyens possibles pour conserver le reste de la famille; mais j'étois encore sur cet objet dans une grande perplexité; car je pensois en moi-même qu'en tentant l'inoculation je me chargeois de l'évènement, quel qu'il pût être; & il étoit même probable que quelqu'un de ces enfans avoit déjà pris la petite vérole par contagion, & dans ce cas on avoit encore plus lieu de craindre. D'un autre côté il y avoit lieu de présumer qu'ils périroient tous, puisque la petite vérole qui régnoit alors étoit très-meurtrière. C'est pourquoi j'aimai mieux courir le risque de ma réputation, plutôt que d'exposer tous ces enfans à périr.

• Ils furent donc inoculés tous trois le jour qui précéda la mort de l'aîné, après avoir dit aux parens que je ne répondois pas du succès, dans le cas qu'ils eussent déjà pris la petite vérole par contagion, ce qu'on reconnoîtroit lorsque quelqu'un d'eux tomberoit malade avant le 7^e jour. Ce que j'avois craint eut lieu, puisqu'un de ces enfans fut pris de la maladie le second jour, de la même manière que l'aîné & que l'éruption parut le 3^e jour, ou plutôt qu'il se manifesta une rougeur universelle sur toute la surface de la

peau, avec plusieurs taches pourprées. Il n'y avoit aucune de ces taches près du lieu de l'incision qui commença à se gonfler un peu, comme c'est l'ordinaire vers le 4^e jour, & la petite vérole s'éleva un peu plus dans cet endroit qu'ailleurs; mais les ressources de la nature furent si accablées par la violence de la maladie que l'enfant mourut le 7^e jour. Je ne place donc pas cet enfant au nombre de ceux qui reçurent la petite vérole par inoculation, & tout fait conclure qu'elle avoit été contractée par voie de contagion; au surplus chacun peut en cela suivre son avis & je me borne à raconter les faits. Les deux autres enfans ne furent pris de la maladie que le 8^e jour de l'insertion du virus. L'éruption eut lieu le 10^e jour & la petite vérole fut très-bénigne, quoique les pustules fussent plus nombreuses que dans ceux qui avoient suc-
combé; les deux enfans se rétablirent parfaitement & ils n'ont plus été sujets dans la suite à aucune indisposition. Il faut remarquer que le plus âgé de ces deux enfans vers le tems de l'éruption eut plusieurs taches d'un rouge foncé, très-semblables à celles des deux autres enfans qui étoient morts, ce qui effraya beaucoup la mère; mais après l'éruption ces taches diminuèrent par degré & finirent par entièrement disparaître. L'autre enfant avoit été très-sujet à des convulsions depuis sa tendre jeunesse, & il en fut fort tourmenté lorsque la fièvre

Année 1711d
N^o. 37a

Année 1712.
N°. 370.

se déclara, mais elles se dissipèrent lors de l'éruption.

J'inoculai aussi une femme mariée âgée d'environ 26 ans qui eut une petite vérole très-régulière; mais huit jours après sa terminaison elle fut attaquée de frissons, qui furent suivis d'une chaleur brûlante & d'une grande douleur à la tête, qui durèrent plusieurs heures. Elle avoit eu ci-devant une fièvre intermittente, & je crus que c'étoit un nouveau paroxysme qui annonçoit son retour; mais elle n'en éprouva plus & depuis ce tems là la personne s'est bien portée.

De deux enfans qui furent tous deux inoculés en même tems le plus jeune fut peu incommodé durant la maladie, les pustules étant très-peu nombreuses & les symptômes légers; mais il en fut autrement du plus âgé. Les symptômes antérieurs à l'éruption furent plus violens, surtout le vomissement; les boutons parurent au terme ordinaire, mais ils furent très-nombreux, & quand l'éruption fut finie la fièvre ne cessa point, comme elle le fit dans tous les autres cas. Le 5^e jour la face commença à se gonfler, ce qui fut suivi d'une douleur & d'une enflure au gosier, & après cela d'une salivation qui continua jusqu'au 11^e jour, l'enflure des pieds & des mains succéda, & quoiqu'il y eût quelques signes de malignité, cependant l'usage des vésicatoires, les doux cor-

diaux & les alexipharmques concoururent à l'heureuse terminaison de la maladie, quoique les souffrances eussent été plus considérables. Après son rétablissement il se forma une tumeur dure à son épaule, ce qui l'empêchoit de mouvoir son bras; mais elle se dissipa à l'aide de quelques cataplasmes ordinaires. Dans la même famille un enfant étoit mort auparavant d'une petite vérole naturelle très-maligne.

Année 1722.
N°. 370.

J'inoculai aussi une petite fille de 9 mois; après que la maladie fut terminée, la mère s'aperçut qu'une des cuisses de cette enfant étoit un peu enflée, & que la douleur qui s'y faisoit sentir l'empêchoit de remuer cette extrémité inférieure; il y avoit aussi quelques petites tumeurs à l'aîne, mais qui se dissipèrent peu de jours après; il resta seulement une dureté au genou, qui disparut aussi dans peu de tems sans venir à suppuration, & l'enfant est maintenant dans un état de parfaite santé.

Une petite fille de six ans que j'avois inoculée fut peu incommodée durant toute sa maladie; mais avant sa terminaison nous trouvâmes qu'il s'étoit formé une petite tumeur sous les muscles des lombes, qui vint à suppuration, fut ouverte & guérie en peu de tems. Sa sœur qui étoit une jeune femme de dix-huit ans eut aussi un abcès de la même espèce à la jambe, mais son siège

Année 1721.
N^o. 370.

étoit plus profond & lui causa de grandes douleurs pendant trois ou quatre jours; il en sortit après cela une grande quantité de matière & la guérison suivit de près, sans aucun autre accident.

Je me suis borné à parler simplement des cas qui offroient quelques particularités, car les autres personnes que j'ai inoculées ont eu une petite vérole si conforme à la marche ordinaire de la nature, qu'il est superflu d'en parler.

Dans deux cas l'inoculation a été sans effet; la raison en est simple; c'est que dans le premier, les parens croyoient que l'enfant avoit eu la petite vérole naturelle; mais la maladie avoit été si légère, que ces mêmes parens étoient dans le doute lorsqu'ils se déterminèrent à l'inoculation. Dans l'autre cas la matière avoit été prise de pustules desséchées, en sorte que le peu d'humidité qu'elles contenoient, les avoit rendu inefficaces pour propager le virus variolique. L'enfant auquel on inocula cette matière ne fut nullement affecté; les lieux de l'incision ne s'enflammèrent point ni ne se gonflèrent comme c'est l'ordinaire, & il ne parut aucune pustule; mais un mois après l'enfant fut attaqué de la petite vérole naturelle & la maladie eut une terminaison heureuse.

Quelques-uns de mes inoculés, après leur rétablissement, ont resté auprès d'autres enfans qui avoient la petite vérole naturelle, & il est arrivé

Souvent que dans la même famille où il y avoit eu des enfans inoculés, d'autres avoient été ensuite attaqués suivant la voie ordinaire & que les uns & les autres étoient restés ensemble souvent dans le même lit; mais je n'en ai point observé encore qui ait eu la maladie deux fois; il n'y a pas même lieu de supposer la chose possible, puisqu'on ne peut point observer de différence entre la petite vérole naturelle & l'artificielle, (si on peut s'exprimer ainsi) si ce n'est que dans la dernière les pustules sont ordinairement moins nombreuses & que tous les autres symptômes sont en proportion bien plus favorables.

Année 1722.
N°. 370.

Tel est l'exposé fidèle que j'ai cru devoir faire de la méthode que j'ai suivie pour l'inoculation de la petite vérole; je ne puis en même tems passer sous silence la vigoureuse opposition que j'ai rencontrée de la part de plusieurs médecins honnêtes & éclairés qui pensent que c'est une pratique illicite, & dont on ne peut garantir le succès. Ils ont élevé une grande majorité de voix contre moi dans cette ville, ainsi que dans celles où l'inoculation a été introduite. Je desirerois seulement que, comme ils agissent d'après un principe de conscience, ils eussent eu moins de zèle à propager des rapports faux & peu fondés, & des opinions erronnées qui ont détourné plusieurs personnes d'employer cette méthode pour leurs

Année 1722.
N°. 370.

propres enfans ; puisque l'expérience parle aujourd'hui d'une manière aussi manifeste, toutes les objections qu'on peut faire deviennent inutiles.

ARTICLE III.

Lettre du même M. Nettleton sur les progrès de l'inoculation de la petite vérole, à M. Jurin, secrétaire de la société royale.

Année 1722.
N°. 370.

DEPUIS la dernière lettre que j'ai écrite à M. Whitaker, j'ai encore pratiqué l'inoculation sur quinze personnes qui ont toutes eu cette maladie d'une manière très-heureuse ; comme il ne s'est présenté rien d'extraordinaire dans ces cas, il n'est point nécessaire de vous en rendre un compte détaillé.

Il y a maintenant six ans que la société royale a communiqué au monde savant quelques lettres écrites par des médecins distingués qui résidoient en Turquie & qui assuroient que la méthode de l'inoculation étoit depuis plusieurs années établie dans cette partie du monde avec le succès le plus constant. J'avois été témoin, ainsi que d'autres médecins Anglois, de plusieurs cas de petite vérole naturelle, qui étoient au-dessus de toutes les ressources

ressources de l'art, & je ne pus donc qu'accueillir une nouvelle méthode aisée & sûre qui prévenoit tous ces événemens funestes. J'ai été si loin de penser que ce fût un crime, que j'ai toujours cru que le devoir de notre profession étoit de faire tout ce qui peut contribuer à conserver la vie de ceux qui se livrent à nos soins. Cet objet, quoique très-important, restant négligé, quelques années après avoir été connu, je présimai que personne n'avoit osé faire les premières expériences; mais ayant appris ensuite qu'on en avoit faites à Londres avec succès par ordre du Roi, je fus porté à faire les mêmes essais. Je fus aussi-tôt convaincu que cette pratique seroit très-utile, & plus je l'ai éprouvée, plus je me suis confirmé dans mon opinion; & je crois que tous ceux qui ont été témoins de ses effets en pensent de même. On ne peut qu'avoir la plus grande reconnoissance pour la société royale, qui a publié en Angleterre une découverte aussi importante. Car quoiqu'il puisse arriver quelquefois des événemens malheureux, cependant ils sont très-rares en comparaison de ceux qu'entraîne la petite vérole naturelle. D'ailleurs, quel autre moyen préservatif nous reste-t-il lorsque celle-ci exerce sa fureur & qu'elle est très-meurtrière.

Année 1722.
N^o. 37.

Lorsque vous aurez recueilli, Monsieur, un assez grand nombre d'observations, vous pourrez démontrer que le risque du danger est si peu

Année 1721.
N^o. 37^o.

considérable en proportion de celui qui provient d'une contagion accidentelle qu'il ne peut point raisonnablement empêcher l'emploi d'une semblable pratique ; c'est ce qu'on peut d'ailleurs reconnoître par les détails suivans. A Hallifax, depuis le commencement du dernier hiver, sur 276 personnes qui ont eu la petite vérole, il en est mort 43. A Rochdalle, la proportion a été de 38 sur 177. A Leeds, de 189 sur 792. Il faut remarquer encore que, dans cette dernière ville, la petite-vérole avoit été moins meurtrière qu'à l'ordinaire. En prenant un terme moyen dans ces trois villes, il paroît qu'il est mort 22 personnes sur cent ; ce qui fait plus d'un cinquième, lorsque la petite-vérole a été contractée par la voie de contagion. J'ai pris mes calculs dans des villes ; mais cette maladie est bien plus meurtrière dans les campagnes ; j'ai fait des recherches sur cet objet dans divers villages des environs, & j'ai trouvé la proportion tantôt plus grande, tantôt moindre ; mais en prenant un terme moyen, le résultat est à peu près le même que celui que j'ai déjà indiqué pour les villes.



ARTICLE IV.

Exemple remarquable de l'infection de la petite vérole; par M. Jurin, secrétaire de la société royale.

UN jeune homme attaqué de cette espèce de petite-vérole qu'on nomme cohérente, & qui tient le milieu entre la discrète & la confluenta, tomba le sixième jour après l'éruption dans le délire pendant la nuit, & il se leva du lit malgré la résistance que lui opposèrent deux gardes-malades. Il saisit une de ces femmes par le cou avec son bras nud, & pressa si fort le front de cette femme contre sa propre poitrine qui étoit nue & couverte d'une petite vérole dans l'état de maturation, qu'il la tint quelque tems dans cette position. Elle s'échauffa en luttant avec le malade & en tâchant de s'en débarrasser, & elle s'aperçut qu'elle avoit écrasé quelques unes des pustules de la petite vérole avec son front. Cette femme avoit environ 40 ans & elle étoit d'une complexion sanguine & robuste. Elle me dit qu'elle avoit eu la petite vérole vers l'âge de sept ou huit ans, & qu'elle en avoit été couverte, quoiqu'on n'aperçût point alors des marques sur son visage. Deux jours après l'accident,

Année 1722.
N°. 373.

Année 1721.
N^o. 173.

la petite vérole commença à paroître sur son front & se porta par degrés entre 50 ou 60 pustules; elle avoit aussi un petit nombre de pustules au dos & aux côtés du cou, dans les endroits où le malade l'avoit pressée avec son bras nud; mais elle n'en avoit point dans aucune autre partie du corps. La partie inférieure de la face en étoit parfaitement exempte, & les pustules du front étoient surtout bornées à la partie moyenne & à la plus proéminente de cette partie du visage. Elles augmentèrent par degrés & vinrent à maturité de la même manière que dans la petite vérole cohérente, avec une grande inflammation & un gonflement du front & des parties joignantes de la face, surtout entre les paupières où il y avoit une petite croûte de pustules, en sorte que le sixième jour, l'œil droit étoit presque fermé ainsi que le gauche. Mais durant tout ce tems, cette femme n'eut ni fièvre ni incommodité, ni d'autre symptôme de la petite vérole que l'éruption, l'inflammation locale dont je viens de parler & la douleur. On appliqua cette nuit un vésicatoire à la nuque & le lendemain l'œil recouvra la vue, & les pustules commencèrent à se flétrir & à s'écailler. Ces croûtes, pour la durée & les apparences extérieures, ressembloient à celles de la petite vérole cohérente bénigne. Je l'ai vue chaque jour, & j'ai remarqué que le 18^e jour, depuis l'éruption des pustules, elle avoit encore des restes de croûtes sur son front.

Il résulte de l'observation précédente, que cette femme qui avoit eu la petite vérole précédemment, avoit été encore infectée par l'application immédiate & forte de la matière varioleuse sur la peau, pendant que son corps étoit échauffé par l'exercice; ce qui semble prouver qu'une pareille application est plus efficace pour communiquer la petite vérole que des émanations morbifiques qui proviennent du corps d'un malade & qui sont reçues à l'intérieur par la voie de l'inspiration; car il est évident que la femme en question, n'avoit point reçu la petite vérole par l'inspiration des miasmes varioleux, puisqu'il n'y eut point d'autres parties affectées que celles où s'étoit fait un contact immédiat. Ce fait montre qu'une personne qui a déjà eu la petite vérole peut la recevoir de nouveau à un léger degré par l'inoculation, puisque c'est encore une application plus immédiate du virus sur le sang & les humeurs d'un homme sain, que celui qui est appliqué seulement par un contact sur la peau qui n'a point été entamée & qui est dans son état d'intégrité.

Il résulte en second lieu, que l'infection communiquée à cette femme n'est point universelle, comme l'a démontré le défaut de fièvre, d'incommodité & d'éruption générale des pustules sur toute la surface du corps, & qu'il n'y a eu d'autres parties infectées que celles qui l'ont été par

Année 1712.
N°. 373.

un contact immédiat. On ne peut donc en tirer aucune preuve pour avancer qu'on est encore sujet à avoir la petite-vérole une seconde fois, de manière à avoir les symptômes ordinaires de cette maladie & une éruption générale. Le contraire est plutôt prouvé.

Enfin, le tems auquel l'infection s'est manifestée par l'apparence des pustules, est très-différent de celui qu'on observe lors de l'inoculation. En effet l'éruption, dans le cas précédent, s'est faite le second jour, pendant que dans l'autre cas l'éruption se manifeste le 10^e jour, ou un jour plutôt ou plus tard, comme le prouvent les observations de M. Veadleton, c'est ce qu'on conçoit d'ailleurs facilement, puisque l'infection ne s'étend pas, dans le premier cas, au-delà des parties qui ont reçu le contact immédiat, pendant que dans d'autres, le levain se propage dans toute l'habitude du corps, au moyen de la masse du sang, ou plutôt du système des vaisseaux lymphatiques.



ARTICLE V.

Extrait de deux lettres sur une méthode de procurer la petite vérole, en usage dans la partie méridionale du pays de Galles; par M. Williams, docteur en médecine, à M. Brady, médecin à Portsmouth.

QUELQUE nouvelle que paroisse la méthode de communiquer la petite vérole dans ce royaume, cependant j'ai à vous apprendre qu'elle étoit vulgairement pratiquée par les habitans de cette partie du pays de Galles, qu'on appelle *Pembrokeſhire*, sans pouvoir en assigner la date. Il est vrai qu'elle portoit un autre nom, c'est-à-dite celui d'achat de la maladie, comme je l'ai appris de plusieurs personnes qui procuroient la maladie par ce moyen. Il y a une femme mariée dans le voisinage qui l'a pratiquée sur sa fille, il y a environ un an & demi, avec un grand succès; celle-ci se porte maintenant très-bien, & sans user d'aucune précaution, elle a resté auprès de personnes qui ont eu cette maladie l'été dernier.

Pour communiquer la petite vérole, ou bien ils frottent avec la matière tirée des pustules, dans l'état de maturité, plusieurs parties de la peau des

Année 1723.
N^o. 375.

bras, &c., ou bien elles piquent ces parties avec des épingles ou autres pointes semblables d'abord infectées de la même matière ; & quoiqu'on omette les évacuations nécessaires, comme des purgatifs &c., cependant j'ai été instruit que la maladie est très-heureuse dans son cours, & je n'ai point appris qu'une personne inoculée ait été attaquée de la petite vérole une seconde fois.

Un des habitans de la campagne où je suis, m'a dit qu'il y avoit environ vingt-ans, qu'allant à l'école, plusieurs de ses condisciples qui étoient en grand nombre, avoient reçu à la fois la petite vérole par la méthode ci-dessus, & que la maladie avoit été exempte de tout accident. M. George Owen, ci-devant archidiacre dans le diocèse de David, m'a déclaré solennellement, que lorsqu'il alloit à l'école, on lui fit l'inoculation de la manière suivante sur la main où on en voit encore la marque. On lui frotta la peau de cette partie avec le dos de son canif jusqu'à ce que le sang commença à couler; on lui appliqua alors la matière varioleuse sur cette partie qui devint enflammée par degrés, & la petite vérole se déclara une semaine après & elle suivit heureusement sa marche ordinaire. Il en fut de même de six de ses condisciples. Plusieurs personnes m'ont dit que les mêmes expériences avoient été faites sur elles-mêmes, les uns vingt-ans, les

autres soixante ans auparavant, &c. Elles m'ont toutes assuré qu'elles n'avoient plus eu la petite vérole une seconde fois.

Année 1713.
N°. 375.

ARTICLE V I.

Extrait d'une lettre du docteur Nettleton, médecin à Halifax, à M. Jurin, secrétaire de la société royale, sur l'inoculation de la petite vérole & sur la mortalité de la petite vérole naturelle.

LES partisans de l'inoculation ont avancé deux propositions qui méritent encore d'être confirmées, savoir : *que la maladie contractée par l'inoculation est réellement la petite vérole, & qu'elle est beaucoup plus douce, plus favorable & bien moins mortelle que la naturelle.*

Année 1712.
N°. 375.

On ne dispute plus sur ce premier point comme à l'époque où cette méthode fut introduite, & on ne peut plus en douter quand on a suivi la marche de la petite vérole, soit inoculée, soit naturelle. Il n'y a point de différence entre l'une & l'autre lorsque le nombre des pustules est le même; mais dans l'une & l'autre il y a des degrés presque infinis de maladie, suivant la différence de ce nombre. Toute la différence qu'on

Année 1722.
N°. 373.

peut apercevoir entre la petite vérole naturelle & l'inoculée est que dans celle-ci le nombre des pustules est ordinairement moindre, & que tous les autres symptômes sont dans la même proportion plus favorables. Elle ressemble exactement à ce qu'on appelle la petite vérole discrète; les symptômes avant l'éruption sont les mêmes, & quand les boutons commencent à s'élever, les apparences qu'ils offrent sont les mêmes, ainsi que les périodes de maturation des pustules & de leur dessèchement; ces boutons sont d'abord d'une couleur de rose & quand ils sont en pleine maturité ils jaunissent. Ils sont aussi ronds & aussi gros que dans l'autre & lorsqu'ils sont très-nombreux l'inflammation & le gonflement de la face se déclarent aux époques ordinaires & sont suivis du gonflement des mains & des pieds. J'ai observé seulement une fois la salivation quoique les pustules fussent distinctes.

Dans la petite vérole naturelle lorsque les pustules sont en petit nombre, nous observons quelquefois quelles ne s'élèvent pas à un si grand volume, quelles ne mûrissent pas si pleinement & ne sont pas d'une aussi longue durée qu'à l'ordinaire; il en est de même de la petite vérole inoculée. En un mot comme celle-ci offre les mêmes phénomènes que la naturelle & qu'elle peut la produire par voie de contagion, il n'y a point de doute que ce ne soit

la petite vérole naturelle. On en peut donc tirer cette conséquence, *que ceux qui ont été inoculés ne sont pas plus en danger de recevoir de nouveau la maladie que ceux qui l'ont de la manière ordinaire*; & c'est ce qui est d'ailleurs confirmé par l'expérience. Nous devons avouer que cette opération peut manquer quelquefois. Ceux qui ont communiqué à la société royale quelques détails sur cette pratique telle qu'elle est en usage en Turquie ne le dissimulent pas, quoique je pense que c'est très-rare. Dans un cas je n'ai remarqué aucune éruption; les lieux de l'incision ne se sont pas plus enflammés ni gonflés que lorsqu'on fait une incision ordinaire; ce qui me fit conclure que l'application du virus avoit été sans effet, & la raison m'en étoit bien connue, (voyez la lettre ci-devant du docteur Nettleton). Dans trois autres, quoique les blessures se soient enflammées & gonflées, & que même l'écoulement ait été considérable, cependant les éruptions étoient si imparfaites qu'elles ne laissoient encore des doutes; mais deux de ces derniers ont été assez soumis à l'épreuve, puisqu'ils sont restés avec constance auprès des personnes qui avoient la petite vérole, sans la contracter, ce qui me fait croire qu'ils seront à jamais exempts de tout danger. Quant à tous mes autres inoculés, personne n'a jamais mis en doute qu'ils n'aient eu une vraie petite vérole.

Année 1722.
N^o. 371.

Année 1722.
N^o. 373.

Quant à l'autre proposition, savoir *si la petite vérole inoculée est bien moins dangereuse que la naturelle*, je ne puis en établir la vérité que par voie de comparaison, autant que mon expérience peut s'étendre. C'est dans cette vue que j'ai rapporté ce que j'ai observé dans cette ville & dans la campagne, & je me suis procuré aussi des détails sur les villes des environs où la petite vérole a été épidémique & je puis garantir que ces détails ont été faits avec toute l'exactitude possible, soit sur le nombre de ceux qui ont eu le petite vérole, soit sur ceux qui en ont péri.

	Nombre de petites véroles.	Morts.
A Halifax.	276	43
Dans une partie de la		
paroisse d'Halifax. .	297	59
Dans une autre partie		
de la même paroisse.	268	28
A Bradfort.	129	36
A Leeds.	792	189
A Wakefield.	418	57
A Rochdale.	177	38
A Aftton Under Line.	279	56
A Macclesfield. . . .	302	37
A Stockport.	287	73
A Hatherfield.	180	20
TOTAL.	3405	636

Je sens bien que vous demanderiez un grand nombre d'observations avant que de pouvoir en tirer des conclusions certaines. Je me bornerai donc à dire que dans cette parrie de l'Angleterre il est mort environ 19 sur 100 parmi ceux qui ont eu la petite vérole naturelle, pendant que sur 61 inoculés il n'en est mort aucun, car celui dont j'ai rapporté la mort est loin de pouvoir être compté au nombre des victimes de l'inoculation, & j'en atteste ici tout juge impartial.

Année 1711.
N°. 373.

A R T I C L E V I I .

Lettre du docteur Caleb Cotefworth , médecin de l'hôpital de Saint-Tomas-de-Londres , sur le danger de la petite vérole naturelle comparé à celui de la petite vérole inoculée.

On ne peut que regarder la petite vérole comme une calamité, puisque cette ville & ses faubourgs ont offert quelquefois plus de cent victimes par semaine de cette cruelle maladie; or on ne peut opposer d'autre moyen plus efficace à ses ravages que l'inoculation qui a été prônée vivement d'un côté & fortement combattue de l'autre. Je n'entrerai point dans cette dispute & je me bornerai à exposer sans passion, sans préjugés & sans aucune

Année 1711.
N°. 373.

Année 1722.
N^o. 173.

vue particulière, les observations & les calculs que j'ai faits sur l'état comparatif de la petite vérole naturelle & de celle qui est communiquée par inoculation, afin qu'on puisse en porter un jugement impartial.

Le nombre de ceux qui ont été inoculés en Angleterre, autant que j'ai pu en être instruit d'après les informations les plus exactes, est tel que je vais le rapporter :

Personnes inoculées

par MM. Nettleton.	61
• Claude Amyand.	17
Maitland.	57
Dover.	4
Weymish.	3
Jonhson.	3
Brady à Portsmouth.	4
Smith & Dymer.	13
Waller.	3
Une femme de Leicester.	8
Williams à Haverfort Wert.	6
Deux autres personnes du même lieu.	2
Franch à Bristol.	1

T O T A L . . . 182

P A R M I ce nombre les adversaires de l'inoculation soutiennent que deux personnes sont mortes

de la petite vérole inoculée, & ses partisans re-
pliquent que leur mort a été occasionnée par
d'autres causes. Si nous voulons éviter toute dis-
pute, nous établirons que le danger de mourir
de la petite vérole inoculée, autant que nous
pouvons en juger par notre propre expérience,
est de deux sur 182 ou d'un sur 91.

Année 1722.
N°. 373.

M. Mather, dans une lettre écrite de Boston
dans la nouvelle Angleterre en Mars 1721, rap-
porte que sur près de trois cens inoculés, il en
est mort cinq ou six, ou dans le cours de la ma-
ladie ou à sa suite pour d'autres maladies &
accidens, surtout pour avoir contracté la petite
vérole par la respiration avant qu'elle pût être
communiquée par l'inoculation.

Pour éviter encore toute dispute supposons
qu'il soit mort cinq personnes sur trois cens par
la petite vérole inoculée, & indépendamment de
route autre maladie ou d'accident, le risque de
l'inoculation sera dans cette supposition d'un sur
soixante. Mais il paroît, d'après l'exposé des faits,
que les inoculateurs de la nouvelle Angleterre
n'ont point été aussi réservés sur le choix de leurs
sujets que les Anglois d'Europe, car M. Mather
nous dit que les inoculés étoient jeunes ou vieux
depuis l'âge d'un an jusqu'à 70, foibles ou forts,
& par d'autres relations nous apprenons que les
femmes grosses, aussi bien que les nouvelles

Année 1711.
N^o. 373.

accouchées, avoient été soumises à l'opération. Sans doute que la grandeur du danger auquel on étoit exposé par la petite vérole naturelle qui exerçoit alors ses plus grands ravages, rendoit plus hardis les inoculateurs.

Pour juger maintenant du danger respectif de la petite vérole naturelle & de l'inoculée, afin qu'on en puisse porter un jugement impartial, j'ai consulté les registres annuels de mortalité en remontant jusqu'à l'année 1667, qui est l'époque de la peste & de l'incendie de la ville de Londres, & j'en ai donné les extraits dans les tables suivantes.

La première de ces tables comprend vingt ans, & on établit pour chaque année le nombre des morts, ainsi que de ceux qui ont péri de la petite vérole, & on en a fait deux colonnes particulières. Dans les autres colonnes on établit les proportions respectives.

La seconde table renferme un espace de vingt-deux ans suivant la même méthode. Il paroît que la proportion entre le nombre total des morts & ceux qui ont succombé à la petite vérole est à peu près la même, en examinant le résultat pour chacune de ces suites d'années.

Les quatorze années intermédiaires entre 1786 & 1791 ont été négligées, parce que dans les relevés de ces années, on n'a pas distingué les résultats qui appartiennent à la petite vérole ou à la rougeole
comme

comme dans les années qui précèdent ou qui suivent, en sorte que les deux maladies sont réunies dans le même article & qu'on n'en peut point tirer une induction pour les personnes mortes de la petite verole.

Année 1722
N°. 371.

T A B L E I^{re}.

Années.	Total des enterremens.	Morts de la petite vérole.	Proportion sur 1000 morts.	Rapport simplifié.
1667 ..	15842 ..	1196 ..	75 ..	$\frac{1}{13}$
1668 ..	17278 ..	1987 ..	115 ..	$\frac{1}{9}$
1669 ..	19432 ..	951 ..	49 ..	$\frac{1}{20}$
1670 ..	20198 ..	1465 ..	73 ..	$\frac{1}{14}$
1671 ..	15729 ..	696 ..	44 ..	$\frac{1}{23}$
1672 ..	18230 ..	1116 ..	61 ..	$\frac{1}{16}$
1673 ..	17504 ..	853 ..	49 ..	$\frac{1}{21}$
1674 ..	21201 ..	2507 ..	118 ..	$\frac{1}{8}$
1675 ..	17244 ..	997 ..	58 ..	$\frac{1}{17}$
1676 ..	18732 ..	359 ..	19 ..	$\frac{1}{12}$
1677 ..	19067 ..	1678 ..	88 ..	$\frac{1}{13}$
1678 ..	20678 ..	1798 ..	87 ..	$\frac{1}{12}$
1679 ..	21730 ..	1967 ..	91 ..	$\frac{1}{11}$
1680 ..	21053 ..	689 ..	33 ..	$\frac{1}{32}$
1681 ..	23971 ..	2982 ..	125 ..	$\frac{1}{8}$
1682 ..	20691 ..	1408 ..	68 ..	$\frac{1}{15}$
1683 ..	20587 ..	2096 ..	102 ..	$\frac{1}{20}$
1684 ..	23202 ..	156 ..	7 ..	$\frac{1}{149}$
1685 ..	23222 ..	2496 ..	107 ..	$\frac{1}{9}$
1686 ..	22609 ..	1062 ..	47 ..	$\frac{1}{21}$
20 ann.	398200	28459	71 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{14}$

Chaque an.

moyenne.. 19910 .. 1423 .. 71 $\frac{1}{2}$.. $\frac{1}{14}$

Tome I. Médecine.

K

TABLE II.

Année, 1712.
N°. 171.

Années.	Total des enterremens.	Morts de la peste vérolée.	Proportion sur 1000 morts.	Rapport simplifié.
1701 . .	20471 . .	1095 . .	53 . . .	$\frac{1}{19}$
1702 . .	19481 . .	311 . .	16 . . .	$\frac{1}{63}$
1703 . .	20720 . .	898 . .	43 . . .	$\frac{1}{23}$
1704 . .	22684 . .	1501 . .	66 . . .	$\frac{1}{15}$
1705 . .	22097 . .	1095 . .	50 . . .	$\frac{1}{20}$
1706 . .	19847 . .	721 . .	36 . . .	$\frac{1}{28}$
1707 . .	21609 . .	1078 . .	50 . . .	$\frac{1}{20}$
1708 . .	21291 . .	1687 . .	79 . . .	$\frac{1}{13}$
1709 . .	21800 . .	1024 . .	47 . . .	$\frac{1}{21}$
1710 . .	24620 . .	3138 . .	127 . . .	$\frac{1}{8}$
1711 . .	19833 . .	915 . .	46 . . .	$\frac{1}{22}$
1712 . .	21198 . .	1943 . .	92 . . .	$\frac{1}{11}$
1713 . .	21057 . .	1614 . .	77 . . .	$\frac{1}{13}$
1714 . .	26569 . .	2819 . .	106 . . .	$\frac{1}{9}$
1715 . .	22232 . .	1057 . .	48 . . .	$\frac{1}{21}$
1716 . .	24436 . .	2427 . .	99 . . .	$\frac{1}{10}$
1717 . .	23446 . .	2211 . .	94 . . .	$\frac{1}{11}$
1718 . .	26523 . .	1884 . .	71 . . .	$\frac{1}{14}$
1719 . .	28347 . .	3229 . .	114 . . .	$\frac{1}{9}$
1720 . .	25454 . .	1440 . .	57 . . .	$\frac{1}{18}$
1721 . .	26142 . .	2375 . .	91 . . .	$\frac{1}{11}$
1722 . .	25750 . .	2167 . .	84 . . .	$\frac{1}{12}$
22 ann. .	505598	36620	72 . . .	$\frac{1}{14}$
à chaque ann. moyenne. .	22982 . .	1665 . .	72 . . .	$\frac{1}{14}$
En 42 ann. .	903798 . .	65079 . .	72 . . .	$\frac{1}{14}$
à chaque ann. moyenne en prenant les 42 années. . .	21519 . .	1590 . .	72 . . .	$\frac{1}{14}$

Il paroît par ces tables que la mortalité causée

par la petite vérole à l'espèce humaine, fait le quatorzième du total, & que par conséquent le risque qu'il y a de périr de cette maladie est d'un sur quatorze: le risque augmente après la naissance, à mesure qu'on avance en âge comme on va le faire voir.

D'après les estimations ci-dessus on peut avancer que dans le cas de plusieurs personnes atteintes de la petite vérole, le risque qu'elles courent l'une dans l'autre de mourir de cette maladie est de plus d'un sur quatorze, ou, ce qui revient au même, qu'il doit y en avoir moins de treize qui se rétablissent de cette maladie pour un qui succombe. Car puisqu'un quatorzième de l'espèce humaine meurt de la petite vérole & que les autres treize meurent de diverses autres maladies, si ces treize avoient tous la petite vérole & s'ils en guérissent, avant de tomber dans les maladies qui leur ont été mortelles, alors treize se rétablissent de la petite vérole & un autre y succomberoit. Mais comme il est notoire qu'un grand nombre, surtout de jeunes enfans, périssent d'autres maladies avant d'avoir eu la petite vérole, il est clair qu'un moindre nombre que treize doit se rétablir de cette maladie pour un qui en meurt.

Déterminer combien parmi ces treize parties de l'espèce humaine il en meurt sans avoir eu la petite vérole, c'est une tâche très-difficile; mais il est aisé de voir qu'il faut en faire une déduction considérable.

K ij

Année 1734.
N°. 373.

Année 1722.
N°. 373.

En premier lieu les deux articles d'enfans venus morts au monde & d'enfans abortifs, qui sont mis dans tous les registres annuels comme une partie du nombre des enterremens, en doivent être évidemment déduits. On doit joindre à cela les morts provenus d'étouffement, les convulsions, la venue des dents, l'hydrocephale, les vers, les rachitis, les obstructions du foie, la coqueluche, & ces articles, suivant les relevés des registres, passent au-delà de 386 sur 1000 morts. On pourroit faire ici d'autres considérations qui font penser que pour une personne qui meurt de la petite vérole, il s'en rétablit entre sept & huit; mais pour avoir une évaluation plus exacte, une personne a été chargée dans certaines villes d'aller de maison en maison pour s'informer de ceux qui avoient eu la petite vérole & du nombre de ceux qui en étoient morts l'année précédente. Ce sont là des soins dont s'est occupé M. Nettleton l'année dernière dans différentes villes du Comté d'York; on a fait la même chose à Chicester & à Haverford-West. Voici les résultats qu'ont donné les relevés :

	<i>Attaques de la petite vérole. Morts.</i>	
Dans différentes villes du Comté d'York.	2405	636
A Chicester.	994	168
A Haverford - West.	227	52
TOTAL.	4616	856

Il paroît par-là qu'en prenant un terme moyen

il périt parmi les personnes attaquées de la petite vérole 19 sur 100, ou presque le cinquième du total. Il faut remarquer que parmi les 82 personnes qui reçurent la petite vérole par inoculation la même année, & dans le voisinage des mêmes villes il n'y en eut pas une seule qui en fût la victime.

Année 1721.
N°. 173.

M. Mather observe dans la lettre ci-dessus que sur plus de 5000 personnes qui eurent la petite vérole à Boston dans la nouvelle Angleterre en moins de six mois il en périt près de 900, ce qui fait à peu près un sur six.

Parmi les personnes de tout âge qu'on inocule sans avoir égard à la santé ferme & délicate du sujet, comme on l'a pratiqué dans la nouvelle Angleterre, il paroît, d'après les évaluations qu'on en a faites, qu'il en meurt un sur soixante.

Mais lorsqu'on fait un heureux choix des individus, comme le pratiquent les inoculateurs Anglois, la chance n'est que d'un sur quatre-vingt-onze. Encore même, s'il est prouvé que les deux personnes inoculées qui sont mortes en Angleterre, suivant les rapports ci-dessus, ont succombé à d'autres maladies ou accidens, il s'ensuit qu'il n'en périt pas une seule par l'inoculation, lorsqu'on prend les précautions convenables. Il est même prouvé que parmi plusieurs milliers qui, dans l'espace de quarante ans, ont été inoculés à Constantinople par une femme Grecque qui con-

Année 1722.
N^o. 373.

tinue encore cette pratique, malgré son grand âge, il n'y a pas eu un seul événement malheureux, comme me l'a assuré M. le Duc, originaire de Constantinoble, qui a été inoculé lui-même par les soins de son père, médecin distingué de cette ville.

SECTION IV.

DES FIÈVRES ET AUTRES MALADIES.

ARTICLE PREMIER.

*De l'usage de l'eau froide dans les fièvres; par
M. Cyrille, professeur de médecine à Naples.*

Année 1729.
N^o. 429.

L'USAGE de l'eau froide & de tout ce qui est froid, dans le cas de fièvre n'est (1) point récent; car on en trouve souvent des exemples parmi les anciens médecins. Dans la fièvre ardente, ils

* (1) On a donné un extrait de ce mémoire dans le volume de pharmacie & matière médicale du présent Abrégé, mais pour bien connoître les indications qui peuvent rendre l'eau froide efficace, cette méthode doit être développée.

accordoient après le plus haut degré du paroxisme une boisson abondante d'eau ou de tout autre fluide rafraîchissant, en sorte qu'il arrivoit souvent que l'effervescence febrile se calmoit & que le malade plus tranquille tomboit dans une sueur abondante. Mais guerir les fièvres avec la seule eau de neige donnée pendant plusieurs jours, sans l'emploi d'aucun autre médicament, ou même sans user d'alimens, c'est je crois une pratique nouvelle, & à dire le vrai un peu hardie, tentée à Naples d'après une méthode venue d'Espagne, & communiquée par un petit écrit mal rédigé. C'est par cette méthode que nous avons vu des malades arrachés à la mort contre toute attente. Les médecins prudents restèrent d'abord en suspens, & furent effrayés, de voir les malades ainsi inondés; mais enfin encouragés par des évènements heureux & fréquens, ils tâchèrent de rendre sûre & mieux entendue une pratique qu'on employoit d'abord aveuglément sans aucune distinction de la maladie & des circonstances où se trouvoit le malade: il n'y a plus de médecin qui balance maintenant à l'égard de cette méthode de traitement. Il me reste à en expliquer les préceptes en détail. *Le régime aqueux*, car c'est-là le nom que je vais lui donner, demande des précautions comme tous les grands remèdes, afin que ce moyen de guérison ne devienne point une cause destructive.

Année 1729.
N^o. 409.

La première règle est, qu'après quelques heures d'une abstinence de tout aliment, & lorsque l'estomac est entièrement vide, on commence à boire l'eau refroidie par la neige à la dose d'une ou deux livres, suivant l'état, les forces & la soif du malade. La même dose doit être répétée à toutes les heures, ou du moins de deux en deux heures, jour & nuit sans aucun relâche, à moins que le sommeil ne survienne & ne l'empêche. Les malades doivent s'abstenir de tout aliment. Car il conste par l'expérience que les alimens mêlés avec une quantité d'eau se corrompoient dans l'estomac, & que le fluide lui-même en étoit altéré & devenoit moins propre à pénétrer les plus petits vaisseaux, que par conséquent il ne pouvoit point parvenir dans toutes les parties du corps, soit externes soit internes, pour en précipiter & expulser les humeurs nuisibles. Cette diète rigoureuse doit-être continuée plusieurs jours, jusqu'à ce que la fièvre éprouve une intermission ou même cesse entièrement, & que le malade lui-même se plaigne de tems en tems de la faim; car si on donne trop tôt des alimens, la fièvre se renouvellera avec ses symptômes ordinaires. C'est pourquoi nous interdisons tout aliment aux malades jusqu'au septième & même jusqu'au dixième jour & au-delà, en continuant toujours le régime aqueux, & on n'a rien à craindre d'une pareille abstinence, soit que

par la froideur de l'eau les pores de la peau deviennent plus étroits, que la transpiration diminue ainsi que la nécessité de réparer les forces, soit que l'eau elle-même tiennne lieu d'aliment par son cours continuel, en entraînant les particules alimentaires répandues dans toutes les parties du corps & les fasse servir à leur destination. Quoi qu'il en soit, la pratique de chaque jour apprend que les alimens pris avec une boisson abondante d'eau, s'y mêlent & produisent de grands dangers, en sorte qu'aussi-tôt qu'on permet au malade de manger, il faut qu'il s'abstienne de l'eau ou qu'il en boive très-peu, & même il faut laisser un intervalle de quelques heures après la boisson de l'eau froide, afin que les alimens puissent se digérer commodément dans l'estomac.

Il faut alors choisir des substances nourissantes & d'une digestion facile, comme le pain cuit dans l'eau pure, des pastilles faites avec la miette de pain, un œuf frais, & à peine se permettre un mets succulent. C'est-là ce qu'il faut donner d'abord en petite quantité deux fois le jour, & passer ainsi par degrés à un dîner plus propre à réparer les forces, en soupant toujours légèrement. Mais il faut s'abstenir de viande pendant un mois & au-delà. Lorsque les malades ont repris ce genre d'aliment, il ne faut point abandonner entièrement l'eau; mais après la digestion des substances

Année 1710.
N°. 409.

Année 1729.
N^o. 409.

solides qu'on aura prises, il faudta encore en prendre deux ou trois dosés, jusqu'à ce que la maladie ait entièrement cédé, que les forces soient revenues & que le malade soit en pleine convalescence.

Dans le cours du traitement, il faut avoir quelques attentions particulières. Il faut observer principalement si l'eau que le malade prend se fraye un passage libre, ou non. Lorsque les urines, au moins après l'espace d'un jour, deviennent par degrés plus abondantes & décolorées, on doit juger alors, que l'eau s'est ouvert une voie libre. Quelquefois le premier jour, le second ou le troisième, le ventre se lâche avec des déjections d'abord féculentes & ensuite de diverses humeurs. On doit alors concevoir de l'espoir, car la fièvre a coutume alors de se calmer, ainti que tous ses symptômes. Ce qui est si vrai, que si le second ou le troisième jour se passe sans que le malade pousse des déjections, toute la quantité d'eau prise en boisson prend la voie des urines; alors, par le moyen des clystères, & à l'aide de l'huile d'amandes douces prise par la bouche, on lubrifie les premières voies; car les matières consistantes qui y sont retenues & qui fomentent la fièvre, ou bien que la maladie a coutume de produire dans le corps des febricitans, & qui ne peuvent être expulsées par les couloirs très-étroits des urines, ne peuvent prendre que

la voie spacieuse des intestins. Il faut ajouter à cela, que le conduit intestinal étant dégagé, l'eau pourra facilement parvenir jusqu'aux derniers replis du corps & remédier à l'état du sang & des autres liqueurs secondaires.

Année 1729.
N°. 409.

Mais si, comme cela arrive souvent, il se forme des tumeurs aux parotides, ou qu'on observe quelque chose de purulent dans les matières excrémentitielles des déjections ou des urines, ce qui indique un abcès déjà parvenu à sa maturité & rompu ; il ne faut point interrompre l'usage de l'eau, mais au contraire y insister davantage. L'eau, en effet, qui a tant d'avantage pour chasser au dehors les humeurs stagnantes dans les parties internes, pourra aussi expulser, par les divers organes sécrétoires du corps, les humeurs qui sont déjà parvenues à leur maturité, & préserver de la gangrene les parties qui ont été le siège de l'abcès, comme on le voit très-souvent dans la pratique. Celle-ci cependant nous a appris que les abcès produits dans le cerveau & la poitrine ne peuvent point céder aussi facilement à l'usage de l'eau, quoique j'aie vu plusieurs malades qui, après avoir rejeté du pus par les narines, les oreilles & la bouche, ou à la suite de la toux par les poumons, ont été parfaitement guéris. On a coutume, lorsque de pareils symptômes se manifestent de ne point négliger le secours de l'eau ; mais si les malades tombent dans la

Année 1729.
N°. 409.

stuteur & la somnolence, on leur applique des vésicatoires ou d'autres topiques irritans; ou s'ils éprouvent une grande difficulté de respirer, on leur fait prendre de l'huile récente d'amandes douces ou de l'eau tiède. Il arrive quelquefois, surtout les premiers jours du régime aqueux, qu'il se déclare un vomissement violent. Si alors les matières hétérogènes sont chassées par le haut, comme c'est l'ordinaire, on doit regarder cela comme d'un bon augure; car le vomissement cesse après avoir soulagé le malade. Si le malade rejette par le vomissement l'eau qu'il a prise, il faut l'obliger à en boire à différentes reprises rapprochées, car les humeurs malignes ont coutume de suivre le liquide ainsi rejeté. Il faut donner avec constance & avec assiduité l'eau, lorsque le hocquet survient, car comme c'est l'eau qui l'excite, c'est à l'eau à le calmer en en buvant continuellement. Si la sueur survient pendant l'usage de l'eau froide, elle a coutume de produire un grand abattement qui peut devenir dangereux. Cela peut paroître un paradoxe à ceux qui attendent la sueur, de la boisson réitérée de l'eau froide, & on sait que le grand fébrifuge de M. Hancock consiste en cela. Mais dans l'usage du régime aqueux, si la sueur survient, il faut la réprimer en donnant de l'eau encore plus froide & plus abondante, & il faut rafraîchir le corps du malade, en lui ôtant ses

couvertures, en le ventillant & en ouvrant un courant d'air dans l'intérieur de la chambre. Il y a même des médecins qui ne craignent pas de l'asperger avec de la neige en flocons.

Année 1719.
N. 409.

- Ce qui afflige de plus le médecin durant le régime aqueux, c'est que les malades tombent dans le délire, la léthargie ou une extrême prostration des forces & qu'ils deviennent par-là incapables de prendre de l'eau assez abondamment & assez fréquemment. Alors il faut employer tous ses soins pour que le dernier remède qui leur reste, à savoir l'eau, soit encore employé, ce que j'ai quelquefois obtenu en introduisant par les narines ou la violence, la neige dans la bouche des délirans, & de ceux qui sont dans une extrême prostration de forces ou dans un profond assoupissement.

Après avoir exposé la méthode du régime aqueux & la manière avec laquelle il faut aller au-devant des symptômes, il me reste à exposer dans quelles fièvres & dans quel période de ces fièvres il faut recourir à ce remède. En général, au commencement des fièvres, il ne convient pas de recourir aussi-tôt à l'eau; car, comme dans cette époque toutes les humeurs sont dans un état de crudité, on espéreroit inutilement pouvoir chasser les humeurs par une boisson abondante d'eau. Il en est autrement dans le plus haut période de la maladie,

Année 1719.
N^o. 409.

lorsque le malade est réduit au dernier danger : c'est alors qu'il est à propos de recourir au moyen salutaire de l'usage de l'eau. Car la matière qui foment la fièvre par une effervescence journalière, étant déjà parvenue à une certaine attrition de ses particules ou à une ombre de coction, elle peut, par une administration abondante d'eau & par une combinaison avec les humeurs du corps, se précipiter, se séparer & prendre les voies qui lui seront ouvertes. Par-là nous avons vu souvent des agonisans revenir à la vie par ce secours puissant, & se rétablir. C'est par une omission de cet avis salutaire, que des médecins trop hardis, en administrant le régime aqueux au commencement ou pendant l'accroissement des maladies, ont augmenté le danger ou même conduit les malades au tombeau. Je ne dois point cependant dissimuler que dans les fièvres bilieuses & qui ont pour cause des humeurs tenues, on peut plus hardiment donner l'eau au commencement, & on en voit facilement la raison.

Dans les fièvres aiguës, malignes & mortelles de tout genre, il faudra recourir au régime aqueux lorsque le malade paroîtra dans le danger le plus imminent; car ou bien ces fièvres sont d'une nature à tendre à la concretion du sang & alors, en donnant une boisson abondante, on pourra lui rendre la fluidité qu'il étoit sur le point de perdre ;

ou bien la masse du sang a été réduite, par la force de la fièvre, à un degré extrême de renuité, avec un grand abattement; dans ce cas l'eau, surtout froide, peut dissoudre les sels âcres qui tiennent eux mêmes en dissolution la masse du sang, & éteindre leur activité malfaisante; de-là naît l'explication du phénomène qui consiste en ce que le corps du fébricitant presque refroidi devient chaud comme par miracle par une •boisson abondante d'eau. Soit, en effet, que le sang par un afflux pernicieux d'esprits vienne à perdre sa fluidité ou qu'il en acquière une trop grande par un état de dissolution, une grande abondance d'eau froide, secondée par une constriction des pores de la peau, empêchera également la dissipation des esprits & pourra rappeler la chaleur évanouie.

Il faut donc répéter ce que j'ai déjà insinué au commencement, qu'il ne faut prescrire aux fébricitans que l'eau de neige; car d'abord les malades se gorgent d'eau & ensuite après les premières prises, ils ont coutume de refuser l'eau chaude; d'ailleurs, par la froideur de l'eau, les fibres de l'estomac prennent de l'énergie & cet organe devient plus propre à chasser le liquide jusques dans la masse du sang; au contraire, l'eau tiède donne de l'atonie aux fibres, elle gonfle le ventricule par sa masse, elle le presse par son poids & enchaîne son activité.

Année 1729.
N°. 42.

Année 1729.
N. 409.

Il ne faut cependant pas dissimuler que nous prescrivons quelquefois l'eau chaude & non froide, lorsque la fièvre est jointe avec quelque inflammation du poulmon ou de quelque viscère, de peur qu'un liquide froid ne dispose à la gangrène des parties enflammées. Mais on ne peut pas nier que même dans ces cas, on passe quelquefois à l'usage de l'eau un peu froide ou même de celle de neige, lorsque les malades dégoûtés de l'eau tiède refusent d'en boire constamment. Nous croyons alors qu'il vaut mieux boire beaucoup d'eau froide, qu'une petite quantité d'eau tiède qui ne peut produire aucun effet.

Suivant ces préceptes dictés par l'expérience, aidée des lumières de la raison, après avoir prescrit plusieurs fois dans les fièvres le régime aqueux, nous en avons remarqué des effets très-heureux. D'autres fois cependant nous avons été frustrés dans notre attente, ce qui est d'ailleurs le partage de la médecine dans l'emploi même des meilleurs remèdes; car ses méthodes ne sont pas toujours si certaines qu'elle ne puisse tromper quelquefois les praticiens les plus exacts.

Je n'ai parlé jusqu'ici que de l'usage de l'eau froide dans les fièvres; cependant il y a d'autres maladies dans lesquelles nous avons tenté, avec avantage le régime aqueux, en nous laissant conduire par une sorte d'analogie. Telles sont les diarrhées,

diarrhées, les dyssenteries, la colique, la lienterie; telles encore l'ischurie rénale & la dysurie, ou bien la cardialgie, le *colera-morbus* & l'affection hypochondriaque & hystérique; il y a même des exemples (qui le croiroit) d'hydropisie guérie par une boisson abondante d'eau; car en ouvrant ainsi les voies des reins & du conduit intestinal, l'eau se fraye un passage, ainsi que le fluide qui produisoit l'hydropisie. On a même quelquefois éprouvé des effets salutaires du régime aqueux dans la petite vérole, surtout dans le troisième période, lorsque le malade est dans un extrême danger, par un abcès formé au cerveau ou à la poitrine. Par ce moyen on a vu quelquefois sortir une quantité immense de pus par la voie des narines & par la bouche. Cependant alors on n'interdit point tout aliment durant le régime aqueux; mais dans les maladies chroniques, on fait prendre une boisson abondante d'eau trois heures avant le dîner & huit heures après ce repas.

Il faut remarquer, par rapport au régime aqueux, qu'on peut plutôt pêcher par défaut que par excès à l'égard des fébricitans, & qu'il faut d'autant plus y insister, qu'il paroît prendre la voie des selles ou des urines. Que le médecin tente donc ce moyen dans ces cas désespérés, car nous avons été témoins quelquefois de guérisons les plus inattendues. Telle est la méthode qui est accom-

Année 1729.
N°. 409.

pagnée d'un si grand succès dans nos climats ; (Naples) qu'il n'y a point maintenant de remède plus communément employé. En seroit-il de même dans les pays froids ? Il est sûr que cette méthode a été pratiquée en Italie d'une manière très-heureuse pendant l'hiver. Je laisse à décider aux médecins qui exercent dans les pays froids, si cette pratique y seroit aussi favorable.

ARTICLE II.

*Extrait d'une lettre écrite de Tunis par M. Shaw ;
à M. Hanfloane , président de la société royale ,
sur les fièvres intermittentes qui règnent à Tunis
& les moyens de les guérir.*

Année 1729.
N°. 411.

Je viens d'apprendre par une lettre d'Angleterre , que plusieurs parties de ce royaume ont été affligées cette année de beaucoup de fièvres intermittentes , & comme vous possédez une espèce de scabieuse qui est très efficace contre cette maladie , j'ai cru devoir vous envoyer un échantillon de ses feuilles supérieures , car celles d'en bas sont desséchées dans la saison actuelle. Cette plante est semblable à la 20^e espèce dont Morisson donne la figure dans le chapitre XXI, sect. 6 , tab. 15 des plantes corymbifères. La tête est seulement

ronde, comme on l'y trouve décrite. J'ai donc cru devoir l'appeler *scabiosa*, *flore pallide purpureo*, *capitulo oblongo*, *foliis superioribus incisfis, inferioribus integris serratis*. La méthode de la préparer est d'en mettre une poignée dans une quarte d'eau & de la faire bouillir jusqu'à réduction d'une pinte. On fait prendre une tasse de cette décoction à jeun un peu avant le dîner, ainsi que la nuit, sans avoir aucun égard à l'intervalle ou à l'intermission de l'accès, comme pour le quinquina. Ce remède opère ordinairement par les selles ou par l'urine. J'ai vu seulement cette plante ici à Oran, à Gibraltar & au Mont-Liban où j'ai appris ses propriétés extraordinaires. Si elle n'est point connue en Angleterre, quoique cependant je croie le contraire, puisque M. Robart me l'a fait voir à Oxford, je vous prie de me l'écrire & j'aurai soin de vous en envoyer une certaine quantité séchée, ainsi que des semences de la même plante. Il y a ici d'autres plantes dont j'ai fait usage contre diverses maladies & souvent avec succès, & j'aurai soin de les faire connoître dans la relation de mon voyage; mais il n'y en a aucune qui soit autant en vogue & en estime que celle dont je viens de vous parler. C'est à l'expérience à apprendre si ses vertus s'altèrent, diminuent, ou se perdent entièrement dans un autre climat; ce que je puis assurer c'est que son

usage pendant peu de jours est reconnu pour guérir
 les cas de fièvre intermittente les plus invétérés.

Année 1729.
 N°. 411.

ARTICLE III.

Résultat de l'ouverture du corps de plusieurs pestiférés qui périrent à Marseille & expériences faites avec la bile de ces mêmes pestiférés; on y a joint quelques autres expériences faites à Montpellier avec la bile de personnes mortes d'autres maladies; ces faits qui sont le fruit de l'observation de M. Deidier, professeur de médecine à Montpellier, ont été communiqués par M. Woodward, docteur en médecine & membre de la société royale.

Année 1722.
 N°. 370.

I. Un soldat âgé de 25 ans, & d'une constitution forte & robuste, avoit eu un bubon applati dans le creux de l'aîne droite & il étoit mort dans le délire. On trouva à l'ouverture de son corps le cœur d'une grosseur extrême & rempli d'un sang noir & grumelé; ses poumons étoient recouverts de taches pourprées, livides & adhéroient à la plèvre; le foie étoit double de sa grandeur naturelle & farci aussi d'un sang épais; la dure & la pie mère par leur couleur noire offroient toutes les apparences d'une inflammation gangrè-

neuse ; la substance intérieure du cerveau étoit parsemée d'un nombre infini de tâches gangreneuses.

Année 1722.
N°. 370.

II. Une femme âgée de 30 ans , & d'un tempérament sanguin , avoit un bubon sous l'aisselle droite , avec un délire qui fut suivi d'un assoupissement mortel. A l'ouverture du corps nous reconnûmes que les poumons étoient dans leur état naturel ; le cœur étoit d'un volume prodigieux , plein d'un sang noir & caillé avec l'oreillette gauche livide & gangrenée ; le foie étoit aussi très-volumineux & couvert de pourpre , & la vesicule du fiel étoit remplie d'une bile noire & verdâtre ; la tête ne fut point ouverte.

III. Un jeune homme de 14 ans , d'une constitution foible & délicate , avoit un bubon situé profondément dans le creux de l'aîne droite. Il tomba dans un délire avec des convulsions & il succomba. Nous trouvâmes son cœur d'un volume double de celui qu'il doit avoir naturellement , & il étoit rempli d'un sang noir & épais. Ses poumons étoient parsemés de taches livides ; la vesicule du fiel étoit remplie d'une bile noire & verdâtre ; la tête ne fut point ouverte.

IV. Un jeune homme de 25 ans , d'un tempérament mélancolique , avoit tout le corps couvert d'un pourpre livide & un bubon sous l'aisselle droite ; il mourut aussi dans un délire frénétique ;

Année 1722.
N^o. 370.

on trouva dans son cadavre deux abcès, l'un entre les tégumens & le grand muscle pectoral gauche, & l'autre dans la poitrine, entre le sternum & le médiastin; son cœur étoit très-gros & rempli d'un sang noir & épais; l'oreillette droite étoit large de trois pouces & la gauche étoit dans son état naturel; le poumon étoit couvert de petites taches livides, sans cependant aucun endurcissement de sa substance; le foie étoit plus gros & plus dur qu'à l'ordinaire, & il étoit aussi rempli de taches d'un pourpre livide; la substance du cerveau offroit la même altération, & tous ses vaisseaux étoient remplis d'un sang noir & épais.

V. Un homme de 35 ans, d'un tempérament mélancolique, quatre mois après avoir été guéri de la peste, dont les marques étoient encore un bubon dans le pli de l'aîne qui étoit venu à supuration, fut attaqué de nouveau de trois charbons, un au milieu du bras & les deux autres dans l'avant-bras; il n'avoit que peu de fièvre avec douleur d'estomac; mais le délire l'enleva bientôt après; en ouvrant son corps nous trouvâmes son cœur d'un volume prodigieux; l'oreillette droite avoit cinq pouces de large & la gauche trois pouces; il y avoit un petit abcès sur le corps de l'aorte; les poumons étoient couverts de taches livides & le foie paroissoit gangrené; la vésicule du fiel étoit d'une couleur très-noire;

le *duodenum* & le *rectum* étoient enflammés; on n'ouvrit point le crâne.

Année 1722,
N°. 370.

VI. Un homme de 40 ans, d'un tempérament mélancolique, mourut sans aucune éruption extérieure, le troisième jour d'une violente fièvre avec une affection comateuse; nous trouvâmes le médiastin percé vers sa partie supérieure; le péricarde étoit d'une couleur livide; le cœur étoit plus gros que dans son état naturel, & ses ventricules distendus étoient pleins d'un sang noir & épais comme dans les autres cadavres; le foie étoit très-volumineux & d'une couleur livide, avec une pustule charbonneuse au côté de la vésicule du fiel, qui étoit remplie d'une bile noire.

VII. Une fille de dix huit ans, d'une constitution vigoureuse, ayant deux pustules charbonneuses au milieu & à l'intérieur de la cuisse, avec un violent mal de tête, mourut dans le délire; les membranes du cerveau furent trouvées d'une couleur noirâtre; la substance corticale étoit d'une couleur livide & la médullaire étoit parsemée d'un petit nombre de taches noires; le cœur étoit d'un volume prodigieux & plein d'un sang noir & épais; le foie étoit aussi très-gros & la vésicule du fiel remplie d'une bile noire & verte; la surface des intestins offroit plusieurs taches livides.

VIII. Une fille de 20 ans, & qui avoit un

Année 1722.
N°. 370.

bubon dans chaque pli de l'aine, mourut subitement sans aucun symptôme dangereux; on trouva son cœur couvert de taches livides pourprées, & d'un volume plus grand que dans l'état naturel; il étoit rempli d'un sang noir & épais, & il avoit un polype dans chaque ventricule; les poumons étoient dans leur état naturel; le foie étoit d'un volume prodigieux, & la vesicule du fiel étoit remplie d'une bile d'une couleur verte foncée.

IX. Un laboureur âgé de 20 ans, & d'une complexion sanguine & robuste, avoit une parotide charbonneuse depuis huit jours, accompagnée d'une fièvre brûlante; il fut transporté à l'hôpital le 2 de Mai, & il mourut dans trois jours; nous trouvâmes la partie extérieure du côté gauche des poumons toute couverte d'un pourpre livide; le cœur étoit d'un volume double de l'état naturel & il contenoit à peine du sang dans les ventricules qui étoient chacun remplis d'un gros polype; celui du côté droit avoit dilaté l'oreillette jusqu'à la largeur de quatre pouces; le foie étoit aussi plus grand qu'à l'ordinaire, & la vesicule du fiel étoit pleine d'une bile noire & épaisse.

Les ouvertures de cadavres, ci-dessus mentionnées, furent faites dans l'hôpital du Mail durant les mois de Février, de Mars, d'Avril & de Mai, en présence de MM. Roberts & Renaud, docteurs en médecine.

Voici les expériences qui furent faites avec la bile prise des mêmes cadavres.

Année 1722.
N°. 170.

EXPÉRIENCE PREMIÈRE.

LA bile des pestiférés étoit d'une couleur verdâtre & noire. Elle prenoit un vert durable en la mêlant avec l'esprit de vitriol, & devenoit toujours très-jaune quand on la mêloit avec de l'huile de tartre par défaillance, ou un sel alkali fixe dissous dans une suffisante quantité d'eau. Ces deux couleurs ont duré ensuite des mois entiers. La même bile a pris une couleur noire, comme de l'encre, mais qui s'éclaircissoit bientôt par une effusion d'esprit de nitre.

EXPÉRIENCE DEUXIÈME.

LA bile prise de la vésicule du fiel des personnes mortes de la peste, ayant été versée dans une blessure faite à dessein à différens chiens, ils sont devenus mélancoliques, engourdis & ne vouloient plus manger. Tous ces animaux sont morts dans trois ou quatre jours avec des marques propres à la véritable peste, comme des bubons, des charbons & des inflammations gangréneuses dans les viscères, de la même nature que ceux qu'on observoit dans les cadavres de ceux d'où on avoit pris la bile.

Année 1711.
N°. 370.

EXPÉRIENCE TROISIÈME.

UN gros de cette bile pestiférée ayant été mêlé avec deux onces d'eau de fontaine un peu tiède, fut injecté dans la veine jugulaire d'un chien, lui communiqua aussi-tôt de l'assoupissement & le tua dans quatre heures, avec des inflammations gangréneuses, le cœur rempli d'un sang noir & épais, le foie enflé & la vésicule du fiel pleine d'une bile verte.

EXPÉRIENCE QUATRIÈME.

LA même quantité de bile injectée par la veine crurale, produisit dans tous les chiens une pésanteur dans les mouvemens en moins d'une heure. Ils avoient un dégoût si fort pour la nourriture, qu'ils ne vouloient plus ni manger ni boire après que l'injection avoit été faite. Ils rendoient fréquemment de l'urine, surtout s'ils avoient été fatigués. Le troisième jour il paroissoit des tumeurs considérables sous les aisselles, aux cuisses, à trois pouces environ de la blessure. Celle ci tournoit à la gangrene, & ces animaux périssoient le quatrième jour avec tous les symptômes de la peste.

EXPÉRIENCE CINQUIÈME.

UN chien de l'hôpital du Mail à Marseille, qui

Suivoit les chirurgiens dans les pansemens, avoit coutume d'avalier avec avidité les glandes corrompues & les plumasseaux chargés de pus qu'on ôtoit de dessus les plaies; il léchoit le sang qu'il trouvoit à terre, & il continua d'en user ainsi près de trois mois, se conservant toujours gai, vif & prêt à jouer avec les infirmiers. Nous injectâmes dans la veine crurale de ce chien environ un gros d'une bile pestiférée, mêlée avec deux onces d'eau chaude. Il mourut le quatrième jour comme les autres chiens, avec un bubon à la cuisse qui avoit reçu la blessure; il y avoit aussi sur le même membre deux charbons & la plaie étoit gangrénée. Ce que nous avons remarqué de particulier sur ce chien est qu'après l'injection, soit dans l'état de vie, soit dans le cadavre, il rendoit une odeur fétide que nous n'avons pas remarquée dans les autres chiens.

Année 1712.
N^o. 370.

EXPÉRIENCE SIXIÈME.

Nous recueillîmes la bile d'un chien qui étoit mort de la peste, & nous l'injectâmes par la veine crurale dans le sang d'un autre chien qui, aussitôt après l'injection, éprouva des mouvemens convulsifs généraux, auxquels succédèrent un engourdissement léthargique. Le second jour après l'injection, il parut un charbon sur le muscle pectoral du côté droit. Le troisième jour on vit naître

Année 1722.
N^o. 370.

un bubon considérable au haut de la cuisse & le chien mourut le même jour. En ouvrant son corps nous trouvâmes gangrénée toute la partie antérieure de la poitrine, & dans les parties intérieures les viscères étoient remplis d'un sang noir caillé, comme dans tous les autres. La surface extérieure des poudrons étoit toute pourprée. Le cœur paroissoit d'un volume double de son état ordinaire, avec ses quatre cavités pleines d'un sang noir caillé. L'animal avoit vécu trois jours, depuis l'injection, sans manger ni boire.

Le jour de sa mort nous injectâmes un peu de sa bile dans la veine crurale d'un autre chien, qui fut attaqué aussi-tôt de violentes convulsions pendant environ demi-quart d'heure. Après qu'elles eurent cessé il parut lourd & assoupi; il vomit avec de grands efforts. Le vomissement fut suivi du hoquet; il mangea un peu, car il avoit fait un long jeûne avant l'injection; mais il vomit deux heures après tout ce qu'il avoit pris. Il mourut le troisième jour avec les mêmes symptômes de la peste que ceux qu'avoient présentés les autres chiens sur qui on avoit fait des expériences.

Les expériences suivantes ont été faites à Montpellier, dans l'hôpital de Saint-Eloi, durant les mois de Septembre, d'Octobre & de Novembre, par M. Fixes, docteur en médecine, & MM. Duli & Morel, jeunes chirurgiens du même hôpital.

E X P É R I E N C E S E P T I E M E.

Année 1712.
N°. 370.

UN foldat âgé d'environ 25 ans, d'une constitution vive, éprouvoit dans l'hôpital de Saint-Eloi une fièvre maligne ordinaire & mourut le quinzième jour par un transport de la matière morbifique dans la poitrine. Ses poumons étoient très-gonflés & remplissoient toute la cavité de la poitrine, en adhérant à la plèvre. Ayant remarqué que la bile dans la vésicule du fiel étoit d'une vive couleur verte, nous en recueillîmes pour les expériences suivantes.

Cette bile étant mêlée avec quatre onces d'eau chaude, fut injectée dans la veine jugulaire d'un chien, & une compresse trempée dans le reste de la liqueur fut appliquée sur cette blessure. L'animal parut un peu lourd & assoupi & ne voulut ni manger ni boire; le troisième jour il mangea & but volontairement. La compresse étant tombée d'elle-même le quatrième jour, la blessure diminua de moitié; elle guérit peu à peu & le chien se rétablit très-bien.

E X P É R I E N C E H U I T I E M E.

UN laboureur d'environ cinquante ou soixante ans, d'un tempérament mélancolique, avoit resté

Année 1722.
N°. 370.

près d'un mois dans l'hôpital, attaqué d'une fièvre maligne ordinaire & avoit éprouvé alternativement le delire & une affection comateuse. Après sa mort, on trouva la bile très-épaisse & noire comme de l'encre; il y en avoit en outre en quantité. Nous en mîmes environ un gros dans une blessure faite pour cet objet à la partie extérieure de la cuisse droite d'un chien, en y introduisant des plumasseaux plongés dans la même bile étendue d'eau. Il ne parut aucun changement dans les fonctions du chien. Nous lui fîmes avaler un peu de cette bile, sans qu'il perdît l'appétit. Le voyant dans un bon état, nous livrâmes la blessure aux soins de la nature; elle fut guérie dans quinze jours par les léchemens continuel du chien lui-même.

EXPÉRIENCE NEUVIÈME.

VOULANT injecter quelque peu de la même bile dans l'artère crurale d'un autre chien, & le jeu de la seringue ayant été arrêté par la grande épaisseur de la même bile, nous prîmes un plumasseau plongé dans une certaine quantité de bile dissoute & nous l'appliquâmes à une blessure faite à l'intérieur de la cuisse droite. Le plumasseau fut fixé au dedans de la peau par quelques aiguilles. Cette application ne produisit point d'altération considérable dans le chien; il ne parut ni engourdi ni affecté à la région de l'estomac, mais il lécha

la plaie assez facilement, & après que le plumasseau fut tombé, la blessure se guérit comme dans l'expérience précédente.

Année 1722.
N°. 370.

EXPÉRIENCE DIXIÈME.

ENVIRON un gros de la même bile noire tirée du même cadavre & mêlée avec l'eau chaude, fut injectée dans la veine jugulaire d'un chien; cet animal n'en parut point incommodé, mais il étoit aussi vif après qu'avant l'injection; il parut seulement altéré & il but avec avidité. Le lendemain matin voulant voir la blessure, nous la trouvâmes noire & sèche & le chien devenant inquiet, mordit une des personnes présentes. Les deux ligatures faites pour l'injection furent ôtées sans qu'on vît le sang couler. Nous appliquâmes un bourdonnet chargé d'un digestif ordinaire, & nous eûmes soin de le maintenir à l'aide d'un bandage. Quatre heures après le pansement nous trouvâmes le chien mort, c'est-à-dire vingt-trois heures après l'injection. L'ayant ouvert nous trouvâmes que le cœur battoit encore avec violence & le battement cessant, il ne se trouva point du sang ni dans les ventricules ni dans les oreillettes. Cette liqueur rassemblée dans de grands vaisseaux, parut d'un rouge vif & très-fluide sans aucune des concrétions qu'on observe constamment dans tous les corps de

Année 1722.
N°. 370.

ceux qui sont morts de la peste. Il ne parut aucune marque, soit interne soit externe de la peste.

EXPÉRIENCE ONZIÈME.

UN habitant de Montpellier, âgé d'environ 35 ans, d'une complexion sanguine & robuste, ayant fait une chute sur le pavé, s'étoit blessé à la partie supérieure du front, vers le côté droit. Cet accident fut négligé & il survint à la suite un érysipele sur toute la face, qui fut accompagné d'un gonflement de la parotide gauche. Cette tumeur disparut & reparut trois fois dans dix à douze heures. L'érysipele cessa subitement; le délire se déclara & la mort survint vers le vingtième jour à compter de la chute. A l'ouverture du corps nous trouvâmes une quantité de fluide entre le crâne & la dure-mère. Le cerveau qui étoit plus ferme qu'à l'ordinaire étoit un peu rouge & une partie de la pie-mère étoit enflammée. Il y avoit environ un demi-septier d'eau jaunâtre dans la cavité de la poitrine. Le lobe droit des poumons étoit un peu dur à sa partie supérieure. Le cœur avoit une concrétion polypeuse dans chaque ventricule. Nous trouvâmes aussi deux pintes d'une eau claire dans la cavité de l'abdomen. Toute la graisse de cet individu étoit jaune. Le foie parut un peu gonflé & la vésicule du fiel presque vide, car elle

elle ne contenoit guères plus que deux gros d'une bile jaune. Cette bile fut mêlée avec deux onces d'eau chaude & injectée dans la veine crurale d'un chien. Cet animal mangea & but à son ordinaire après l'injection & ne parut point du tout incommodé. La blessure saignoit beaucoup & nous fûmes obligés de la remplir de poudres styptiques soutenues d'un plumasseau & d'un bandage convenable. Vingt-quatre heures après l'appareil fut ôté & la blessure parut noire & sèche. Le chien la lécha; elle suppura le lendemain, & après cela elle devint rouge & bien colorée. La plaie diminua de moitié dans huit jours, finit par guérir & le chien ne conserva aucune trace d'incommodité.

On fit une autre expérience sur un chien dans la veine jugulaire duquel on injecta du vitriol dissous dans une cuillerée d'eau chaude; l'animal mourut dans des convulsions générales & le cœur étoit rempli d'un sang grumelé; mais on ne remarqua rien, soit à l'intérieur ou à l'extérieur, de semblable à ce qui s'étoit manifesté dans les autres animaux à qui on avoit inoculé la peste.

Année 1712.
N^o. 37^e.



ARTICLE IV.

Essai sur l'usage de la bile dans l'économie animale, fondé sur une observation d'une blessure dans la vésicule du fiel; par M. A. Stuard, médecin du Roi d'Angleterre.

Année 1730.
N°. 414.

M. MENZIES, sergent aux gardes, fut blessé dans la vésicule du fiel, la matinée du 30 Octobre 1728, & il mourut le 5 Novembre suivant, âgé de 40 ans.

Résultat de l'ouverture du corps.

L'ABDOMEN étoit dans un état de distention & la peau du ventre teinte d'une couleur de safran. On apercevoir une blessure triangulaire à deux pouces environ du nombril, vers le côté droit, avec une direction oblique & dirigée en haut à travers les régumens. Le ventre ayant été ouvert on découvroit une blessure qui avoit pénétré à travers le périroine, & l'épée avoit glissé de-là le long de l'épiploon, sans presque le blesser. On voyoit une petite blessure triangulaire au fond de la vésicule du fiel; mais l'instrument avoit seulement pénétré à travers ces membranes dans la cavité, sans blesser le foie ni aucune des parties

environnantes. La vésicule du fiel étoit par-là offensée & contenoit seulement quelques gouttes de bile, qui, en pressant légèrement la vésicule, avoient coulé dans la cavité de l'abdomen à travers la blessure.

Année 1730.
N°. 414.

Les intestins, pendant tout leur trajet, étoient distendus, au point d'avoir acquis, autant qu'on pouvoit en juger, le triple de leur diamètre naturel. Ils paroissoient remplir toute la cavité de l'abdomen, de manière à donner au ventre l'apparence d'une tympanite ou d'un ascite. Cette distention disparoissoit & les intestins s'affaisoient en faisant différentes piqûres avec une lancette sur leurs côtés, pour donner passage à l'air. Le reste de la cavité de l'abdomen qui n'étoit pas exactement remplie par les intestins ainsi distendus contenoit un fluide boueux ou une sérosité d'un jaune intense ou teinte de bile, à la dose d'environ trois pintes. Tous les intestins & les autres parties contenues dans l'abdomen, étoient aussi teints d'une couleur jaune; mais aucune autre partie du corps n'en offroit la moindre apparence lorsqu'elle étoit hors du contact de cette liqueur. Il n'y avoit aucun signe d'inflammation dans aucune partie des intestins des autres viscères ou des parties contenues dans l'abdomen, qui étoient toutes dans un état sain. L'obliquité de la blessure à travers les régumens, les muscles & le péritoine étoit un

obstacle au passage de l'air dans la cavité de l'abdomen.

Symptômes qui s'étoient manifestés durant l'état de vie.

Je ne vis le malade que le quatrième jour de la blessure, mais les chirurgiens qui l'avoient traité dès le commencement, me dirent que le ventre avoit été dès le debut aussi distendu que je le voyois, avec l'apparence d'une tympanite ou d'un ascite, & qu'il s'étoit soutenu au même degré de distension sans diminuer ni augmenter sensiblement jusqu'à la mort. Il ne s'étoit manifesté des flatuosités ni par le haut ni par le bas, non plus que des borborigmes, malgré la distention du ventre. Il ne tendit plus de selles après sa blessure, quoiqu'il eût pris de forts purgatifs & qu'on lui eût donné de forts clystères trois jours avant ma visite; on ne lui avoit non plus donné aucun opiat, auquel on auroit pu attribuer ce défaut de liberté du ventre; les purgatifs & les clystères que j'ordonnai ensuite n'eurent pas plus d'effet.

Il prenoit la quantité de boisson & de nourriture solide qu'on jugeoit pouvoir suffire à l'entretien de ses forces. Il ne dormit plus ou très-peu, & par des intervalles de demi-heure ou d'une heure au plus d'un léger assoupissement. Je dois ajouter que le sommeil ne fut pas ramené par de fortes

doses d'opium que je jugeai à propos de lui faire administrer les deux derniers jours, pour lui procurer du repos.

Année 1730.
N°. 414.

La blessure des tégumens n'avoit point parcouru les périodes ordinaires d'inflammation, mais elle étoit devenue relâchée, atonique & pâle, presque sans rendre le moindre pus. L'urine étoit en très-petite quantité, en sorte que le malade n'en rendoit que deux ou trois cuillerées à la fois; elle étoit claire, mais jaune & comme teinte de safran, sans offrir cependant de sédiment. Son pouls étoit plein & fort, mais sans être accéléré. On ne sentoit aucune chaleur fébrile à la peau ou dans aucune autre partie du corps. La langue étoit dure, âpre & noire comme dans la fièvre, mais sèche comme dans un état de maladie & avec peu de salive. Il ne donna aucune marque de délire depuis sa blessure jusqu'à sa mort. Le second jour de ma visite il éprouva quelques légers mouvemens de hoquet, avec quelques efforts de vomissement. On observoit certaines intermissions dans son pouls comme d'un battement sur dix, sur vingt ou sur trente, durant le jour qui précéda sa mort.

Pour faire quelque usage de cette observation; il est bon de remarquer avant, que tout raisonnement qui n'est pas fondé sur les faits & l'expérience, reste toujours incertain dans les sciences naturelles, & qu'au contraire il faut se servir de

Année 1730.
N^o. 414.

ce qui a été observé ou expérimenté, & en tirer par le raisonnement, les conclusions qui en naissent manifestement & qui sont utiles pour la pratique. Or le cas singulier que je rapporte, & qui n'étoit peut-être jamais arrivé, puisque la vésicule du fiel a été seule blessée, fait voir combien de fonctions de l'économie animale ont été altérées ou détruites par cette seule atteinte; il fait voir aussi l'usage & la nécessité de ce réservoir de la bile pour l'état de santé, en même tems qu'il peut fournir quelques indications de traitement dans des cas où la bile pèche par excès, par défaut ou par ses qualités.

On n'a absolument remarqué à l'ouverture du corps, d'autre cause assignable des symptômes qui s'étoient manifestés durant la vie, qu'une blessure de la vésicule du fiel; & comme cette blessure ne pouvoit affecter aucune autre partie, ni produire ces symptômes d'une autre manière qu'en versant la bile dans la cavité de l'abdomen, & en en privant le tuyau intestinal ainsi que le sang, il est clair qu'on ne peut pas se méprendre sur le vrai principe de ce qui est arrivé au malade depuis sa blessure jusqu'à sa mort.

I. L'abdomen étoit distendu comme dans une tympanite ou dans un ascite dès le commencement, & le diamètre des intestins étoit presque triple de l'état ordinaire.

Il est vrai que cette distention arrive ordinairement peu d'heures avant la mort ou aussi-tôt après, & qu'elle doit être attribuée à l'élasticité de l'air enfermé dans le tuyau intestinal & qui n'est plus contrebalancé par le ressort des fibres musculaires de l'estomac & des intestins, privées de l'influx du sang & du fluide nerveux, & devenues incapables de conserver le mouvement péristaltique ; mais le gonflement dont il est ici question, est arrivé plusieurs jours avant la mort, & même le lendemain de la blessure, quoique le pouls fût en apparence fort & égal, & qu'on ne pût pas par conséquent soupçonner un défaut de sang & de fluide nerveux. On doit par conséquent en conclure que l'influx de la bile dans la cavité des intestins, est aussi nécessaire à la force de leur contraction & à la perfection de leur mouvement péristaltique que celle du sang & du fluide nerveux dans leurs tuniques, & que ce sont là les trois causes réunies de ce mouvement dans l'état de santé, en sorte que le défaut de l'une d'elles entraîne la suspension de ce mouvement.

Nous voyons de-là que dans l'état squirreux du foie où la sécrétion & par conséquent l'excrétion de la bile est plus ou moins défectueuse, que dans la jaunisse, ou par quelque obstruction dans les conduits biliaires après la sécrétion, une partie de cette même bile est repoussée & absorbée dans le

Année 1730.
N°. 414.

sang, sans qu'il en pénètre dans la cavité des intestins. On observe une distention extraordinaire dans les intestins & une constipation qui, aboutissant à un degré incurable, finit par un ascite ou une hydropisie dans la cavité de l'abdomen.

Il seroit important aussi de rechercher si ce qu'on appelle ordinairement une colique nerveuse ou hystérique, qui est généralement accompagnée d'un moindre degré de distention, avec des flatuosités & des borborigmes, & qu'on attribue à une ataxie du fluide nerveux, ne doit pas être plutôt rapportée à la langueur de la sécrétion ou de l'excrétion de la bile qui la rend défectueuse, ou à son acrimonie & à sa viscosité occasionnées par la stagnation dans la vésicule du fiel, peut-être aussi à ces deux causes ensemble, aussi bien qu'à la distribution inégale du sang & du fluide nerveux dans les parties affectées. J'ai en effet souvent observé que dans le cours du traitement de ces affections, une grande évacuation, soit naturelle, soit par les secours de l'art, d'une bile poracée & visqueuse, aussi-bien qu'une grande profusion d'une urine pâle, terminoit alors la cure. Le vomissement d'une bile poracée qui est très-commune dans des cas semblables, prouve la même chose, & je crois qu'on doit convenir en général que la couleur noire poracée & ferrugineuse de la bile, est dûe à la stagnation plus ou moins longue, surtout dans la vésicule du

fiel, ce qui est assez expliqué d'ailleurs par la vie sédentaire de ceux qui sont sujets à de semblables coliques, même indépendamment de tout écart de régime.

Année 1730.
N^o. 414.

II. On n'observoit point de flatuosités, ni par haut, ni en bas, non plus que des borborigmes, malgré la distention du ventre & le gonflement des intestins.

Cela fait voir évidemment que les intestins avoient perdu tout leur mouvement, & qu'ils étoient devenus paralitiques par un défaut total de bile seulement, de même que si leurs nerfs avoient été totalement obstrués; car s'ils eussent été encote susceptibles de mouvement, soit péristaltique & naturel, soit contre nature & convulsif, ils auroient poussé l'air contenu d'un lieu dans un autre, & auroient occasionné des borborigmes, ou auroient chassé les flatuosités par haut ou par bas, puisque la nature avoit tant besoin de soulager les intestins distendus, & que l'art tâchoit de la seconder par des clystères & des purgatifs.

Ce qui sert à montrer ce qui a été dit ci-dessus sur le mouvement défectueux & convulsif des intestins, est que dans les cas d'hystérie, par un défaut de quantité ou de qualité dans la bile ou des deux ensemble, le mouvement des intestins devient défectueux, irrégulier ou convulsif, mais

Année 1730.
N°. 414

qu'il ne se trouve pas totalement perdu comme dans le cas précédent.

III. Il ne rendit plus de selles après avoir reçu la blessure; & les plus forts purgatifs, ainsi que les clystères qu'on lui donna, furent sans effet.

Cela paroît être dû à un défaut ou à une perte totale du mouvement péristaltique, & fait voir évidemment que les plus forts purgatifs ne peuvent opérer sans le secours de la bile; car si ce mouvement avoit été rétabli jusqu'à un certain degré, le ventre se seroit affaissé proportionnellement, & il s'en seroit suivi quelque évacuation de ce qui étoit contenu dans les premières voies.

Si l'efficacité des purgatifs dépend de la coopération de la bile, il s'ensuit que lorsque celle-ci est la plus active & la plus redondante, la manière d'opérer de ces évacuans sera, *ceteris paribus*, la plus marquée, & qu'enfin lorsqu'elle est inactive ou qu'elle pèche en quantité, les purgatifs produiront proportionnellement un moindre effet; quoiqu'il soit cependant vrai qu'une grande quantité de bile ou son irritation trop violente & trop forte puisse affecter les intestins de spasmes, au point d'arrêter les déjections, & que les plus forts purgatifs donnés alors ne font qu'augmenter les spasmes & la constipation, comme dans les coliques bilieuses qui sont toujours accompagnées

d'une excessive constipation qui ne cède point à l'action des purgatifs les plus forts, s'ils ne sont pas joints avec les opiatés pour calmer les spasmes & adoucir l'acrimonie de la bile.

Année 1730.
N°. 414.

Le malade avoit pris assez de nourriture & de boisson, mais puisque le ressort des intestins & leur mouvement péristaltique étoient perdus, il est facile de prouver que la matière alimentaire ne pouvoit pénétrer les vaisseaux lactés, faute de nourriture, & que par conséquent le malade mourut d'inanition; c'est ce qui explique le reste des symptômes.

Pour prouver que c'est là le cas, il faut se rappeler que tous ceux qui ont vu des dissections faites sur des animaux vivans, dans l'intention de faire voir le mouvement péristaltique des intestins & le cours des vaisseaux lactés, doivent avoir observé que les intestins ont une alternative de systole & de diastole, ou de contraction & de dilatation qu'on nomme mouvement péristaltique, en sorte que la section supérieure se contracte elle-même pendant que celle qui est immédiatement inférieure est dilatée, & ce mouvement s'opère en différentes parties des intestins en même tems; la partie contractée, en chassant le sang & le chyle de ses tuniques pendant sa contraction, devient pâle pendant que les autres parties dilatées sont d'une

Année 1730.
N^o. 414.

couleur fleurie, & que leurs vaisseaux sont pleins de sang & chyle.

Maintenant la partie qui se contracte doit nécessairement forcer le chyle qui est exprimé de la masse alimentaire, vers la surface intérieure des intestins où les extrémités capillaires des vaisseaux lactés dans la tunique vaginale sont propres à l'admettre ou plutôt à l'absorber par une sorte d'attraction, & à la transmettre dans les branches ultérieures de ces mêmes vaisseaux qui se trouvent dans les tuniques des intestins; ce cours est facilité pendant la dilatation ou la diastole qui développe les replis de ces vaisseaux, & pendant la contraction ou la systole dans le premier ordre des vaisseaux lactés du mésentère. Par les mêmes impulsions répétées des sections des intestins qui se contractent, le chyle est poussé dans le second ordre des vaisseaux lactés, dans le mésentère, le réservoir du chyle & le conduit thorachique; ce qui favorise encore ce cours est la position des valvules, le mouvement continuel des muscles & de toutes les parties contenues dans l'abdomen, & la poitrine par les alternatives de l'inspiration & de l'expiration; le chyle parvient enfin dans la veine sous-clavière pour réparer les pertes continuelles que fait le sang.

Mais si dans cette série les premiers moteurs

manquent, c'est-à-dire, si les fibres musculaires des intestins ont perdu leur mouvement péristaltique comme dans le cas ci-dessus, alors l'expression, l'absorption & les progrès du chyle ne peuvent se succéder, le sang est privé de son fluide réparateur & la personne meurt d'inanition, comme on l'a remarqué par rapport à celui qui fait le sujet de l'observation précédente, & comme semblent l'indiquer les autres symptômes qui lui ont été propres.

I. Le défaut du sommeil & l'inefficacité de l'opium pour le procurer, doivent être attribués à un défaut de réparation du chyle dans le sang : car nous voyons que ceux qui mangent très-peu, dorment aussi très-peu, & que ceux qui prennent une nourriture abondante, ont besoin de plusieurs heures de sommeil, que dans routes les maladies chroniques où le corps cesse d'être nourri, le sommeil manque aussi & l'opium a peu d'efficacité, pendant que les enfans qui prennent beaucoup d'alimens, soit pour leur nourriture, soit pour le développement de leurs corps, passent à dormir une partie de leur vie.

Il peut sans doute paroître difficile de concevoir comment le défaut de repos a suivi de si près l'accident ; mais si on considère que la seule omission d'un repas, surtout du souper à ceux qui en ont eu l'habitude, produit un sommeil bien plus

Année 1730.
N°. 414.

court pour la nuit suivante, il est peu étonnant que le malade ci-dessus, qui a cessé de prendre sa nourriture ordinaire le jour de l'accident, ait éprouvé une diminution sensible de repos six ou sept heures après ce même accident.

II. Le défaut de pus dans la blessure étoit probablement dû à un défaut de réparation du chyle dans le sang, ainsi que la pâleur & le relâchement des levres de la même blessure.

III. La petite quantité d'urine étoit probablement due à un défaut de réparation des fluides des premières voies; car dans l'état de santé ces fluides sont transmis très-vite à travers les voies urinaires. La petite teinte de jaune qu'offroit la même urine, étoit probablement due à la bile épanchée dans l'abdomen & filtrée à travers la duplicature du péritoine dans l'intérieur de la vessie; car on ne peut point supposer que cette couleur ait dérivé du sang qui n'avoit pu recevoir aucune partie de la bile par une autre voie.

IV. Le défaut de salive & la sèchételle de la peau semblent devoir être attribués à la même cause, au défaut d'un fluide réparateur du sang.

V. Le petit nombre d'efforts du hoquet & les envies de vomir, aussi bien que les intermissions dans le pouls des mourans, paroissent naître non-seulement d'un défaut, mais encore d'une distribution inégale du sang & des esprits, & surtout

de leur corruption & de leur acrimonie, ce qui a produit la mort dans ce cas présent comme dans les autres.

Année 1730.
N°. 414.

On voit donc combien le défaut seul de la bile a produit des désordres dans les fonctions vitales naturelles & animales.

Voici maintenant les conséquences pratiques qu'on peut tirer de l'observation précédente.

I. Le mouvement péristaltique des intestins est autant dû à l'efflux de la bile dans leur cavité, qu'à celui du fluide nerveux & du sang dans leurs tuniques. La bile doit donc être regardée comme un des premiers moteurs de l'économie animale, puisqu'en mettant en jeu les fibres musculaires des intestins, elle est comme la cause de toutes les fonctions animales & vitales qui en dépendent, en sorte qu'aucune d'elles ne peut long-tems se soutenir sous ce premier moteur.

II. Le mouvement péristaltique se perd totalement par un défaut de bile; il languit aussi lorsqu'elle pêche par défaut, devient irrégulier & convulsif par la redondance de ce fluide ou son extrême acrimonie. De-là vient que diverses affections qu'on appelle nerveuses peuvent être attribuées à cette cause, & sont plus aisément guéries en corrigeant le défaut ou l'excès de bile & en débarrassant le foie, qu'en faisant prendre beaucoup d'autres médicamens de la classe de ceux qu'on appelle *nervins*.

Année 1730.
N^o. 414.

III. Le pouvoir des purgatifs dépend de la coopération de la bile, & par conséquent il est probable que la différence des constitutions, à la même époque de l'âge, dépend plus de la quantité & de la qualité de la bile que du volume & du poids du corps, de la quantité du sang & des autres humeurs qui circulent.

IV. Il paroît aussi que la nourriture & l'accrétion du corps dépend, jusqu'à un certain degré, d'une quantité convenable & de la bonne qualité de ce fluide, sans lequel le sang & les autres humeurs qui sont en circulation ne peuvent être bien réparés. Par conséquent ce défaut peut être souvent la cause du marasme ou du dépérissement du corps, tandis qu'on en soupçonne peu la cause; ce qui peut suggérer dans ces cas de nouvelles méthodes de traitement.

V. Cette observation semble conduire à la cause immédiate du repos naturel ou du sommeil dans l'état de santé, qui est une certaine quantité ou proportion de nouveau chyle dans le sang, son défaut, quelle qu'en soit la cause, entraînant un état de veille. Et cela peut servir à indiquer l'effet immédiat & les conséquences des opiat, & faire voir jusqu'à quel point & dans quels cas ils peuvent être efficaces & utiles.

VI. Il s'ensuit aussi de-là, qu'une quantité convenable d'alimens pris après certains intervalles est

est nécessaire pour tenir le sang & les humeurs dans une température naturelle & un certain état de douceur, & les préserver de l'acrimonie & de la putréfaction. Et cela est vrai dans toutes les maladies aussi bien que dans l'état de santé; c'est cependant contre la pratique de ceux qui combattent les maladies par une abstinence sévère ou qui refusent une quantité convenable de boisson ou de nourriture liquide au malade, sur-tout dans les fièvres où le défaut de réparation tend à augmenter l'acrimonie ou la putréfaction, d'où naissent la plupart des fièvres malignes.

Année 1730.
N°. 414.

VII. On voit aussi que le pus, ou la matière purulente dans une blessure ou un ulcère, est le produit du chyle & non du sang & de la sérosité. Ce qui confirme une opinion qui n'étoit fondée sur aucune autre preuve que sur la ressemblance du pus au chyle. Et comme une grande redondance aussi bien qu'un défaut du pus retarde quelquefois le traitement d'une blessure ou d'un ulcère, on voit par quels moyens on peut diminuer ou augmenter ce fluide excrémentiel & répondre aux indications qui se présentent alors.

Il paroît aussi probable qu'une grande redondance de chyle dispose le corps aux maladies purulentes, suppuratoires & scrophuleuses; en sorte qu'il faut interdire les sortes de nourritures qui fournissent un chyle riche & abondant, & prescrire

Année 1710.
N°. 414.

des médicamens qui donnent de l'énergie aux organes de la sanguification & des autres sécrétions; car dans ces cas il paroît que la sanguification & les autres facultés d'assimilation sont languissantes, tandis que la chylication est très-forte; ce qui le confirme, c'est que dans l'âge adulte ou même dans un âge plus avancé, à mesure que la sanguification se fortifie & qu'on mange avec moins de voracité, ces affections scorbutiques diminuent ou disparaissent même entièrement d'elles-mêmes.

Ce n'est point un défaut dans la quantité des fluides qui fait mourir un animal qu'on fait jeûner, mais une acrimonie vénéneuse que le sang & les humeurs contractent naturellement, par le défaut d'une nouvelle réparation & d'une évacuation égale. C'est ainsi que dans les maladies chroniques, dans lesquelles la personne paroît exténuée & épuisée, la quantité des fluides est certainement très-petite; mais cependant elle est suffisante pour maintenir la vie pendant des mois & même des années, si on les conservoit dans un certain degré de douceur ou de température convenable; mais lorsqu'il ne se fait plus de réparation les évacuations diminuent en proportion, & par conséquent la quantité des fluides peut rester la même, mais leur qualité doit s'altérer & la putréfaction, pour les raisons ci-dessus, doit avoir

lieu & doit être une cause immédiate de mort, même, long-tems avant que la masse des fluides puisse être diminuée en quantité comme dans le cas ci-dessus.

Année 1710.
N°. 414.

A R T I C L E V.

Observations sur certains usages médicaux de l'arbre de la canelle, communiquées par M. Albert Seba, droguiste d'Amsterdam.

Il y a quelques années que j'ai acheté de la compagnie des Indes une quantité considérable de feuilles du cannellier; (*folia malabathri*) je les avois disposées dans des grandes boîtes & j'ai trouvé dans une d'elles des fleurs de cannellier, aussi grandes que des fleurs de haricots & d'un couleut bleue; je croyois trouver aussi le fruit, mais je n'ai pu en trouver dans aucune des boîtes.

Année 1719.
N°. 409.

En 1722 & en 1723 j'ai acheté, de la même compagnie, de l'huile que j'avois exprimée du fruit de l'arbre du cannellier, ainsi que celle qu'on obtient par ébullition, qui est d'une bonne consistance & d'une couleur blanche; c'est-là ce que la compagnie des Indes appelle cire de canelle; parce que le roi de Candie en fait faire des bougies qu'on brûle à sa cour & qui exhalent un par-

N ij

Année 1719.
N°. 409.

fum très-agréable. Ce même prince permet à ses sujets d'exprimer le suc d'un autre fruit qui est à peu près semblable au fruit du cannellier ; mais ce suc donne seulement une substance grasse, peu consistante qui ressemble à l'huile d'olives, & qu'on ne peut faire brûler que dans des lampes.

Les Indiens employent aussi l'huile consistante ou la cire du cannellier en médecine & la donnent à l'intérieur dans les cas de luxation, de fractures, de chûtes & de contusions, afin que sa vertu balsamique puisse les guérir ; ils l'administrent aussi dans des cas de flux de sang, à la dose d'un gros ou d'un gros & demi. Ils l'appliquent aussi à l'extérieur pour rendre la peau belle, douce & souple, & ce topique est à cet égard plus avantageux qu'aucune pommade connue.

Les feuilles de cannellier donnent aussi une huile qui a une saveur amère & qui ressemble à une huile de cloux de girofle mêlée avec une bonne huile de cannelle. C'est ce qu'on appelle *oleum malabathri*, ou huile de feuilles de cannelle. C'est un bon aromatique & qui est regardé comme un excellent remède contre les maux de tête, les douleurs d'estomac & d'autres maladies.

L'huile de la racine du cannellier est, à proprement parler, une huile de camphre, puisque les racines fournissent une grande quantité de cette

dernière substance. Il y a environ deux ans ou un peu plus que j'en achetâi une bouteille de la compagnie des Indes, & j'avois des preuves que cette huile étoit pure & sans nulle sophistication, aussi la collection d'où cette bouteille avoir été prise étoit très-estimée. Si cette huile est distillée dans des vaisseaux de verre on en tire cette sorte de camphre qu'on appelle camphre de Borneo, qui se réunit en cristaux, minces & transparens, & forme une belle variété d'une sorte de végétation dans le recipient, à peu près comme on voit par un tems de gelée se former des espèces de concrétions ramifiées sur les vitres des fenêtres. Cette sorte de camphre est d'une grande efficacité en médecine; il est recueilli & conservé pour le roi de Candie, qui le regarde comme un excellent cordial. Mais non-seulement le camphre de Borneo, mais encore l'huile de camphre qu'on retire des racines du cannellier est un grand cordial, si on la prend à l'intérieur. Elle fortifie l'estomac, chasse les vents & est d'un grand usage contre les affections arthritiques & gouteuses. Elle est aussi diurétique. La dose est de dix à douze gouttes sur un morceau de sucre ou dans un véhicule convenable.

Si on l'applique à l'extérieur dans toutes les douleurs arthritiques qui viennent du froid & des obstructions, où si on en frotte la partie affectée avec une main chaude, elle diminue aussi-tôt la douleur

Année 1719.
N°. 409.

& la fait même disparaître. Il y a environ 36 ans, qu'étant élève en pharmacie chez M. Dumbfidorff, à Amsterdam, ce dernier éprouva une attaque cruelle de douleurs arthritiques, en sorte qu'il ne pouvoit reposer ni jour ni nuit, & quoiqu'il eût appelé à son secours plusieurs médecins distingués, & qu'il eût fait usage de beaucoup de médicaments, cependant il n'éprouva aucun soulagement jusqu'à ce qu'on lui eût donné le conseil de se frotter avec l'huile de la racine du cannellier, dont il avoit alors une grande quantité. Je me rappelle que je frottai moi-même les parties affectées avec l'huile que je tenois dans ma main échauffée en la présentant devant un four, & je répétois ce procédé deux fois le jour pendant une heure chaque fois. Et quoique, lorsque ce traitement commença, ses mains & ses pieds fussent contournés par les convulsions & la violence des douleurs, & qu'ils fussent même remplis de nodosités, cependant dans une quinzaine de jours, il se trouva beaucoup mieux, en sorte qu'il reconvra le sommeil pendant la nuit, & qu'il n'éprouva plus ni douleurs ni crampes. Dans environ six semaines, il fut en état de marcher dans sa chambre, pendant qu'avant l'usage de ce remède il étoit incapable de se servir de ses mains & de ses pieds. Ce traitement fut continué pendant environ trois mois, & le malade se rétablit, non - seulement de son indisposition précé-

dente, mais il continua encore d'être exempt de la goutte après cela, & il vecut quinze années dans un état de santé parfaite. Je puis affirmer ce fait & je puis ajouter que depuis cette époque, plusieurs gouteux ont fait avec le même succès usage de ce remède par mes conseils.

Plusieurs médecins ont beaucoup écrit sur les vertus du camphre ordinaire; mais on n'a fait encore qu'entrevoir certaines propriétés dans cet excellent médicament. Ainsi je puis affirmer, par exemple, que dans toutes les brûlures qui peuvent survenir dans différentes parties du corps il n'y a pas de meilleur & de plus sûr remède que le suivant :

℞. Spiritus lumbricorum terrestrium cum spiritu vini rectificati, uncias duodecim; camphora. uncias duò : misce.

aussi-tôt qu'un linge est trempé dans ce mélange; appliqué sur la partie affectée; & contenu par un bandage, il arrête l'inflammation & empêche ses progrès. Mais cette application doit être continuée jusqu'à ce que la douleur se soit dissipée & l'ulcère, s'il y en a, soit desséché. Si l'ulcération est plus profonde & que la plaie reste ouverte, deux onces de camphre dissous dans l'huile d'hypéricum, mêlées avec une livre d'onguent ordinaire de céruse, & appliquées suivant les règles de l'art,

Année 1739.
N^o. 409.

guériront très-prompement & d'une manière sûre ;
comme je l'ai souvent éprouvé.

ARTICLE VI.

Mouvemens convulsifs guéris par une grande évacuation de vers , par M. R. Oram.

Année 1758.
Vol. IV.

Le jeune homme qui fait le sujet de cette observation , avoit souvent éprouvé depuis son enfance des mouvemens convulsifs qui avoient été ordinaires & supportables jusqu'à l'âge de sept ans. Vers cette époque ils commencèrent à l'attaquer de toutes les manières & suivant toutes les variétés imaginables. Quelquefois il étoit renversé à terre , d'autres fois son corps étoit replié comme une toupie ; dans d'autres circonstances il étoit élevé à une hauteur considérable , &c. Une fois il sauta par dessus une barre de fer qu'on avoit mise devant le feu pour empêcher d'y tomber. Il éprouva une grande brûlure , mais il devint si habituellement stupide par les accès convulsifs , qu'il ne témoigna aucun sentiment de douleur après cet accident. Son entendement étoit si éteint , par la fréquence & la violence de ses accès convulsifs qu'il ne paroissoit rien sentir. Il ne reconnoissoit plus ni son père ni sa mère par

aucune expression ni par aucun signe, & ne paroissoit pas les distinguer des personnes qui lui étoient étrangères. Si quelquefois il sortoit de sa maison en échappant à la surveillance de sa famille, il ne savoit plus retrouver sa demeure, mais il prenoit la première route qui se présentoit & quelquefois il s'égaroit entièrement. Il sortit une fois pendant la nuit & on le trouva le lendemain matin dans un marais, enfoncé dans la boue jusqu'à la poitrine. Il étoit très-vorace & il demandoit souvent à manger, & c'étoit-là la seule marque qu'il donnoit de son entendement. Il n'y avoit aucune sorte d'ordure ni de salé qu'il ne s'empressât de manger sans distinction. Il étoit si maigre qu'il ne paroissoit point avoir de la chair sur ses os, & son corps étoit si difforme qu'il en étoit presque estropié. Ses parens consultèrent un médecin de Norwich, qui jugea très-judicieusement que ces affections étoient dues à des vers & fit des prescriptions convenables; mais craignant de donner des médicaments trop violens à ce jeune homme, il ne produisit aucun effet. En un mot, le mal étoit si singulier & si extraordinaire, que les parens ne pouvoient s'empêcher de l'attribuer à quelque maligne influence ou sorilège.

On observa que le mal varioit ou empirait à certains périodes lunaires.

Ce pauvre jeune homme continua de languir

Année 1712.
Vol. IV.

Année 1758.
Vol. IV.

dans ces malheureuses circonstances jusqu'à l'âge de 11 ans. (en Juillet 1757) A cette époque il trouva par hazard un mélange de plomb blanc ou céruse, & d'huile (1), qui avoit été préparé pour une peinture, & qu'on avoit mis dans un vase placé hors de sa portée. Il y avoit presque une demi-pinte de ce mélange quand il tomba sous sa main, & comme il n'en laissa pas beaucoup, on croit qu'il en avala le quart d'une pinte.

Cette boisson commença à opérer très-promp-
tement par haut & par bas, ce qui dura près de 24 heures de la manière la plus violente. Il évacua une grande quantité d'une matière noire comme de l'encre & il rendit un nombre presque infini de vers qui étoient aussi grêles que des fils. L'action du remède fut si extrême qu'on désespéra de sa vie; cependant il ne survécut pas seulement à ces accidens, mais encore il en éprouva un changement marqué & il se trouva beaucoup mieux; car ses perens m'assurèrent, en Novembre 1757, lorsque je les vis, qu'il alloit mieux de jour en jour,

(1) Il y a apparence qu'une portion considérable de lait de chaux avoit été substituée à la céruse, comme cela arrive si souvent; ce qui le prouve c'est que ce mélange ne devint pas funeste à ce jeune homme, ce qui n'auroit pas manqué s'il avoit pris une aussi grande quantité de céruse.

soit pour le corps soit pour l'esprit, depuis la boisson de ce mélange. Son amaigrissement avoit disparu, & il étoit devenu gras & corpulent, & son appétit n'étoit plus vorace, mais modéré. Son corps prit aussi une attitude droite & naturelle. Sa raison ne s'étoit pas moins fortifiée; il est vrai qu'on ne pouvoit pas attendre qu'il l'eût recouvrée telle qu'il l'avoit avant sa maladie; mais quand je le vis il avoit acquis presque autant de connoissance dans quatre mois que les enfans le font en quatre années & il raisonnoit bien sur ce qu'il connoissoit. Il est maintenant capable de se rendre utile dans plusieurs occasions, & on l'envoie souvent à un ou deux mille pour faire des messages dont il s'acquitte aussi soigneusement que toute autre personne.

Il faut remarquer que la mère de l'enfant, son père & sa sœur sont souvent tourmentés de vers. Son père, quoiqu'âgé de 30 ans, en est souvent incommodé. Les vers qu'il évacue sont aplatis & beaucoup plus gros que ceux que rendent les enfans. La sœur en est souvent excessivement tourmentée. Il y a environ trois mois qu'elle fut jetée dans des convulsions violentes qui la privèrent quelque tems de l'usage de ses sens. Mais la mère en a été encore tourmentée d'une manière plus extraordinaire. Il y a environ 20 ans qu'elle évacua par les pores de la peau quelques vers, ou du

Année 1732.
Vol. IV.

Année 1758.
Vol. IV.

moins on les trouva dans des petites ampoules sous ses bras. Comme elle étoit alors très-jeune, elle ne se rappelle plus les affections particulières dont elle fut alors attaquée; elle se ressouvient seulement d'avoir éprouvé quelques violens sursauts & des convulsions. Elle a maintenant 56 ans, & elle est sujette à des syncopes lorsqu'elle est couchée dans son lit; il y a peu de doute que ce mal ne soit occasionné par les vers.

ARTICLE VII.

Relation de deux cas extraordinaires de pierres biliaires; par M. J. Johnstone.

Année 1758.
Vol. IV.

Quoiqu'il soit bien connu que les affections coliques & ictériques viennent souvent de pierres biliaires engendrées dans les conduits de la bile, qui souvent les obstruent, cependant l'exemple d'un calcul biliaire d'un volume aussi énorme que celui qu'on va rapporter, est un cas très-rare, si toutefois il n'est pas unique dans son genre. Il peut servir à faire voir qu'il ne faut pas si aisément désespérer de l'expulsion des plus gros calculs biliaires, & il doit nous apprendre que toutes les attaques violentes de douleur vers la région de l'estomac, ne sont pas dues à la rétrocession de

la goutte vers cet organe. On fera aussi plus réservé dans l'emploi des purgatifs drastiques, & des médicaments échauffans d'après des indications aussi vagues. C'est encore une nouvelle leçon pour les médecins, de faire attention aux plus légères circonstances & aux symptômes les plus minutieux qui peuvent se présenter dans les maladies.

Le second cas que je vais rapporter indique la possibilité d'extraire par l'incision, de la vésicule du fiel, les calculs qui, par leur figure & les obstacles qu'ils rencontrent, ne peuvent être évacués suivant les voies naturelles. La méthode de faire cette opération inusitée, ainsi que quelques exemples de succès, ont été déjà publiés dans les mémoires de l'académie de chirurgie.

I. Mad..... d'un âge avancé, pleine d'embonpoint & menant une vie très-sédentaire, fut beaucoup sujette à des douleurs de colique avec la jaunisse dans la vigueur de l'âge. Le siège de la douleur étoit surtout à l'hypocondre droit, à la hauteur de l'estomac. Elle en avoit été assez exempte depuis les huit dernières années. Mais le 5 Décembre 1753, vers les onze heures du soir, elle fut subitement attaquée d'une violente douleur qui s'étendoit depuis cette partie de l'estomac qui est au côté droit jusqu'à son dos. Elle comparoit cette douleur à celle que produiroit une épée dirigée dans ce sens. La douleur continuoit non-

Année 1753.
Vol. IV.

Année 1758.
Vol. IV.

seulement avec une violence sans relâche, mais elle augmenta encore jusqu'à sept heures du matin; pendant tout ce tems elle vomit & fit des efforts continuels; mais après que son estomac eut été bien évacué, il n'en sortoit plus qu'une matière glaireuse, avec quelques teintes de sang. Vers les sept heures du matin sa douleur s'abattit comme elle disoit elle-même, & depuis cette époque elle devint de plus en plus légère. Aussi-tôt après ce changement elle éprouva de grandes envies de vomir, & elle vomit même une énorme quantité d'une bile jaune & verdâtre. Avant cette attaque elle n'avoit jamais été constipée & durant même sa douleur elle avoit rendu des déjections, mais durant le reste du jour (le 6^e Décembre) elle n'avoit plus été à la selle quoiqu'on lui eût administré des lavemens émolliens; elle prit régulièrement de deux en deux heures la poudre *de magnésie blanche, de terre foliée de tartre & de tartre vitriolé, parties égales un scrupule; huile de noix muscade, une goutte.* Cette poudre se prenoit dans une potion de suc de limon & de sel d'absynthe. Mais vers minuit, & tout le lendemain 7^e du même mois, elle fendit par l'anus une grande quantité de matières bilieuses. La douleur se calma alors & elle n'éprouva plus qu'un certain malaise dans les intestins, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre.

Vingt-quatre heures après la première attaque

elle éprouva une grande douleur au dos & une heure après elle évacua un calcul extraordinaire, du genre des biliaires. Il s'évacua aussi par les felles quelques morceaux de peaux qui étoient évidemment de la texture & de la forme de la tunique villeuse des intestins & de la vésicule du fiel. Ce sont là les seuls médicamens dont la malade a usé par mes conseils, si on en excepte une fomentation extérieure & une saignée que la dureté du pouls sembloir indiquer. Je lui prescrivis de faire un usage abondant de bouillons légers & d'autres liqueurs délayantes. Durant le cours de sa maladie elle n'offrit aucune apparence de jaunisse ni après cela, & elle jouit maintenant (en Septembre 1757) d'une très-bonne santé.

Année 1757.
Vol. IV.

Le calcul expulsé est pyriforme & analogue à l'intérieur de la vésicule du fiel elle-même. Sa surface est polie, excepté vers la base où elle est un peu scabreuse, comme s'il avoit été contigu dans cette partie avec quelque substance dure. En le coupant en travers, il est composé de lames concentriques qui sont alternativement blanches & d'une couleur d'ochre; mesuré dans sa longueur il a un pouce & trois dixièmes; son diamètre transversal a au moins sept dixièmes de pouce. Il est savonneux au toucher comme les autres calculs biliaires & il nage dans l'eau; il pèse environ 126 grains.

Quoiqu'il soit difficile de concevoir comment

Année 1758.
Vol. IV.

une substance aussi volumineuse, produite dans la vésicule du fiel ait pu franchir un passage aussi étroit que le conduit biliaire ordinaire, surtout en considérant l'obliquité de son insertion, qui est de près d'un pouce & demi entre les tuniques du *duodenum*, cependant il semble qu'il y ait assez de données dans le cas ci-dessus pour prouver que cette concrétion animale n'a pas été formée dans le conduit alimentaire, mais que quelque volumineuse qu'elle soit, elle est venue à travers le conduit choledoque.

La forme & le poli savonneux de cette substance aussi bien que la couleur de ses lames, montrent qu'il a été moulé dans la vésicule du fiel & qu'il a été formé de particules bilieuses. La douleur cruelle, les tourmens & les vomissemens énormes qui ont duré sept heures après la première attaque indiquent que ce calcul étoit logé dans un conduit beaucoup plus étroit & plus resserré que le canal alimentaire, car aussi-tôt qu'il a été conduit dans ce dernier, les douleurs ont cessé.

Il paroît aussi que le conduit étroit dans lequel il a été arrêté pendant sept heures n'étoit point autre que le *ductus communis choledocus*; car durant cet espace de tems il n'y a point eu évacuation de la bile par l'anus ni par les vomissemens. Mais aussi-tôt que la douleur a eu changé de lieu & que son siège est devenu plus inférieur) sensation qui indiquoit

indiquoit le moment précis du passage du calcul dans le *duodenum*) les envies de vomir sont revenues & il a été rejeté par le haut une grande quantité de matière bilieuse, qui a commencé aussi à couler librement par ce conduit désobstrué dans le *duodenum*. L'obstruction du canal choledoque a duré trop peu de tems (seulement trois heures) pour occasionner une jaunisse remarquable. Il paroît par les caillots de sang comme charnus, qui ont été rejetés avec des glaires par le vomissement, que le passage du calcul n'a pu s'effectuer sans une lacération considérable des pellicules des conduits biliaires; & cela rend raison de la séparation de la tunique villeuse qu'on a trouvée après cela dans les déjections du malade.

Année 1758.
Vol. IV.

II. En Février 1752 je fus appelé pour voir une femme âgée d'environ trente ans & mère de plusieurs enfans. Elle avoit la jaunisse & se plaignoit d'une douleur aiguë à travers l'hypocondre droit jusqu'au dos, avec de fréquens vomissemens. On sentoit une dureté naturelle vers le creux de l'estomac ou un peu près de l'hypocondre droit. Quand on pressoit cette région, elle se plaignoit d'une grande douleur qui étoit toujours augmentée lorsqu'elle se couchoit sur le côté gauche. Elle fut saignée, on lui fit des fomentations extérieures, on lui administra des lavemens savonneux, émolliens, & elle fit usage d'un apozème nitreux & de pilules

Année 1758.
Vol. IV.

composées de *galbanum* & de *savon*, & fut ainsi bientôt guérie. Elle éprouva des retours fréquens de la même affection, mais je la perdis de vue jusqu'en Janvier 1755; elle étoit alors dans un état d'insensibilité, une attaque l'ayant privée plusieurs jours de l'usage de la parole & de tous ses sens. Trois mois après son rétablissement de cette attaque M. Cooper, son apothicaire, m'instruisit que par une plaie faite au creux de l'estomac, elle avoit évacué, depuis sa dernière maladie, plusieurs calculs biliaires. Je pris les mêmes informations auprès de la malade, & elle me montra sa plaie qui étoit presque entièrement cicatrisée. Elle me dit qu'aussi-tôt après sa première indisposition, il s'étoit formé un bouron sur cette partie de la region précordiale, qui avoit été dure, même depuis qu'elle avoit été sujette à la jaunisse. Ce bouron se creva; il en sortit de la matière & en différens tems des calculs qu'elle me montra & qui avoient été rejetés avec le pus. Son estomac avoit été un peu douloureux, avant que ce petit dépôt s'ouvrît, mais la douleur avoit ensuite disparu. Les calculs qu'elle me montra avoient l'apparence de petits fragmens appartenans à d'autres calculs plus volumineux. J'en ai conservé moi-même deux ou trois. Ils sont légers, suragent l'eau, ils sont doux au toucher comme du savon; ils sont aussi d'une couleur jaune & dans quelques parties

avec une teinte brune. Ils consistent dans des couches concentriques. Cette pauvre femme a eu depuis ce tems-là des retours de douleur & de jaunisse, dans l'intervalle desquels sa peau étoit nette & blanche. Elle vit encore & peut attester la vérité de ces faits.

Année 1758.
Vol. IV.

Note du rédacteur. M. Durande, médecin de Dijon, vient de publier des observations intéressantes sur l'efficacité du mélange d'éther sulfurique & d'huile volatile de térébenthine dans les coliques hépatiques produites par des pierres biliaires. Le mélange éthéré agit-il comme dissolvant ou comme antispasmodique ? M. Durande laisse entrevoir que ce remède paroît agir par sa propriété de dissoudre les calculs biliaires & en effet il s'est assuré que la vapeur du mélange d'éther sulfurique & d'huile volatile de térébenthine avoit cette propriété, puisqu'en suspendant une concrétion biliaire dans un flacon qui n'étoit rempli qu'à moitié de ce fluide, au bout de quelques jours, sans avoir touché à la liqueur, la concrétion s'est trouvée en partie fondue & que le reste s'est écrasé sous ses doigts dès qu'il a voulu le toucher.

« L'éther sulfurique & l'huile volatile de téré-
» benthine, ajoute-t-il, dans quelque état qu'ils
» puissent être, sont toujours dissolvans des pierres
» biliaires. Mais tandis que l'air qui revient des
» intestins, tandis que l'alkool peuvent pénétrer

O ij

» dans la vésicule du fiel, qui pourroit empêcher
 » ce mélange si subtil d'arriver à ce réservoir de
 » la bile? On fait que le conduit choledoque est
 » souvent dilaté par les coliques antérieures, que
 » la pierre biliaire se rapproche souvent de l'in-
 » testin & en filant ce même conduit : pourquoi
 » les vapeurs répandues dans tout le trajet des
 » intestins n'enfileroient-elles pas cette voie?
 » D'ailleurs la vésicule du fiel repose immédiate-
 » ment sur le *duodenum*. Les parois de cet intestin,
 » ceux de la vésicule peuvent-ils arrêter une liqueur
 » aussi pénétrante & l'empêcher d'atteindre les
 » pierres biliaires....? Ce mélange doit être pré-
 » féré à une foule d'autres remèdes dont les pro-
 » priétés sont imaginaires, qui ne servent qu'à
 » fatiguer les malades sans les conduire à la gué-
 » rison ».

Mais, quoi qu'il en soit de la manière d'agir
 du remède de M. Durande, il n'est pas moins
 prouvé par les observations les plus directes, qu'il
 est d'une singulière efficacité contre les coliques
 produites par des calculs biliaires. Nous nous
 bornerons à rapporter ici l'extrait de la cinquième
 observation, pour donner une idée juste de cette
 méthode.

M. R... souffroit depuis plus de vingt ans des coli-
 ques hépatiques qui, après dix à douze heures de
 douleurs aiguës, se terminoient assez souvent par

la jaunisse. Après l'usage vain de plusieurs remèdes qui lui avoient été administrés, elle consulta M. Durande, qui, après avoir fait précéder l'usage des bains & des délayans, prescrivit le dissolvant des pierres biliaires, mais seulement avec deux gros d'huile de térébenthine sur trois gros d'éther, dose qu'il croit la plus convenable dans tous les cas. La malade prenoit chaque jour le cinquième de ce mélange; elle buvoit par-dessus du petit-lait avec des suc d'herbes & par la suite des eaux de Vichy coupées avec le petit-lait. Elle prenoit encore chaque jour deux bains & deux lavemens. Le mélange d'éther & d'huile volatile de térébenthine fatiguoit d'abord l'estomac, mais l'usage de ce remède devint infiniment plus supportable, dès que le malade s'astreignit à le prendre dans le bain. Depuis deux mois la malade ufoit de ce remède sans avoir de colique, mais tout à coup elle ressentit une douleur violente à l'hypocondre droit; la douleur étoit calmée lorsque M. Durande arriva, & le lendemain il reconnut dans les selles des concrétions qui conservoient la forme des pierres biliaires, mais qui étoient très-molles. La malade en a rendu d'autres depuis ce tems, mais leur sortie n'étoit précédée que d'un léger mal-aise au côté droit. Enfin après avoir pris en divers tems près de 18 onces du mélange d'éther & d'huile volatile de térében-

Année 1758.
Vol IV.

Année 1758.
Vol. IV.

chine, la malade fut purgée sans douleur, contre son ordinaire, ce qui indiquoit que le foie étoit débarrassé. La malade a continué encore quelque tems l'usage des délayans pour prévenir les concrétions biliaires.

ARTICLE VIII.

Rapport d'une maladie qui eut lieu lors d'une assemblée de jurés à Oxford l'année 1577 ; extrait du registre du collège de Merton dans cette université & communiqué par M. J. Ward, avec quelques remarques additionnelles.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Le recteur du collège de Merton, assisté de son conseil, dispensèrent les étudiants d'une assemblée qui devoit avoir lieu après la fête de S. Pierre aux Liens, de peur que par un grand rassemblement, une maladie qui depuis cinq années étoit très-meurtrière, ne causât de nouveaux ravages & ne se communiquât par contagion. En effet le 15, le 16 & le 17 de Juillet, il y avoit plus de trois cents malades, & dans l'espace de douze jours il étoit mort plus de cent étudiants, sans compter un grand nombre d'autres citoyens. C'est un tems très-défastré & rempli de deuil ; car quelques malades quittant leurs lits & agités d'une certaine fureur

par la force de la maladie & de la douleur, frappent à coups de bâton ceux qui les servent & les chassent; d'autres courent çà & là dans les rues & dans les places publiques, comme des maniaques; il y en a qui se précipitent dans la rivière; tout le monde tombe dans le découragement; les médecins prennent la fuite; on abandonne les malheureux; & les Recteurs, les Professeurs & les Préfets des collèges quittent leurs postes.

Notre seul Recteur (celui du collège de Merton) plein de vigilance, est resté au milieu de nous & a donné les soins les plus assidus aux malades qu'il a visités sans cesse nuit & jour. Nous avons perdu cinq personnes dans ce collège; les écoliers qui restent, comme ceux qui se rendent chez leurs parents, sont frappés de la maladie. Qui pourroit n'être point surpris de voir la foule des malades qui se rendent avec précipitation chez les médicastres. On épuise dans peu de tems les conserves, les syrops, les huiles, les eaux douces, les boîtes & les confectiions de toute espèce, des boutiques des apothicaires. Les malades se plaignent d'une douleur violente de la tête & de l'estomac; ils sont attaqués de frénésie, privés de la raison, de la mémoire, de la vue, de l'ouïe & des autres sens. Durant les progrès de la maladie, ils ne prennent point de nourriture, ils ne dorment point & ils ne souffrent personne ni pour les servir, ni pour

O iv

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

les garder. Ils conservent leurs forces & leur agilité jusqu'au moment même de la mort ; & sur le déclin de la maladie, tous les symptômes sont les plus irréguliers ; aucune complexion, aucune constitution n'en est exempte ; cette maladie cependant attaque davantage les tempéramens bilieux ; les médecins en ignorent les causes & le traitement. Plusieurs soupçonnent qu'elle provient de l'air fétide & pestilentiel des voleurs qu'on a fait sortir de leurs prisons, & en effet il en est mort deux ou trois dans les fers des cachots. Les juges des assises ou assemblées de jurés, sont presque tous morts après avoir quitté Oxford ; les plus robustes étoient ceux qui succomboient le plus promptement.

Les femmes n'en sont point attaquées ni les pauvres ; on ne voit pas non plus périr aucun de ceux qui ont visité ou rendu de bons offices aux malades. Comme cette maladie a été très-violente, elle a eu peu de durée, car dans moins d'un mois presque tout le monde en a été délivré.

Remarques additionnelles sur le rapport ci-dessus ; adressées à M. Birih, secrétaire de la société royale.

Cambden, dans ses annales sur la reine Elisabeth, remarque qu'à l'exception des femmes & des enfans, presque tous ceux qui étoient présens

aux assises d'Oxford, pour le jugement d'un imprimeur accusé d'avoir mis au jour des écrits séditieux, furent attaqués de maladie, & qu'il mourut presque trois cents personnes. M. John How, dans sa chronique d'Angleterre, grossit encore plus ce nombre, & il assure qu'il mourut trois cents personnes à Oxford, & plus de deux cents dans divers autres lieux, depuis le 6^e Juillet jusqu'au 12 Août, après quoi il ne mourut personne de cette maladie. Cet historien est d'accord avec M. Cambden, sur ce que celui-ci dit qu'il ne mourut aucune femme ni aucun enfant pour la même cause. Le docteur George Ethrig, médecin, qui pratiquoit alors à Oxford, dit dans son second livre qui a pour titre *Hypomnemata quedam in aliquot libros Pauli Æginete, seu observationes medicamentorum quæ hac ætate in usu sunt*, imprimé à Londres en 1588, rapporte que la première nuit que cette maladie se déclara, il y eut plus de six cents personnes qui en furent attaquées, & que la nuit suivante, elle gagna les villages voisins d'Oxford, où il y eut plus de cent personnes qui en furent encore atteintes. Le lord Bacon, dans son histoire naturelle, parle évidemment d'une maladie de la même nature, cent. X, n. 914. « L'infection la » plus pernicieuse, après la peste, est l'odeur des » prisons où plusieurs hommes ont resté long- » tems & soigneusement renfermés ; c'est pour-

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

» quoi nous avons éprouvé de notre tems deux
 » ou trois fois que les juges des assises , ainsi que
 » ceux qui les assistoient , étoient attaqués de la
 » même maladie ; par conséquent il seroit prudent
 » que dans de pareils cas , les prisons fussent bien
 » ouvertes à l'air avant d'en faire sortir les prison-
 » niers ». Nous avons aussi un semblable rapport
 de M. Wood sur des assises tenues à Cambridge
 en 1522 & durant le règne de Henri VIII. Les
 juges , les assistans & les baillis qui étoient dans
 ces assemblées , furent attaqués de la maladie qui
 devint mortelle pour un grand nombre de person-
 nes. Celles qui-échappèrent furent très-dangereuse-
 ment malades. A l'égard d'un malheureux exem-
 ple du même genre qui eut lieu en 1750 , on peut
 consulter l'excellent ouvrage du docteur Pringle
 qui a pour titre : *Observations sur les maladies des*
armées dans les camps & dans les garnisons.

ARTICLE IX.

Rapports de quelques effets extraordinaires causés
par des convulsions ; extrait d'une lettre adressée
à M. J. Husham ; par M. G. Watfon.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

En Janvier 1757 , je fus appelé pour voir une
 jeune demoiselle qui éprouvoit les plus violentes
 convulsions que j'aie jamais observées , soit pour le

nombre ou la durée, soit pour leurs fréquens retours. Quelquefois les spasmes des muscles étoient généraux, & d'autres fois il n'y avoit d'affectés que certains muscles qui servent à des fonctions particulières de l'économie animale. Telle étoit la singularité de ce cas, qu'à proportion que chaque muscle, ou un nombre déterminé de muscles avoit été dans un état de spasme, il succédoit un état de paralysie dans ces muscles, dont les fonctions étoient si altérées & si affoiblies que la malade étoit quelquefois incapable d'aucune action nécessaire à la vie. Lorsque, par exemple, les muscles qui servent à la déglutition avoient été dans un état convulsif pendant plusieurs heures après que les accès avoient cessé, la malade ne pouvoit plus avaler une goutte de liquide, de sorte que quand elle essayoit de boire, il falloit qu'elle avalât immédiatement & d'un seul trait, sans quoi elle s'exposoit à être suffoquée. Lorsque ses yeux avoient été attaqués, il s'ensuivoit souvent une goutte seréine & un aveuglement entier, & la malade pouvoit soutenir la plus vive lumière du jour avec ses yeux ouverts, sans être sensible à son impression, & sans que les pupilles, extrêmement dilatées, se contactassent le moins du monde. Après un de ces huit accès l'aveuglement avoit continué plusieurs jours, & je commençai à craindre que sa vue ne fût perdue sans retour.

Année 1788.
Vol. LXXIX.

Année 1748.
Vol. LXXIX.

Vous, Monsieur, qui avez tant acquis de connoissances dans l'économie animale, vous n'ignorez pas que la trachée artère est l'organe de la vocalisation, & que l'articulation de sons en syllabes & en mots, est modulée principalement par la langue & les muscles qui sont autour du larinx. Dans le cas dont je parle, ce fut de très-bonne heure & au début de la maladie, que les spasmes attaquèrent les muscles qui sont vers le larinx ; la conséquence fut que lorsque les fonctions eurent été détruites, il ne fut plus possible à la personne de prononcer un seul mot. Cette faculté se rétablit cependant, mais elle cessa peu de tems après, aussitôt que les accès revinrent, & la malade fut de nouveau privée du don de la parole. Après l'avoir perdue une seconde fois, elle ne la recouvra plus, même après avoir été exempte de convulsions & s'être pleinement rétablie. Il se passa quatorze mois sans qu'elle pût proférer une seule parole ; mais à cette époque s'étant un jour violemment échauffée pendant une danse de quatre heures, elle reprit soudain la faculté de parler, & elle l'a parfaitement conservée depuis cette époque.

Ce qu'il y a encore de remarquable dans ce cas ; c'est que durant tout le tems que l'organe de la parole ne pouvoit exercer ses fonctions, la vie lui étoit encore devenue plus insupportable en ce que par l'atteinte qu'avoit éprouvé le cerveau, cette

jeune personne avoit oublié d'écrire & de trans-
mettre ainsi sa pensée ; mais en recouvrant la pa-
role, elle recouvra aussi la faculté d'écrire & ne l'a
plus perdue. Durant cette cruelle maladie qui per-
sista pendant plusieurs semaines, & qui me faisoit
craindre chaque jour sa perte par le nombre & la
violence des convulsions, je mis en usage tout ce
que je pus imaginer pour empêcher le retour des
spasmes, ou pour diminuer leurs effets. Mes ef-
forts furent suivis d'un si heureux succès, que les
attaques n'eurent plus lieu ; mais les suites en fu-
rent prolongées & surtout la suspension des fonc-
tions organiques de la parole. Après quelques mois
cependant, ayant repris des forces, je desirai d'es-
sayer les effets de l'électricité, appliquée plus par-
ticulièrement aux environs du gosier. C'est ce qui
fut exécuté ; mais tel étoit l'état des nerfs & leur
sensibilité à l'action du fluide électrique, que ce
dernier rappela les attaques qui affectèrent ensuite
sa vne, de sorte que je fus obligé de cesser, de
peur qu'en tâchant de rétablir l'organe de la
parole, non-seulement je fusse déchu de mon
attente, mais qu'encore je parvinsse à produire un
aveuglement permanent. Je me déterminai par
conséquent à abandonner le tout aux soins de la
nature qui a su si bien produire une guérison par-
faite.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

ARTICLE X.

Rapport d'un examen fait de certains lépreux à l'île de la Guadeloupe ; par M. And. Peysonel, docteur en médecine & membre de la société royale.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

IL y a environ vingt-cinq ou trente ans qu'il s'est manifesté ici une maladie singulière; son début est imperceptible, elle paroît sous la forme de petites taches d'un rouge livide sur la peau des blancs & d'un rouge jaunâtre sur celle des nègres. Ces tâches ne sont accompagnées au commencement ni de douleur ni d'aucun autre symptôme; mais rien ne peut les faire disparaître. Cette maladie augmente insensiblement & continue depuis plusieurs années de se montrer de plus en plus. Les taches prennent de l'accroissement & s'étendent indifféremment sur toute la peau du corps. Quelquefois elles sont un peu proéminentes mais applaties. Quand la maladie fait des progrès, la partie supérieure du nez s'enfle, les narines s'élargissent & le nez s'amollit; il paroît des tubérosités sur les os de la joue; les paupières sont enflées; les oreilles deviennent épaisses; les extrémités des doigts & même les pieds & les orteils s'enflent

aussi ; les ongles deviennent écailleux ; les jointures des pieds & des mains se séparent & tombent en gangrène ; il se forme des ulcères secs & profonds dans les paumes des mains & sous les pieds, avec des alternatives de guérison & de retour. En un mot quand la maladie est au plus haut point, le malade devient hideux & tombe en pièces. Tous ces symptômes se déclarent par degrés l'un après l'autre, & demandent quelquefois plusieurs années pour leur développement. Le malade n'éprouve point de douleur cruelle, mais il sent une sorte d'engourdissement dans ses pieds & ses mains. Il remplit ses fonctions ordinaires ; il boit & il mange à son ordinaire ; & lors même que la gangrène lui a fait tomber les doigts & les orteils, il ne s'ensuit rien autre chose que la perte de ces parties gangrenées, car la plaie se guérit d'elle-même sans aucun topique. Mais quand la maladie vient à son dernier période, celui qui en est attaqué est horriblement défiguré & digne de compassion.

On observe que cette affreuse maladie a plusieurs caractères malheureux ; 1°. elle est héréditaire & plus propre à certaines familles qu'à d'autres ; 2°. elle se gagne par contagion, se communiquant par le coït & se propageant en vivant avec des personnes qui en sont atteintes ; 3°. elle est incurable, ou du moins on n'a point trouvé jusqu'ici aucun remède pour la guérir. On a essayé

Année 1752.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

en vain le traitement par le mercure, les sudorifiques & tout autre méthode propre à combattre les maux vénériens, dans l'idée que cette lèpre particulière étoit une suite de cette dernière maladie; mais au lieu de produire quelque avantage, ces moyens ont plutôt concouru à accélérer la marche de la maladie & à développer de nouveaux symptômes qui rendoient plus prochaine la mort du malade.

La crainte d'être infecté de cette cruelle maladie; la difficulté d'examiner les personnes qui en étoient infectées avant que la maladie parvînt à son dernier période, la longueur du tems pendant lequel elle reste cachée, à cause du soin que les malades ont d'en faire un secret, l'incertitude des symptômes qui la distinguent au commencement, produisent une frayeur extrême parmi tous les habitants de l'île; ils se soupçonnent les uns les autres sans que la vertu ni le mérite puisse leur servir de garant. Ils appellent cette maladie lèpre & ils présentent par conséquent des mémoires aux intendants & aux commandans des troupes, en leur exposant les faits que je viens de rapporter, leurs justes appréhensions, le bien public, les calamités qui en proviennent pour la colonie, les plaintes & les haines qui donnent lieu à des accusations parmi les loix qu'on a faites contre les lépreux, & leur expulsion de la société. Ils ont demandé une
vilité

visite générale de toutes les personnes soupçonnées d'être atteintes de cette maladie, afin que celles qui seroient reconnues pour telles pussent être renvoyées dans des hôpitaux particuliers ou dans des maisons séparées.

Ces mémoires ont été envoyés en Cour & on a donné ordre de faire une visite générale. C'est alors, que le poste du médecin botaniste étant venu à vaquer dans l'île de Cayenne, il plut au ministre de me nommer, & quoique cette île fût plus fertile en découvertes physiques que toutes les autres, je crus convenable de changer ma destination & je fus envoyé à la Guadeloupe, & on n'omit point l'article de la lèpre dans mes instructions.

Quand j'arrivai à la Martinique en 1717 M. Blondel, alors intendant des îles Françaises, me communiqua les ordres de la Cour & tous les mémoires qui se rapportoient à cette affaire. Etant arrivé à la Guadeloupe je commençai, suivant les ordres que j'en avois reçus, ma dangereuse commission, sans m'en dissimuler les dangers qui pouvoient en être la suite. J'avois si souvent entendu parler des taches des lépreux que je voulus savoir si ce qu'on m'avoit dit étoit vrai, car je ne pouvois comprendre qu'une maladie qui est si affreuse vers sa fin & dont les symptômes étoient alors si terribles, pût continuer dix

Année 1758.
Vol. LXXIX.

ou quinze années sans aucune autre apparence que de simples taches qui en elles-mêmes n'avoient rien de bien mauvais. Je pris des informations pour m'assurer du fait. Plusieurs médecins & chirurgiens, ainsi que d'autres habitans dignes de foi comme observateurs, s'accorderent tous à me donner des assurances que je ne pouvois révoquer en doute. Voici ce que j'ai observé en remplissant ma commission.

Résultat de la visite.

1°. Aucun des malades que j'ai visités n'avoit la fièvre, & ils déclaroient tous qu'ils n'éprouvoient ni incommodité ni douleur, mais qu'au contraire ils mangioient, buvoient & dormoient très-bien, ce qui étoit d'ailleurs prouvé par leur embonpoint qui se soutenoit lors même que la maladie étoit la plus confirmée.

2°. La maladie se manifestoit dans les nègres par des taches rouges un peu élevées au-dessus de la peau, mais sèches, sans écailles & sans aucun écoulement; elles étoient seulement d'un rouge livide & d'un mauvais aspect. Les nègres portent quelquefois les taches de leur pays natal. On trouve constamment ces taches sur toutes les personnes attaquées de cette maladie, & elles sont plus nombreuses à mesure que la maladie est plus invétérée.

3°. Parmi les blancs cette maladie se manifeste au commencement par des taches d'une couleur livide violette sans douleur ; elles sont suivies de petites vésicules aqueuses , particulièrement sur les jambes ; ces ampoules se crevent & laissent de petits ulcères avec des bords pales & qui diffèrent pour leur nature des ulcères ordinaires.

4°. A proportion que la maladie augmente , les mains & les pieds se gonflent sans aucun signe d'inflammation, sans rougeur, ni douleur, ni aucune apparence d'œdème ; cet accroissement de volume paroît tenir de la nature de l'embonpoint. Ce développement des pieds & des mains qui n'est nullement douloureux, est seulement accompagné d'une sorte d'engourdissement

5°. A cet état des pieds & des mains succèdent des ulcères blancs & profonds sous la peau ; ils deviennent calleux & insensibles, & il en découle seulement une matière séreuse & claire comme de l'eau, sans presque aucune douleur. Après cela les extrémités des doigts se dessèchent, les ongles deviennent écaillés ; les extrémités des doigts tombent & les jointures se séparent sans douleur ; après quoi les plaies se cicatrisent d'elles-mêmes sans le secours des médicamens. Pendant les progrès de la maladie, il se forme des duretés dans la chair ; la couleur se ternit, le nez se gonfle & les narines deviennent larges ; enfin le nez

Année 1718.
Vol. LXXIX.

est aussi mou que de la pâte, la voix devient enrouée, les yeux brillans & le front se couvre de dartres & de nœuds comme le reste de la face. Les paupières grossissent, l'aspect devient horrible, l'haleine fétide, les lèvres enflées, & il se forme de gros tubercules sous la langue. Les oreilles sont alors épaisses, rouges & pendantes, & telle est l'insensibilité de toutes les parties, que je pouvois enfoncer des épingles à travers les mains de plusieurs malades sans qu'ils y fussent sensibles. En un mot tous ces malades périssent par degrés & tombent en mortification; leurs membres se séparent d'eux-mêmes sans aucune douleur considérable, & lors même que les malades sont en état de remplir leurs fonctions naturelles.

6°. Les lépreux vivent ainsi plusieurs années sans d'autre incommodité, & même leur état peut ainsi durer quinze ou vingt-années, car la maladie commence insensiblement & ne se développe que très-lentement.

7°. Les remèdes antivénériens que j'ai prescrits pour quelques malades ont été tous sans succès; s'ils ont quelquefois pallié les symptômes, ils ont aussi souvent hâté le progrès de la maladie; en outre je ne me suis jamais aperçu que les parties de la génération ayent été infectées, & je n'ai observé aucune marque de maladie vénérienne.

8°. Quelques malades offrent, il est vrai, des

symptômes particuliers; dans quelques-uns on observe la chute des cheveux & leur remplacement par d'autres cheveux plus fins; dans d'autres on trouve des vers dans leurs ulcères; la perte du sommeil ou des rêves effrayans en tourmentoient quelques-uns pendant que d'autres perdoient leur voix & devenoient effeminés comme des Eunuques.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

9°. Presque tous desiroient de cacher leur mal & tâchoient de nous tromper, en nous donnant de fausses excuses & des prétextes pour couvrir la cause de leur maladie & de leurs ulcères. La plus grande partie prétendoit que les rats avoient mangé leurs orteils & que des brûlures avoient produit leurs ulcères.

10°. Nous étions confirmés dans nos opinions par l'expérience & par le procès-verbal, sur la nature de la maladie, & nous étions assurés que ce n'étoit ni le mal vénérien, ni une maladie vénérienne invétérée, mais que c'étoit-là le caractère de ce que les anciens appeloient la lèpre, l'éléphantiasis, ou qu'ils désignoient par d'autres noms à volonté; de sorte que nous n'hésitions point à prononcer, que ceux qui offroient de pareils symptômes devoient être traités comme lépreux, & sujets aux dispositions que le Roi voudroit bien ordonner pour de pareils malades.

11°. Nous nous assurâmes encore par nos propres observations que la maladie est contagieuse; &

Année 1758.
Vol. LXXIX.

cependant la contagion n'est ni si active ni si vénéneuse que celle de la peste, de la petite vérole, des dartres, de la gale & autres affections cutanées; car si cela étoit ainsi, les colonies américaines seroient entièrement détruites, & les personnes infectées, mêlées comme elles le sont dans chaque habitation, auroient déjà infecté tous les nègres qui arrivent.

12°. Nous croyons que cette contagion ne se contracte que par une longue fréquentation de la personne infectée, ou par l'union des sexes. En outre nous avons souvent observé que même une longue fréquentation & une cohabitation ne suffisent pas toujours pour communiquer la maladie, parce que nous avons vu souvent des femmes cohabiter avec leurs maris & les maris avec leurs femmes pendant que l'un se conserve sain & que l'autre est infecté de la maladie. Nous voyons des familles communiquer & vivre avec des lépreux & n'être jamais infectées, & ainsi, quoique l'expérience & des informations prises auprès des malades prouvent la contagion, nous pensons cependant qu'il doit y avoir une disposition particulière dans certaines personnes pour recevoir l'infection de la lèpre.

13°. Cette maladie est-elle héréditaire? Nous pouvons assurer qu'elle est telle. Nous avons vu des familles entières entièrement infectées, &

presque tous les enfans d'un père & d'une mère lépreux tombent insensiblement dans la même maladie, & cependant dans différentes autres familles nous avons vu sains quelques-uns des enfans, & quelques autres atteints de la maladie; le père étoit mort de la maladie & certaines fois on voyoit que ses enfans en étoient exempts. Ainsi quoique cette maladie soit certainement héréditaire, cependant nous croyons qu'elle est de la même nature à cet égard, que la phthisie, la gravelle, la goutte & d'autres maladies héréditaires, qui sont transmises du père aux enfans, sans cependant que cette transmission n'offre beaucoup d'exceptions.

14°. Nous n'avons pu trouver aucune règle certaine pour déterminer à quel âge la lèpre se déclare, lorsqu'elle a été communiquée par un vice héréditaire; mais nous avons observé à l'égard des femmes & des filles que les symptômes commencent avec les menstrues, & qu'ils continuent légèrement jusqu'à ce que les personnes ont eu un ou deux enfans; alors les symptômes se développent d'une manière très-cruelle; quant aux hommes ou enfans mâles il n'y a point de règle certaine.

15°. Quant à l'explication des causes, des symptômes, & de ce qu'on appelle les moyens les plus convenables de traitement, nous en ferons

Année 1758.
Vol. LXXIX.

l'objet d'une dissertation particulière. Il suffit de remarquer ici que nous n'imaginons pas que l'air, l'eau ou la manière de vivre puissent la produire; car nous avons trouvé également des personnes infectées dans les endroits marécageux, comme dans les lieux les plus salubres; & si les nègres en sont infectés dans la terre ferme où ils boivent des eaux sales des citernes & des étangs, on voit aussi un égal nombre de lépreux dans les lieux où coulent des eaux limpides, des ruisseaux & des rivières; mais on n'en doit pas moins avouer que des lieux & des boillons insalubres peuvent concourir à disposer les personnes à recevoir la maladie.

16°. Nous croyons & nous sommes persuadés que l'origine de cette maladie parmi les nègres, vient de la Guinée, car presque tous les nègres qui viennent de ces contrées nous disent qu'ils attrivent avec ces taches rougeâtres, signes certains qui annoncent les premiers cette maladie.

17°. Quant aux blancs ou aux mulâtres de cette île qui en sont infectés, nous avons été instruits que cette maladie n'étoit connue parmi les blancs que depuis vingt-cinq ou trente ans, & qu'à cette époque ils reçurent de l'île de Saint-Christophe une malheureuse victime de cette maladie; c'étoit un homme qu'on nommoit Clément, & qui avoit abordé dans l'île en 1694. La famille

des Josselins, le protégé, & cette famille, ainsi que celle des Poullins, furent infectées par voie de contagion, comme nous l'a assuré, un vieux Poullin lui-même.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

On croit que les autres qui ont été infectés par contagion, l'ont été par des négresses, surtout au commencement, lorsque la maladie est très-cachée, & qu'on n'est point en défiance; ce qui ajoute un nouveau degré de probabilité à cette opinion c'est que nous avons vu plusieurs enfans mulâtres, nés de négresses, qui étoient infectés & lépreux.

18°. Quelle qu'en soit la cause, la maladie fait des progrès, & dans la visite que nous avons faite nous avons trouvé 256 personnes suspectées, c'est-à-dire 89 blancs, 47 mulâtres libres & 120 nègres. Dans ce nombre nous avons trouvé 22 blancs, 6 mulâtres 97 nègres infectés de lèpre, ce qui fait 125. Le reste des personnes suspectées nous a paru très-sain, sans que nous puissions garantir la suite, surtout à l'égard des enfans nés de parens lépreux, soit que nous les ayons déclarés tels, soit qu'ils soient morts, avant la visite générale, dans un état soupçonné d'infection. *Signé* Peyssonel, Lemoine, Moulon.

ARTICLE XI.

Exemple extraordinaire de l'efficacité du quinquina contre un cas de délire febrile ; par M. Munkley, docteur en médecine & membre de la société royale.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

LE Dimanche 5 Mats je fus appelé pour voir un homme d'environ trente ans, qui avoit été malade, pendant quelques jours, de la fièvre. Je trouvai que sa chaleur étoit bien au-delà de l'état naturel, avec un pouls foible, mais accéléré & d'environ cent battemens par minute. Il resta dans cet état sans aucune altération remarquable pendant les deux jours suivans; & d'après les symptômes de la maladie, j'imaginai qu'elle ne seroit pas promptement terminée. Le troisième jour après ma première visite, je le trouvai beaucoup mieux; sa chaleur s'étoit abattue considérablement & son pouls étoit plus lent de vingt battemens par minute que le jour précédent.

D'après ce changement il y auroit eu lieu de penser que la maladie tendoit vers sa terminaison, si on n'avoit pas fait attention qu'il n'y avoit eu aucune apparence d'évacuation critique par les sueurs, l'urine ou toute autre évacuation qui au-

roit pu faire penser que la maladie étoit jugée. C'est pourquoi on ne fit aucun changement dans la méthode de traitement; mais trouvant le lendemain matin que le malade avoit bien dormi la nuit précédente, & que son pouls continuoit à s'approcher de l'état naturel, puisqu'il ne battoit pas plus de soixante-quatorze fois par minute, on lui permit de se lever le soir pour faire son lit, & je l'aurois cru très-bien, si je n'avois prévu qu'il manqueroit encore d'y voir un travail critique, suivi d'une évacuation du même genre. C'est ce qui me fit juger que la fièvre auroit un retour, & ma conjecture fut vérifiée, car on vint m'avertir de bon matin qu'il n'avoit pu dormir de toute la nuit & qu'il avoit été dans le délire.

Je ne fus pas très-alarmé de ce symptôme, & je pensai qu'il avoit eu un paroxysme fébrile, auquel le quinquina mettroit probablement fin. Quand je le vis le matin, je le trouvai dans un grand délire; mais à mon grand étonnement il étoit presque sans fièvre; son pouls étoit aussi calme qu'il l'avoit été le jour précédent. Il resta dans cet état tout le jour & la nuit suivante, & tout ce qu'on put lui donner pour le soulager resta sans effet; au contraire son délire augmenta tellement, qu'il fut très-difficile au garde-malade de le tenir dans son lit. Le lendemain matin il fut encore comme le jour précédent; son imagination étoit très-dé-

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

rangée ; il rioit , il chantoit & il faisoit des gestes qui lui étoient très-étrangers dans sa conduite ordinaire , & qui , quoique son poulx ne fût pas parfaitement calme , patoissoient plus tenir de la manie que d'un délire.

Dans cette position il n'y avoit qu'une chose qui parût propre à terminer heureusement l'affaire , c'étoit d'attendre , quoique les indications fussent très-obscurcs & l'évènement parfaitement incertain. En rappelant l'époque du commencement du délire , depuis laquelle il s'étoit déjà écoulé trente - six heures , après que le poulx avoit été calme , & apercevant qu'environ un verre d'urine qui avoit été rendue durant la nuit étoit épaisse & paroissoit disposée à former un sédiment , il y avoit lieu de soupçonner & même d'attendre que , quoique le poulx eût été parfaitement calme durant tout le tems du délire , il y avoit quelque chose de fébrile dans sa maladie. D'après ces indications toutes obscurcs qu'elles étoient , il fut jugé convenable d'essayer le quinquina , qui , suivant cela , fut immédiatement administré & répété de deux en deux heures. Cette méthode réussit au-delà de tout espoir , en sorte qu'il fut manifeste même pour les garde-malades , que la raison revenoit de plus en plus au malade à chaque dose de quinquina ; & le soir après en ayant pris six gros , ses urines devinrent épaisses & déposèrent un sédi-

ment briqueté, & , si on en excepte la foiblesse naturelle qui succède à un pareil désordre moral & physique , il se rétablit bientôt. Le quinquina a été répété à des doses convenables , comme c'est l'usage dans les fièvres inintermittentes , & le rétablissement de la santé a été parfait.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Les deux circonstances remarquables de ce cas ; sont que le délire s'est déclaré & a continué sans exacerbation du pouls , & que le quinquina est devenu un remède prompt & efficace , quoique donné à une époque où il n'y avoit aucune apparence de rémission de symptôme qu'il s'agissoit de combattre. On a cru que l'accélération du pouls étoit si essentielle à la définition de la fièvre , que c'en étoit un signe pathognomonique. Mais l'expérience est ici contre cette opinion, & peut-être que le cas ci-dessus est une preuve du contraire. Quoi qu'il en soit , il ne manque point d'exemples dans lesquels , vers la fin de la fièvre , le pouls devient calme , sans qu'aucun autre symptôme diminue , & le malade reste dans un état comateux & avec l'apparence d'un homme qui a pris une grande quantité d'opium. Galien , dans le livre troisième des pronostics du pouls , rappelle ce symptôme & fait voir qu'il est toujours un signe presque fatal , & c'est ce que j'ai vu arriver plusieurs fois. Le cas ci-dessus ne peut-il pas conduire à cette utile recherche , savoir si dans les fièvres de toute

Année 1758.
Vol. LXXIX.

espèce, quand le pouls est calme, le quinquina n'est pas bon à être administré & ne devient pas un remède efficace ? Dans le cas ci-dessus la chose s'est passée absolument ainsi. Pour ce qui me regarde, je déclare que depuis près de dix ans d'expérience dans l'hôpital de Guy, durant lesquels je l'ai administré dans différentes occasions, je n'ai jamais vu d'après l'observation la plus exacte, qu'il ait été jamais nuisible, ou ait produit aucun mauvais symptôme, même dans les cas où il ne produisoit pas les effets attendus ; & ce que je crois digne de remarque, c'est que dans les maladies chroniques dans lesquelles le quinquina a été regardé comme le plus nuisible, lorsqu'une fièvre intermittente venant à se déclarer, le quinquina avoit été jugé nécessaire pour guérir cette maladie secondaire, la maladie primitive avoit cessé comme elle l'auroit fait, si le quinquina n'avoit jamais été administré.

ARTICLE XII.

*Relation d'une maladie extraordinaire de l'œil ;
par M. D. Layard, docteur en médecine &
membre de la société royale.*

Année 1758.
Vol. LXXIX.

LE fils d'un fermier, fort & robuste, en se livrant avec vigueur aux travaux de la campagne,

éprouva une douleur subire dans son œil gauche. La douleur augmenta , l'inflammation vint à la suite & l'œil devint de jour en jour plus gros. La mère de ce pauvre garçon suivit plusieurs conseils qui lui furent donués , sans produire le moindre avantage. Elle s'adressa enfin à M. Hopkins, chirurgien d'Hungtinton qui m'engagea à voir le malade avec lui.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

L'œil étoit entièrement hors de l'orbite & pendant sur la joue jusqu'à la lèvre supérieure. Les tuniques étoient fort décolorées, tous les vaisseaux gonflés & la fonction de la vue entièrement détruite. Les humeurs même de l'œil étoient comme du pus flottant ; nous fûmes convaincus de la nécessité de l'extirpation de cet œil pour sauver l'œil droit qui étoit déjà très-enflamé. Nous appelâmes cependant, avant de faire cette opération, deux autres chirurgiens très-connus ; un de ces derniers en pressant avec son doigt la pupille, fit crever le globe de l'œil au bord de l'iris, & fit évacuer beaucoup de matière purulente. L'extirpation de l'œil fut unanimement convenue & faite immédiatement après.

M. Hopkins fit une piqûre avec une lancette près du canthus externe de l'œil, & alors, avec une paire de ciseaux courbes, il emporta tout le globe distendu de l'œil jusqu'au près des paupières. Il nettoya alors la cavité des humeurs purulentes,

Année 1718.
Vol. LXXIX.

& remplit le tout de charpie, en appliquant par dessus des compresses trempées dans du vin chaud délayé d'eau, & tout l'appareil fut contenu par le bandage appelé *Monoculus*. On pratiqua une saignée au bras; on prescrivit des médicamens nitreux, des anodins & un régime convenable. La fièvre & l'inflammation de l'œil diminuèrent par degrés; la suppuration de la plaie fut d'une bonne qualité dans peu de jours; les paupières qui étoient distendues s'affaissèrent, & le malade étoit en voie d'une guérison prochaine.

Mais le 7 Novembre ayant laissé la porte de la rue ouverte & le tems étant froid & pluvieux, le malade reçut l'impression du vent qui porta la pluie sur son visage. La nuit suivante la plaie fut très-douloureuse, les paupières très-enflées, & le lendemain le tout étoit aussi enflammé que lorsque l'œil étoit contenu dans l'orbite. Il s'ensuivit des excroissances fongueuses & une fièvre intermittente. L'émetique étant peu convenable, on purgea avec la rhubarbe & on donna ensuite le quinquina infusé dans le vin rouge. La fièvre cessa bientôt après; mais ce qui étoit encore contenu dans l'orbite, prit de l'accroissement; il se forma des excroissances fongueuses, & qui égaloient en volume l'œil qui avoit été extirpé. Tous les topiques pour contracter le *fongus* ont été insuffisans; on a évité l'application des caustiques ou escatotiques,

de

de peur qu'il ne s'ensuivît un ulcère carcinomateux. La matière de l'écoulement étoit une sérosité purulente, ce qui a fait prescrire depuis le commencement de Novembre une diète desséchante.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

En Février 1757, les restes des tuniques de l'œil commencèrent à paroître aux parties les plus proéminentes de l'excroissance, & ils paroissoient blancs comme une partie de la conjonctive. En les touchant avec son doigt on y sentoit une fluctuation distincte, & il se manifestoit une véritable hydrophthalmie. Mais ni l'épaisseur des tuniques, ni la sensibilité des parties ne permit point d'y pratiquer la ponction jusqu'à ce que le kyste qui paroissoit formé par la distention d'une des tuniques de l'œil fût plus dégagé des fongosités.

Le kyste continuoît chaque jour de s'étendre & de séparer ses bords fongueux; la fluctuation devint plus manifeste & les membranes plus minces. Enfin le 15^e Juin 1757 M. Hopkins ouvrit le kyste avec la pointe d'une lancette & en tira une grande coupe d'une sérosité limpide, sans odeur ni goût. Ce garçon éprouva très-peu de douleur de cette opération. La cavité fut remplie avec de la charpie, & on appliqua par-dessus des compresses trempées dans du vin chaud délayé. Toute la nuit suivante, & plusieurs jours après, il s'écoula par la plaie une grande quantité de

Année 1758.
Vol. LXXIX.

férosité. Le 19^e le fungus étoit fort diminué; M. Hopkins pansa alors la plaie avec l'onguent de la gomme élemi, & il fit des lotions au fungus, avec un mélange de l'eau de chaux, de l'eau de roses & de teinture de myrthe. Le 23^e en ôtant l'appareil, le kyste parut affaissé & on en fit facilement l'extraction avec le forceps, sans causer de douleur au malade. Le fungus se consuma de jour en jour après cela; la suppuration fut d'une bonne qualité & la guérison eut lieu le 7 Août.

L'œil droit est très-sain & remplit bien ses fonctions depuis l'extirpation du gauche. Le reste des tuniques & des muscles de ce dernier porte sur les paupières, en sorte qu'il paroît seulement que l'œil est fermé. Cependant il a été jugé nécessaire de faire usage d'un bandage pendant tout l'hiver, pour se garantir de l'impression du froid.

Le kyste, après qu'il a été ôté, mesuré dans sa longueur, avoit trois pouces & demi, & contenoit une pleine coupe d'eau. Il paroît avoir été formé par la tunique sclérotique & étoit d'un blanc luisant & d'une texture si délicate, qu'on pouvoit à peine le toucher sans le déchirer. Quand il a été desséché, autant qu'il a été possible, il étoit si fragile que ce fut avec beaucoup de peine que M. Hopkins a pu le conserver.

Remarques.

Année 1768.
Vol. LXXIX

ON rapproche dans le même volume le cas précédent de celui d'une femme qui, dans des accès violens de toux, éprouva les mêmes accidens, dus à une distention de l'humeur aqueuse séparée en grande quantité par des efforts violens qui ont dû relâcher graduellement & grossir les conduits aqueux de l'œil. Il peut se faire que les travaux violens dans le cas ci-dessus aient produit un effet analogue, en augmentant l'impétuosité du sang dans les vaisseaux. Toutefois l'hydrophthalmie qui a succédé à l'opération dont j'ai parlé, l'excroissance fongueuse & l'écoulement fétueux qui a continué plusieurs mois par la plaie, montrent qu'il s'est d'abord écoulé une grande quantité d'humeur aqueuse par la distention ou la dilacération des conduits aqueux, & peut-être par le défaut de contraction de ces vaisseaux & des vaisseaux lymphatiques qui étoient devenus inutiles.

Ces deux cas montrent la nécessité de rechercher particulièrement les causes des maladies des yeux, aussi bien que de celles des autres parties du corps; car en faisant attention aux symptômes cette maladie ne pouvoit être guérie, quoique les accidens fussent calmés. La saignée & les évacuations modérées auroient certainement d'abord diminué la tention & la douleur, ainsi que

Q ij

Année 1758.
Vol. LXXIX.

l'inflammation, mais les topiques & les médicamens internes étoient indiqués, & ont dû être secondés par un régime convenable.

Sans faire ici mention des abus absurdes & impertinens de l'empyrisme, de quel secours auroient été dans ces deux cas les applications onctueuses, laxatives ou émollientes, ou les purgarifs drastiques & mercuriels? Quoique ces moyens aient pour but de faire cesser la tention & l'inflammation, cependant la distention des vaisseaux sanguins augmentoit seulement graduellement à mesure que le globe de l'œil étoit augmenté, de sorte que toute application propre à relâcher les tuniques de l'œil, auroit infailliblement ouvert encore davantage les vaisseaux, & augmenté la douleur & l'inflammation.

La seule méthode à employer dans de pareils cas est de tâcher de diminuer la plethore & de faire usage de topiques qui puissent produire un effet astringent, sans irritation. Si la cause subsiste comme dans un des cas précédens, produit par des efforts de toux, on ne peut point attendre un changement favorable de l'œil pendant que les vaisseaux sanguins sont sans cesse dilatés par les efforts de la toux. Il faudroit donc combattre cette affection par des moyens convenables & tâcher de la dissiper promptement.

Mais si l'œil est devenu si volumineux, qu'il

Soit sorti de l'orbire, il ne paroît point y avoir d'autre méthode de diminuer le volume de l'œil que d'y faire une ponction avec un instrument convenable pour faire évacuer l'humeur aqueuse, & d'appliquer alors des agglutinatifs & des collyres astringens qui puissent réduire les tuniques distendues & les vaisseaux à leur volume priinirif. Cette méthode doit être pratiquée avant que les humeurs soient viciées, la vue détruite, les vaisseaux dans un état de suppuration & les tuniques trop distendues, car alors il n'y a rien que l'extirpation qui soit indiquée.

M. Nuck dans son ouvrage : *Traclatus de duclibus oculorum aquosis*, pag. 120, rapporte le succès qu'il a eu en pratiquant sur un jeune homme cinq ponctions répétées & une juste application de tous les principes de l'hygiène.

A R T I C L E X I I I.

Observations sur les affections spasmodiques occasionnées par des vers; par M. Wall, docteur en médecine.

ON a déjà rapporté l'exemple (art. VI.) d'un jeune homme attaqué par de violentes convulsions & guéri par une potion huileuse. Cette histoire mérite quelques réflexions.

Qij

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Les symptômes ont été évidemment produits dans ce cas par la présence des vers dans les intestins; c'est de cette source que sont provenues les affections les plus inexplicables & les plus propres à éluder les remèdes les plus efficaces, jusqu'à ce qu'enfin ces vers ayent été expulsés par une huile destinée à la peinture, prise en grande quantité, par un accident particulier; & la cause ayant été ainsi enlevée, les effets ont cessé.

Il paroît d'abord étonnant qu'une énorme quantité de plomb blanc prise à l'intérieur ne soit pas devenue funeste; & si elle ne l'a pas été on ne peut l'attribuer qu'à l'huile qui servoit à l'envelopper & à empêcher son contact & son action immédiate sur les tuniques des intestins. Mais non-seulement l'huile obvie aux dangereux effets de ce mélange, mais il me paroît au moins qu'elle a été la cause du succès qui en a été la suite. Je parle de cela avec quelque restriction, parce que le plomb, en ce que sa stipcité étoit ainsi mise à couvert, doit avoir par son poids secondé l'expulsion des ordures vermineuses, surtout le trajet des intestins étant devenu plus glissant par l'huile.

On a observé depuis longtems que l'huile est nuisible aux insectes de toute sorte, non-seulement à ceux qui survivent après qu'on les a coupés par morceaux, mais encore à ceux qui vivent

longtems avec peu d'air. Ceux même que la chaleur revivifie après une submersion dans l'eau, périssent irrévocablement si on les submerge dans l'huile, ou si on les en recouvre. Rhedi & Malpighi ont fait plusieurs expériences sur cet objet, & c'est sans doute parce que l'huile bouche tous les vaisseaux aériens, qui dans ces animalcules sont très-nombreux & distribués dans presque toute l'habitude de leurs corps.

C'est dans ces vues que l'huile a été recommandée comme vermifuge par Andry & Hoffman, quoique je pense qu'elle a été rarement employée dans la pratique suivant ces vues, ou que du moins elle n'a point été donnée à une dose suffisante pour remplir cet objet. A la vérité Hoffmann (1) lui-même ne paroît pas lui accorder

Année 1758.
Vol. LXXIX.

(1) *Oleosus magna tribuitur efficacia, qua maximè experimento Fr. Rhedi videtur confirmata, dum muscas & alia insecta variis liquoribus immersa in vivis permansisse refert, exceptis aliis oleo perundis & insusis qua invicem mortua vitam non receperunt, licet radiis solaribus fuerint exposita. Equidem libenter concedo hac omnia veritati esse consona, atque etiam oleosa ut oleum olivarum, raparum & amygdalarum dulcium non sine fructu adhiberi; sed scire licet minimè illa eo unquam scopo posse offerri ut vermes enecent, quia admodum magna oleorum copia requireretur si immediatè vermes per totum intestinorum volumen dispersos deberent extinguere. Multò magis oleosa*

Qiv

Année 1798.
Vol. LXXIX.

une grande confiance comme vermifuge, & il le recommande seulement comme servant à lubrifier les intestins & à relâcher leur spasme; il croit donc qu'il faut le donner avant de tenter les purgatifs âcres.

Les médicamens qu'on donne le plus ordinairement & sur lesquels on compte le plus sont ou d'une nature drastique & virulente, ou bien on les suppose propres à détruire ces animaux par quelques propriétés mécaniques, comme de couper, de déchirer ou d'affecter de route autre manière leurs corps rendres & délicats, sans avoir cependant assez de force pour déchirer ou porrer atteinte à l'estomac & aux intestins. Du premier genre sont les feuilles & le suc d'helleboraster (pied de griffon), la coloquinte, la résine de jalap, le verre d'anrimoine & autres substances sem-

in gravibus à lumbricis symptomatibus ideo censerem utilia, quia sensibiles intestinorum tunicas spasmō contriātas relaxant, & mucilagine quasi obliniunt atque defendunt, ut postea acriora quadam & purgantia remedia magis securè & sine læsione exhiberi possint. Ita ego sapius mirabili cum effectu ad vermes enecandos & symptomata lenienda oleum amygd. dul. ad aliquot cochlearia, imò una uncia vel duas circa læti introitum vel summo mane pueris prescripsi sumendum, subjungendo aliquot horas post, pillulas ex extracto panchimagogo resina, jalappæ & mercurio dulci paratas. HOFMAN.

blables dont les effets sont communément violens & dangereux, & quelquefois funestes. De la dernière classe sont le mercure crud & les préparations douces de ce minéral, comme l'aloës & autres amers, la limure d'étain, les sels neutres & l'acide vitriolique. Tous ceux qui pratiquent savent combien souvent ces médicamens sont inefficaces. Ayant donc attentivement considéré le cas de pratique qui a donné lieu à mes réflexions, je me suis déterminé à essayer l'efficacité de l'huile dans des cas pareils, parce qu'elle me paroît plus propre à produire de grands effets, & qu'elle ne peut être suivie d'aucun risque ni danger.

La première personne à laquelle je l'ai donnée étoit un malade de notre infirmerie qu'on jugeoit attaqué de vers, & qui avoit pris sans succès pendant longtems une grande quantité de médicamens. Dans une consultation avec d'autres médecins j'ai prescrit la formule suivante :

℞ Huile d'olives, demi livre.

Esprit volatil aromatique, trois gros.

On mêle le tout ensemble & on en fait prendre trois cuillerées le matin & autant le soir.

On y ajoute l'esprit volatil pour rendre l'huile savonneuse, & afin que par ce moyen elle soit plus facilement miscible avec les suc de l'estomac & des premières voies. Ce remède a rempli mon

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Année 1748.
Vol. LXXIX.

attente & dans peu de jours a expulsé plusieurs vers.

Un pauvre garçon âgé de treize ans éprouvoit depuis trois ou quatre ans des accès convulsifs qui l'avoient privé graduellement de ses sens & l'avoient conduit à une sorte d'idiotisme. Il avoit pris divers vermifuges & purgatifs, surtout de la poudre cornachine, mais il n'avoit jamais évacué des vers, quoique rous les symptômes indiquassent leur présence dans les premières voies. Comme il avaloit sans distinction tout ce qu'on lui offroit, je lui ordonnai d'abord un mélange de sept onces d'huile de lin & d'une once de teinture sacrée, dont il prit quatre grandes cuillerées soir & matin. Il persista dans l'usage de ce remède pendant toute la semaine sans avoir des envies de vomir, & vers la fin de la même semaine il évacua un ver rond, d'une grande longueur. Il commença alors à montrer une grande aversion contre ce médicament, ce qui fit suspendre la la teinture sacrée & on lui prescrivit de prendre l'huile seule en une égale quantité. Il continua ainsi plus de quinze jours, durant lesquels il évacua soixante vers de plus, & recouvrit en grande partie l'usage de sa raison; mais j'ai appris ensuite que les parens de ce garçon étoient extrêmement négligens, que les remèdes avoient été suspendus & que la maladie s'étoit renouvelée.

Peu après j'ai prescrit le même remède à Elisabeth Abell, pauvre fille du voisinage, réduite par des accès d'épilepsie à un tel état d'idiotisme, qu'elle mangeoit ses propres excréments; je lui ai fait évacuer plusieurs vers, mais elle n'a pas repris l'usage de ses sens. Depuis ce tems-là j'ai donné l'huile à plusieurs personnes avec succès, & par conséquent je ne puis que recommander son usage, puisque c'est d'ailleurs un remède dont on peut user à toute dose avec sûreté.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Il est probable que certaines huiles sont plus propres à détruire les vers que d'autres. Andry (*Traité de la Génération des vers chap. 8*), préfère l'huile de noix, & il rapporte qu'un ver humain rendu vivant étant mis dans cette huile meurt à l'instant, pendant qu'un autre ver évacué en même tems avoit vécu plusieurs heures dans l'huile douce d'amandes, quoique dans un état de langueur. Il tâche de rendre raison de cette différence en supposant que l'huile d'amandes douces est plus poreuse & par conséquent moins propre à empêcher l'entrée de l'air dans les vers, & à la vérité il y a lieu de penser que les huiles siccatives, comme celles de la noix & du lin, sont d'un tissu plus serré, moins miscibles avec l'eau & par conséquent plus anthelmintiques que les huiles qui se congèlent par le froid, & qui ne se dessèchent point en plein air, telles que celles

Année 1758.
Vol. LXXIX.

d'amandes & d'olives. Andry nous dit qu'à Milan les mères ont la coutume de donner à leurs enfans une ou deux fois la semaine des rôties trempées dans l'huile d'olives avec un peu de vin pour tuer les vers, & j'ai connu une dame de la campagne qui donne aux pauvres enfans de son voisinage la même huile avec un grand succès.

Je recommanderois ce remède à aussi grande dose que l'estomac peut le supporter. Dans cette vue il conviendrait d'y joindre des aromatiques, des amers ou des huiles essentielles, suivant l'exigence des cas. Andry ordonne de prendre l'huile à jeun, sous prétexte que l'estomac étant alors vide, elle embrasse plus facilement & étouffe les vers. Durant ce traitement il est nécessaire de donner à des intervalles convenables de la rhubarbe, des mercuriaux & des aloëtiques.

Je ne saurois terminer ces réflexions sans remarquer que, d'après l'histoire du jeune homme de Norfolk, nous apprenons que dans des cas semblables où les fonctions de la tête ne sont point idiopathiques, il ne faut jamais désespérer de la cure, quelque longue qu'ait été la maladie. Car dans ce jeune homme, quoique l'oppression dans le cerveau & dans les nerfs ait continué plusieurs années, & ait été assez violente pour le priver non-seulement de ses facultés intellectuelles, mais encore de presque toutes ses

sensations, cependant les organes n'étoient point altérés, & ils ont repris leurs fonctions aussi-tôt que l'irritation & les spasmes des intestins qui causoient ces terribles symptômes ont été dissipés. La même chose a été remarquée dans un jeune homme dont on a parlé ci-dessus. Nous avons aussi deux exemples remarquables de la même espèce dans l'infirmerie de Worcester où un garçon & sa sœur ont été parfaitement guéris, & ont recouvert l'usage de leurs sens après être restés dans un état d'idiotisme pendant deux années, par des accès d'épilepsie causés par des vers.

Il est utile de joindre encore ici un fait analogue.

Une jeune fille de la ville de Letbury âgée de neuf ans, avoit été tourmentée d'une douleur poignante dans la région de l'estomac. Cette douleur étant devenue de plus en plus violente, je fus appelé pour lui donner des secours. Un quart d'heure avant mon arrivée elle fut attaquée d'un vomissement violent qui lui fit rendre un nombre étonnant de petits insectes vivans, avec une grande quantité d'un phlegme visqueux. Ces animaux ressembloient exactement au millepieds, excepté que quelques-uns, examinés au microscope, paroissent avoir un petit filament qui naissoit du milieu de leur ventre, & qui probablement avoit servi à les fixer à leur nid. Ils

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

avoient différens volumes depuis le plus gros millepieds jusqu'au plus imperceptible, de sorte qu'ils paroissent avoir été engendrés en divers tems, & avoir pris de l'accroissement dans l'estomac. Comme cet enfant avoit été subitement attaqué de cet effort de vomissement, il avoit évacué son estomac sur le carreau de la chambre où il étoit assis. Ces millepieds, à ce qu'on me dit, étoient d'abord vivans & se mouvoient rapidement en divers sens; mais ils ne vécutent pas long-tems en plein air. Ils étoient encore dans les matières gluantes qui avoient été rendues quand j'arrivai, de sorte qu'il n'étoit pas possible qu'on m'en imposât. Après cette évacuation, l'estomac de l'enfant se trouva parfaitement soulagé, & sa santé s'est soutenue.

ARTICLE XIV.

Observations sur l'origine & l'usage des vaisseaux lymphatiques des animaux; extraites des leçons de Gullston; par M. Akenfide, docteur en médecine & membre de la société royale.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

IL semble, par une multitude d'expériences, que les vaisseaux lymphatiques communiquent avec les vaisseaux sanguins. On peut les distendre

en y soufflant de l'air, ou en injectant de l'eau ou du mercure dans un artère, & la lymphe qu'ils charient est souvent dans un état morbifique, & se trouve mêlée à des globules rouges ou au *crassamentum* du sang. C'est sur ce fondement qu'on a élevé différentes théories sur la connexion des vaisseaux lymphatiques avec les artères.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Parmi ces théories je dois m'arrêter sur celle du fameux Boerrhaave. Il avoit observé que chaque artère du corps étoit plus grande en diamètre qu'aucune de ses branches ; & cette observation étant vraie autant que nos yeux, aidés même du microscope, peuvent nous en instruire, il en concluoit par analogie que la même chose avoir lieu dans les subdivisions extrêmes du système artériel. Mais, disoit-il, c'est en proportion du diamètre du canal que se trouve le volume des particules qui s'y meuvent & y circulent. Par conséquent si une artère capillaire extrême, qui admet seulement le passage d'un globe rouge à la fois, envoie des branches latérales, ces branches seront seulement capables de recevoir des particules d'un moindre volume qu'un globule rouge. Mais les particules qui sont en volume au-dessous des globules rouges, sont une sérosité jaunâtre, & le vaisseau latéral qui les reçoit, est une artère sereuse & le tronc d'un second ordre de vaisseaux. De la même manière ce tronc étoit continué & subdivisé en

Année 1758.
Vol. LXXIX.

branches moindres, doit enfin devenir si petit ; qu'il admet seulement un globule séreux. Ses branches latérales recevront encore des particules plus petites que celles qui constituent la sérosité jaunâtre ; c'est-à-dire qu'elles n'ouvriront un passage qu'aux particules de la lymphe. Ces branches latérales feront donc seulement des artères lymphatiques & le tronc d'un troisième ordre de vaisseaux. C'est ainsi que dans les artères rouges sont contenus tous les fluides du corps qui circulent ; dans les artères séreuses toutes les parties, excepté les globules rouges ; & dans les lymphatiques , toutes les parties, excepté les globules rouges & la sérosité ; & cette subordination assujettie à la même loi , se continue pour les fluides plus subtils que la lymphe jusqu'au plus petit vaisseau qui est une propagation extrême de l'aorte. Telle étoit la doctrine de Boerhaave concernant le système vasculaire des corps morts , ainsi que plusieurs autres notions ingénieuses, plausibles & recommandables par elles-mêmes à la première vue , par une apparence d'une exactitude géométrique & mécanique , mais fondées sur un trop petit nombre de données & nullement d'accord avec les phénomènes de l'économie animale.

Car en premier lieu, en admettant cette hypothèse , il est certain que la forme conique & convergente de l'aorte, & le changement de direction
dans

dans ses branches, doit, dans les vaisseaux sanguins éloignés, occasionner une grande résistance au mouvement du sang, & une grande diminution de sa vitesse. Supposons que cette résistance dans une artère capillaire rouge, est à la résistance dans le tronc de l'aorte, comme le plus grand nombre à l'unité, la résistance alors dans une artère capillaire séreuse, sera à celle de l'aorte comme le carré de ce nombre à l'unité; dans l'artère lymphatique, comme le cube, & ainsi dans une progression de puissances; de sorte que la vitesse des fluides dans l'ordre le plus éloigné des vaisseaux, seroit physiquement nulle. Mais nous savons au contraire que dans des series très-éloignées de vaisseaux, les fluides contenus se meuvent avec une vitesse considérable sur tous les vaisseaux de la transpiration insensible; & dans les injections anatomiques, la liqueur injectée dans une artère retourne plus aisément & plus promptement par la veine correspondante, que par les conduits excrétoires les plus subtils. Toutefois il y a un nombre infini d'observations de cas morbifiques, dans lesquels le sang rouge lui-même a été évacué à travers les series les plus éloignées de vaisseaux, purement par une obstruction passagère dans une partie ou un relâchement contre nature dans une autre, & sans aucun détriment pour la structure & la subordination des vaisseaux qui cependant, d'après cette

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

hypothèse auroient été entièrement détruites avant qu'une pareille irrégularité pût avoir lieu.

L'autre théorie, concernant l'origine des vaisseaux lymphatiques, a été soutenue par quelques physiologistes distingués, postérieurement à Boerhaave. Elle suppose que ces vaisseaux reçoivent la lymphe des vaisseaux sanguins ou des excrétoites de plus grandes glandes, par l'intermède d'un petit vaisseau que ces auteurs appellent artère lymphatique, qui est invisible dans son état naturel, & qui n'a été rendu sensible que par l'expérience. Mais on peut répondre que les vaisseaux lymphatiques sont tracés dans différentes parties du corps & qu'ils s'y perdent, & que par conséquent il est très-probable qu'ils ont là leur origine, puisqu'on ne trouve point dans le voisinage ni grosse glande ni vaisseau sanguin, qu'il est contradictoire à toute analogie dans la marche de la nature, que de supposer le mouvement d'un fluide animal plus manifeste dans les veines que dans les artères, & qu'enfin c'est faute de s'entendre & c'est s'en laisser imposer par les mots, que d'appeler veines les vaisseaux lymphatiques, parce qu'ils sont fournis de valvules, & de garantir alors, parce qu'on les appelle veines, qu'ils ne sont qu'une continuation des artères.

En s'engageant dans des recherches aussi subtiles & dont les objets échappent à nos sens, la

seule méthode que nous devons suivre, est de tirer des conclusions de ce que nous connoissons sur les objets de la même nature; & notre conclusion ainsi déduite sera plus ferme & moins sujette à être contredite à mesure que nous nous rapprocherons davantage du sujet connu. Mais si les sujets sont de la même espèce, si on ne peut point y trouver de la différence sous aucun point de vue entr'eux & ceux qui sont l'objet de nos recherches, dans ces cas nos conclusions, tirées de l'analogie, deviennent une certitude physique. Je crois que cela est ainsi, relativement au problème en question, sur l'origine des vaisseaux lymphatiques. Quoiqu'en général nous ne puissions pas, par des expériences, arriver aux extrémités de ces canaux, ni reconnoître par l'inspection de quelle manière ils recoivent leurs fluides; cependant dans un grand nombre de cas nous pouvons faire l'un & l'autre.

Il y a une certaine partie du corps humain qui est abondamment pourvue de vaisseaux lymphatiques, par lesquels nous pouvons injecter des liqueurs dans la cavité où leurs extrémités s'ouvrent, & de cette cavité d'un autre côté nous pouvons introduire une liqueur colorée dans leurs extrémités & tracer leur continuation depuis les plus petits cartaux jusqu'à ceux qui sont les plus amples. Nous savons aussi que dans cette cavité il s'exhale

R ij

Année 1752.
Vol. LXXIX.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

continuellement un nombre infini de vaisseaux aqueux & muqueux, soit tuyaux artériels, soit conduits excrétoires, qu'ils l'humectent d'une exhalaison continuelle que les extrémités de ces vaisseaux lymphatiques sont occupés à pomper sans cesse. Ne paroît-il pas étrange que pendant que ces faits sont connus de tout le monde, de grands auteurs de physiologie & d'anatomie, n'aient jamais fondé sur eux leurs raisonnemens, mais qu'ils se soient égarés dans des suppositions obscures & complexes pour expliquer un procédé de la nature qu'ils pouvoient examiner avec leurs propres yeux.

Mais peut-être qu'on peut rendre raison de cette inadvertance en se rappelant que lorsque ces vaisseaux & la structure de cette partie étoient découvertes, la lymphe & tout ce qui s'y rapporte étoient pleinement inconnus, & que les vaisseaux en question étoient regardés comme destinés à remplir d'autres usages plus remarquables; c'est sans doute ce qui a égaré les auteurs sur les vraies fonctions des vaisseaux lymphatiques.

Quoi qu'il en soit il est certain que les vaisseaux lymphatiques du mésentère-appelés communément vaisseaux lactés, ne diffèrent point par aucune particularité de ceux des autres parties, à cela près qu'ils sont chargés de transmettre le chile au lieu de la lymphe, ou plutôt de transmettre dans des périodes déterminés (c'est-à-dire deux

ou trois heures après que l'animal a pris de la nourriture) une lympe mêlée d'une émulsion de substances végétales ou animales, colorée en blanc par ce mélange. Dans d'autres tems ils ne contiennent que de la lympe & ils sont à tous égards de vrais vaisseaux lymphatiques, & on ne doit pas les distinguer de ceux qui sont disséminés dans toute autre partie du corps. Leur structure est la même; la membrane dont ils sont formés, leurs valvules, la lympe qu'ils contiennent, les glandes à travers lesquelles ils passent, leur direction des plus petits vaisseaux dans des plus grands & de ceux-ci dans le sang ne diffèrent en rien de ce qu'on observe dans les autres vaisseaux lymphatiques. Leur lympe est en même tems sans doute fournie de la cavité des intestins, mais l'humidité aqueuse qu'ils exhalent continuellement pour opérer la digestion & pour conserver le conduit alimentaire, est continuellement absorbée par les racines ou les extrémités de ces vaisseaux pour revenir par un mouvement rétrograde au sang, après avoir rempli sa destination relativement aux intestins.

Qu'il me soit aussi permis d'observer que dans d'autres endroits du corps ces vaisseaux, quand on suit leur trajet, vont se perdre dans les parties musculaires tendineuses ou membraneuses, & je pense qu'on en doit conclure que les vaisseaux

Rij

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Année 1755.
Vol. LXXIX.

lymphatiques du corps ont en général leur origine dans leurs petites cavités de la substance cellulaire des muscles parmi les follicules muqueuses des tendons, des réservoirs membraneux & des conduits des plus grandes glandes, que leurs racines ou extrémités, en aboutissant à ces cavités, se pénètrent de l'humidité qui s'exhale des tuyaux artériels extrêmes, comme les vaisseaux lactés ou lymphatiques du mésentère le font de la surface concave des intestins, & que ces petits vaisseaux absorbans, en s'ouvrant graduellement les uns dans les autres, forment enfin un tronc lymphatique muni de valvules pour prévenir le retour de leurs fluides, & tendent uniformément des extrémités & des viscères pour rapporter au sang cette lymphe ou ce courant délié avec lequel ils se conservent dans une humidité perpétuelle, circonstance indispensablement nécessaire pour la vie & le mouvement, pendant qu'en même tems la réabsorption continuelle de cette humidité par les vaisseaux lymphatiques n'est pas moins nécessaire pour conserver le sang dans une fluidité convenable, & pour empêcher la putréfaction qui seroit inévitable, si on laissoit cette vapeur animale trop longtems stagnante dans les cavités où elle est contenue.

Note du rédacteur. La découverte des vaisseaux

lymphatiques, & les progrès qu'on a faits dans les connoissances qui y sont relatives, forment une des époques les plus remarquables, non-seulement de l'anatomie, mais encore de l'utilité de leurs applications à l'art de guérir, soit pour mieux connoître les phénomènes de certaines maladies, soit pour perfectionner leur traitement, & on ne doit pas craindre d'avancer que ces recherches ont eu une influence bien plus heureuse sur la médecine que la découverte de la circulation du sang qui n'a guères fait que surcharger l'art de guérir de rhéories frivoles & d'explications vaines. Lorsque l'article ci-dessus sur les vaisseaux lymphatiques a été écrit, on étoit encore bien loin d'avoir des connoissances aussi exactes & aussi étendues sur ces objets que celles qu'on a postérieurement acquises & qui sont dues aux travaux d'*Hunter*, *Monro*, *Hewsson*, *Sheldon*, *Cruikshank* & *Mascagni*. L'ouvrage de M. Cruikshank (1) rappelle sur tout les progrès que l'anatomie a faits dans ce genre en Angleterre. Presque tous ceux qui ont cultivé cette branche des connois-

Année 1758.
Vol. LXXIX.

(1) Anatomie des vaisseaux absorbans du corps humain, par M. Cruikshank, ouvrage orné de planches gravées en taille douce & traduit de l'Anglois, par M. Petit-Radel, docteur régent de la faculté de médecine de Paris. 1787, à Paris.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

sances anatomiques se sont formés à Londres, ou du moins ont profité des lumières qui leur ont été communiquées par des disciples des anatomistes Anglois, sans en excepter M. Mascagni (1) qui n'a écrit que longtems après que les descriptions des vaisseaux lymphatiques faites en Angleterre s'étoient répandues dans différentes parties de l'Europe, & qui n'a fait que joindre quelques recherches sur des points particuliers à la doctrine générale.

M. Mascagni a entièrement mis hors de doute que le système lymphatique est tout à fait séparé du système sanguin, & que la circulation de la lymphe est indépendante de la force du cœur. Cela résulte en effet de l'inspection oculaire, puisque M. Mascagni a fait paroître par l'injection la communication de toutes les artères avec les veines, & qu'il a pu faire voir & faire dessiner les cellules qui servent pour ainsi dire de séparation entre les pores inorganiques des vaisseaux sanguins & les embouchures des vaisseaux lymphatiques. Ces derniers prennent naissance en général du tissu cellulaire. Dans les viscères, ils partent aussi du tissu cellulaire. M. Mascagni a vu

(1) *Corporis humani historia & ichnographia, auctore Paulo Mascagni, in regio senarum lyceo publico anatomies professore.* Senis. Vol. in-fol.

dans plusieurs viscères l'injection passer des artères dans les veines, couler par les pores inorganiques dans les cellules & être pompée visiblement par les vaisseaux lymphatiques qui y répondent. Il est inutile d'en dire davantage pour prouver que le système lymphatique est tout-à-fait séparé du système sanguin.

C'étoit un problème à résoudre que de savoir s'il y a, ou non, des vaisseaux lymphatiques qui se déchargent dans le canal thorachique ou dans les veines sans passer auparavant par quelque glande. Blasius & Nuck disent en avoir injecté dans les animaux qui ne traversoient aucune glande. M. Hewson dit avoir fait la même chose dans les cadavres humains. Mais M. Mascagni ayant répété nombre de fois cette expérience, n'a jamais vu aucun vaisseau lymphatique parvenir au canal thorachique ou dans les veines, sans avoir passé auparavant par quelque glande.

Les vaisseaux lymphatiques s'avancent des parties où ils prennent origine, se réunissent en troncs plus considérables, après se redivisent, se réunissent encore, entrent dans les glandes, ils en sortent, ils forment des plexus, qui quelquefois embrassent les glandes, & la lymphe circule par ces canaux entortillés avant d'entrer dans le conduit thorachique. Les vaisseaux lymphatiques sont composés de deux tuniques. Dans l'in-

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

terne on observe des cellules remplies d'une matière oléuse. L'interne se replie par intervalles & forme des valvules lymphatiques si connues. Mascagni remarque que tous les vaisseaux lymphatiques des hommes & des animaux en sont pourvus plus ou moins, malgré l'assertion de plusieurs auteurs célèbres qui ont soutenu le contraire. Quant aux glandes conglobées, elles sont composées, suivant Mascagni, de cavités cellulaires & de vaisseaux lymphatiques. On pourroit les considérer comme des pelotons de vaisseaux lymphatiques qui aboutissent à des cellules. Les vaisseaux sanguins s'introduisent cependant en abondance dans ces glandes, sans avoir pourtant aucune communication directe, ou par anastomose avec le système lymphatique.

Je ne rapporterai point ici d'autres mémoires de M. Hewson insérés dans les Transactions Philosophiques, & qui ont pour objet le système des vaisseaux lymphatiques, puisque ces connoissances ont été perfectionnées dans deux ouvrages plus récents que j'ai déjà cités & que tout le monde peut consulter; mais je dois faire sentir par quelque exemple combien les découvertes qu'on a faites dans le système des vaisseaux lymphatiques peut trouver une application utile en médecine.

Il paroît que les Anglois employent souvent le mercure à titre de résolutif & dans bien d'autres

cas que dans les maladies vénériennes. Quoique leurs essais puissent sembler dirigés à cet égard par un pur empirisme, on ne peut cependant disconvenir qu'ils ne soient souvent fondés sur les connoissances modernes qu'on a acquises du système des vaisseaux lymphatiques & sur la propriété bien reconnue qu'a le mercure de remédier au cours irrégulier & aux stases de la lymphe. Je puis joindre ici un cas dont j'ai été témoin à Paris.

Année 1788.
Vol. LXXIX.

Un jeune homme éprouva, pendant l'hiver de 1788 à 1789, une tumeur lymphatique qui s'étoit formée au jarret, & qui par sa proximité avec le trajet de l'artère poplitée, avoit donné d'abord de vives inquiétudes au malade, dans la crainte que cette tumeur ne fût un anévrisme. Il consulta divers chirurgiens qui ne donnèrent que des réponses vagues & se contentèrent de prescrire un régime sévère en attendant que la nature de la tumeur fût plus décidée. Un autre chirurgien prescrivit des bains avec des topiques émolliens, ce qui ne fit qu'augmenter la tumeur, qui cependant paroissoit d'autant plus d'une nature lymphatique que la partie antérieure du genou paroissoit affectée d'un engorgement semblable. Enfin une personne qui avoit vu souvent en Angleterre ces gonflemens œdémateux du genou qu'on nomme *withe swellings*, prescrivit au malade

Année 1748.
Vol. LXXIX.

des frictions mercurielles, en commençant près du pied & en s'élevant graduellement suivant le trajet des vaisseaux lymphatiques; dès la quatrième friction la tumeur avoit presque entièrement disparu en y tenant appliqué d'ailleurs un emplâtre de *vigo cum mercurio*, & dans peu de jours elle finit par disparaître pendant que les bains l'avoient portée jusqu'au volume d'un gros œuf de poule.

Ce fait paroîtra peu étonnant aux personnes qui ont fait une étude particulière du système lymphatique & qui savent de quelle manière les vaisseaux nombreux de ce genre qui s'élèvent du pied, qui rampent à la partie antérieure de la jambe, & qui après avoir formé des anastomoses multipliées, passent au-dessous de la partie interne du jarret pour se rendre aux glandes de l'aîne. Le mercure a rétabli dans le cas présent le cours de la lympe & a dissipé la tumeur causée par la stase & l'engorgement de ce fluide



SECONDE PARTIE.
CHIRURGIE.

SECTION PREMIÈRE.

Lythotomie.

ARTICLE PREMIER.

*Deux questions chirurgicales avec la réponse de
M. Douglas, chirurgien & membre de la société
royale.*

QUESTION PREMIÈRE.

NE feroit-il pas possible par quelque moyen de
soulager les personnes (qui, à raison de leur grand
âge ou d'une habitude de corps viciée, ne peuvent
point se soumettre à l'opération dangereuse de la
taille avec espoir du succès) en pratiquant une fistule
artificielle dans le perinée.

L'expérience de chaque jour montre qu'il se

Année 1727.
Vol. XXXV.

Année 1727.
Vol. XXXV.

présente un grand nombre de malades jeunes ou vieux qui, affligés du calcul de la vessie, ne peuvent se soumettre avec espoir de succès à l'opération de la taille. Il est inhumain de la pratiquer alors, & c'est une grande imperfection de l'art de guérir, que de n'offrir aucun soulagement à ces malades. N'y a-t-il point un milieu entre une vie remplie de tourmens & la ressource d'une opération désespérée? Il y en a sans doute un. *Thomas Fienus*, il y a environ 125 ans, avoit proposé une cure palliative pour les malades qui n'étoient point susceptibles d'une cure radicale; c'est une opération qu'on peut pratiquer sur les personnes les plus âgées avec toute sûreté, la plaie étant petite & les parties coupées étant de peu d'importance pour la vie. Cette opération par laquelle on peut prévenir ou soulager les effets les plus déplorables de la pierre, c'est-à-dire la suppression de l'urine & les douleurs déchirantes qu'on éprouve en la rendant, ou après l'avoir rendue, n'a point été autant perfectionnée par les lythoromistes que par l'excellent traité de M. Rosset, avant que j'aie introduit la section hypogastrique. Quoique j'admire ce que propose Fienus en recommandant de pratiquer une fistule, cependant je n'approuve point sa manière de procéder dans cette opération.

Voici comment on doit la faire. Il faut placer le malade comme dans l'opération de Marianns,

introduire une sonde dans la vessie , couper la peau & la graisse jusqu'à ce qu'on ait laissé à découvert la partie de l'urètre qui s'étend depuis la glande prostate jusqu'à la partie caverneuse de l'urètre , y faire une petite incision avec la pointe d'un bistouri , retirer alors la sonde & passer une petite canule flexible dans la plaie de l'urètre , panser alors la plaie *secundum artem* , retirer la canule , la nettoyer & l'introduire de nouveau après chaque pansement , en sorte qu'on puisse laisser une fistule à la place de la plaie.

Année 1717.
Vol. XXXV.

C'est à travers cette fistule que le malade lui-même ou toute autre personne peut aisément introduire une sonde huilée & pousser le calcul en arrière , toutes les fois qu'il éprouve lui-même une suppression d'urine , ou lorsque le calcul presse trop fortement contre le sphincter , dans les efforts pour uriner , ce qui ne pourroit être autrement pratiqué sans le secours d'un chirurgien & sans employer la sonde , dont l'usage est toujours douloureux & quelquefois plein de danger. Par le moyen de cette fistule on peut très-aisément injecter toute liqueur qu'on peut juger convenable pour prévenir ou pour soulager l'inflammation de la vessie , ou la nettoyer des graviers ou des autres saletés qui peuvent s'y rassembler & augmenter le volume de la pierre.

Les femmes obtiennent tous ces avantages de

Année 1727.
Vol XXXV.

la direction droite & du peu d'étendue de l'urètre ; ce qui les fait dix fois moins souffrir que les hommes , & ce qui est une preuve évidente que lorsque le passage dans la vessie des hommes est ainsi direct & presque aussi court qu'on l'obtient par la fistule ci-dessus, ils peuvent en recueillir les mêmes avantages.

Une fistule artificielle dans le périnée, doit être par conséquent pratiquée à l'égard de tous ceux qui, à raison de leur grand âge ou d'une habitude de corps viciée, ne peuvent se soumettre sans danger à la grande opération de la lythotomie.

S E C O N D E Q U E S T I O N .

Ne seroit-il pas possible de dilater la fistule artificielle du périnée dans les hommes & l'urètre dans les femmes, avec une éponge ou des bourdonnets de gentiane, augmentés graduellement pendant quelque tems, de manière à pouvoir introduire aisément un forceps dans la vessie pour en extraire la pierre, ou quand elle est trop grosse & irrégulière, de manière à la pouvoir briser & en extraire par degrés les fragmens en différens tems, quand on ne peut les tirer à la fois sans trop fatiguer le malade.

Pour prouver que les deux conduits ci-dessus peuvent être assez dilatés par les moyens proposés, surtout

surtout si les parties sont fréquemment relâchées par un demi-bain ou par des injections d'huile chaude dans la fistule, toutes les fois qu'on change la tente, je me bornerai à trois réflexions, l'une prise de l'expérience dans des cas analogues, l'autre, des opérations de la nature sur ces mêmes parties, & la troisième se prendra des exemples de l'opération de la lythotomie faite après avoir employé la méthode proposée.

Année 1757.
Vol. XXXV.

1°. L'expérience ordinaire montre à quelle grande dilatation une fistule dans toutes les parties du corps peut être amenée par des morceaux d'éponge ou des tentes de gentiane, quoiqu'elle soit d'abord très-petite.

2°. La nature d'elle-même, sans le secours de l'art, a souvent formé cette opération dans les deux sexes, dans les hommes à qui on a fait l'opération de la lythotomie, suivant l'ancienne méthode, & à qui il a resté une fistule au perinée. On a souvent remarqué que quelque tems après, des pierres d'un volume assez considérable étoient rejetées à travers le sphincter de la vessie dans la partie membraneuse de l'urètre, qu'elles s'arrêtoient près de l'orifice de la fistule, d'où on pouvoit les extraire avec facilité & avec sûreté. J'ai vu en dernier lieu une pierre aussi grosse qu'un œuf de pigeon qui avoit été expulsée de la vessie d'une jeune femme sans aucun secours, & qui

Année 1727.
Vol. XXXV.

n'en éprouva après cela aucun inconvénient, ce qui seroit certainement arrivé, si elle avoit été retirée par le moyen violent ordinaire. Dans le dernier volume des Transf. Phil. le docteur Beard de Worcester parle d'une pierre encore plus grosse qui avoit passé de la même manière, mais qui avoit eu ensuite l'inconvénient ordinaire; savoir, une incontinence d'urine, due plutôt aux aspérités qu'à la grosseur de la pierre qui avoit déchiré les parties comme dans une opération ordinaire, ce qui auroit été évité, si on eût administré des secours à tems.

3°. M. Collet, dans son traité de la taille, parle d'un homme à qui il avoit fait trois fois cette opération & extrait jusqu'à dix pierres. Voici ses propres mots :

« Enfin M. Urson étant hors de danger & sa
 » plaie prête à se cicatriser, prévoyant bien ce
 » qui pourroit arriver dans la suite, je lui ai con-
 » seillé de tenir sa plaie ouverte pour y entretenir
 » seulement une petite canule qui, dans l'occa-
 » sion, donnoit une entière liberté de faire une
 » injection pour nettoyer la vessie de tous les im-
 » mondices, & pour qu'on pût enlever les nou-
 » velles pierres qui pourroient se former. Il prit
 » ce parti & il s'en trouva bien durant cinq an-
 » nées qu'il a vécu ensuite. Mais à trois différen-
 » tes reprises je me suis vu obligé de lui tirer jus-

» qu'à dix autres pierres qui s'étoient formées
» dans la vessie; une petite tente d'éponge prépa-
» rée, mise pendant quelques heures dans la fis-
» tule à la place de la canule, me facilitoit l'en-
» trée d'une très petite tenette. M. Urson s'habil-
» loit & il alloit par-tout où ses affaires l'appel-
» loient ».

Année 1727.
Vol. XXXV.

Je connois maintenant un homme qui a une fistule au perinée qu'il tient ouverte par les mêmes raisons.

Il est donc évident que les fistules dans toutes les parties du corps sont très dilatables, puisque la nature est capable de les dilater elle-même à un degré extraordinaire, & puisque cette même opération que je propose a été pratiquée avec succès trois fois sur la même personne. C'est pourquoi les fistules artificielles dans les hommes & l'urètre dans les femmes, peuvent être dilatées de manière à extraire la pierre sans ouvrir le corps de la vessie, ou sans déchirer ces parties.

N. B. Cette opération paroîtra beaucoup moins surprenante, si nous considérons qu'on l'a faite en dilatant seulement le corps de la vessie d'une manière différente de celle qu'on procure par le procédé de Marianus, c'est-à-dire que par cette méthode les parties sont doucement & graduellement dilatées, après les avoir baignées ou huilées pour

Sij

Année 1727.
Vol. XXXV.

mieux les relâcher. Dans le procédé de Marianus elles sont dilatées promptement & violemment, & alors la pierre, de quelque volume ou de quelque figure qu'elle soit, est tirée immédiatement avec violence, ce qui peut produire des contusions, des dilacérations, des hémorragies, des inflammations & la gangrène.

ARTICLE II.

Description d'une nouvelle méthode de pratiquer la lythotomie; par M. Douglas, chirurgien & membre de la société royale.

Année 1722.
N^o. 171.

DEPUIS que j'ai acquis assez de connoissances en anatomie & en chirurgie pour raisonner sur les causes de la difficulté & du mauvais succès des méthodes ordinaires de pratiquer l'opération de la lythotomie, j'ai conclu qu'elles étoient principalement dues à la structure naturelle & à la situation des parties sur lesquelles on opéroit.

Je commençai par conséquent à considérer de quelle manière l'opération pouvoit être pratiquée suivant le haut appareil, dont les auteurs font si souvent mention, mais qui n'a jamais été approuvée que du plus sagace des chirurgiens, Fr. Riolletus, dont on a très-peu lu les ouvrages

& dont on a mal entendu le sens, car sans cela cette opération n'auroit pas été si longtems un secret.

Année 1712.
N°. 371.

Après avoir fait quelques expériences sur les cadavres, j'ai été convaincu que la pierre pouvoit être extraite de cette manière avec moins de peine qu'on ne le fait ordinairement, & j'étois persuadé que la blessure pouvoit être guérie d'après un grand nombre d'exemples authentiques que j'ai vus de blessures accidentelles des mêmes parties qui ont été promptement guéries & d'une manière stable. Je résolus par conséquent d'en faire l'épreuve sur le premier malade que je rencontrerois & l'occasion s'en offrit à moi en Décembre 1719. Je procédai donc de la manière suivante.

Le malade ayant été placé sur son dos, sur une table, avec un oreiller sous sa tête, je lui fis lier avec des bandes les poignets aux genoux. Pour lors je disposai un aide à sa tête, un autre à chacune de ses épaules & deux au penis, pour me seconder dans l'opération, & enfin un autre aide à chaque genou pour tenir le malade aussi ferme qu'il seroit possible.

Le malade & les aides étant ainsi disposés l'opération se fait en trois tems.

1°. On remplit la vessie de la manière suivante:

On introduit d'abord une sonde dont on ôte

Année 1712.
N°. 371.

le stilet; on fait faire alors une ligature à un aide, au moyen d'un ruban de fil roulé autour du penis, un peu au-dessus du gland. On fixe alors, au moyen d'une forte de clef, la sonde, & on y adapte une seringue. Alors on ordonne à l'aide de ferrer la ligature du penis, & de faire remonter le prépuce* autour de la sonde, en le serrant autant qu'il est possible. On prend alors de l'eau un peu plus chaude que le lait dans son état naturel, on la met dans la seringue & on l'injecte dans la vessie en répétant ce procédé jusqu'à ce que la vessie soit si pleine, que la tumeur qu'elle forme soit sensible à travers l'abdomen; alors on aperçoit le penis au-dessus, & le prépuce au-dessous de la ligature très-enflés & le malade dans un grand état de souffrance; ce qui indique que l'injection est portée assez loin. Alors on ôte la seringue & la sonde ensemble, en ayant soin que les aides qui sont placés au penis serrent fortement pour empêcher l'eau de s'écouler.

2°. On fait ensuite une incision de la manière suivante :

On ordonne aux aides placés au penis de tourner cette partie vers l'anús, sans que leurs mains fassent obstacle; on prend alors un bistouri & on fait une incision à volonté d'une main ferme, près la partie supérieure de la tumeur

de la vessie, ou plus inférieurement suivant la grandeur de la pierre, & en dirigeant l'instrument vers l'os pubis, exactement vers le milieu. Quand on a pénétré un peu plus qu'à moitié à travers les muscles abdominaux, on prend un second bistouri courbé dont on appuie le doigt au milieu de l'os pubis & on pousse sa pointe vers le sphincter de la vessie jusqu'à ce qu'on soit parvenu dans sa cavité, ce qu'on reconnoît par la grande quantité d'eau qui en sort; alors on pousse le bistouri vers le fond de la vessie autant qu'il est nécessaire.

3°. On fait l'extraction de la pierre de la manière suivante :

Avant d'ôter votre bistouri vous introduisez les doigts *index* & *medius* de la main gauche entre le bistouri & l'os pubis dans la vessie; vous retirez le bistouri & vous enfoncez les doigts *index* & *medius* de la main droite dans l'anus pour pousser la pierre vers le lieu de l'incision, & vous la saisissez ainsi avec vos doigts qui sont dans la vessie, en la prenant par l'extrémité antérieure. Vous introduisez de nouveau vos doigts, pour voir s'il y a encore d'autres pierres & vous les retirez comme auparavant.

On prend alors une aiguille & du fil pour faire un point de suture au milieu de l'incision; on délie le malade & on le fait porter dans son lit.

Année. 1721.
N°. 371.

Le malade étant placé dans son lit, j'applique un plumasseau avec du baume sur la blessure & un emplâtre agglutinatif au-dessus. Je fais alors pratiquer des embrocations sur l'abdomen, le scrotum, le penis avec l'huile de camomille chaude. J'applique par-dessus l'appareil, & sur tout l'abdomen, un cataplasme émollient de l'épaisseur d'un pouce, étendu sur la flanelle, & fixé avec un bandage de la largeur de la main autour du corps.

Aussi-tôt que le pansement est fini je donne une potion anodyne où entre le laudanum liquide de Sedenham, & on la répète suivant l'exigence des cas.

Le soir du même jour, j'ôte le cataplasme & l'appareil, & je coupe la ligature en fomentant la plaie & tout l'abdomen avec des étoupes trempées dans l'eau de chaux & l'urine récente, aussi chaudes que le malade peut les supporter. On panse alors la blessure à l'ordinaire. On frotte même le *scrotum*, le *penis* & les aines avec l'*unguentum album*, pour empêcher qu'ils s'échauffent par l'urine qui s'écoule par le lieu de l'incision.

La plaie doit être pansée au moins deux fois le jour jusqu'à une parfaite suppuration. Après le pansement il faut répéter l'onction huileuse. L'urine coule à travers la plaie jusqu'à ce que la cicatrice de la vessie soit formée, ce qui arrive

plutôt ou plus tard suivant la constitution du malade. Quand l'urine commence à prendre sa voie naturelle elle cause de la douleur & de l'échauffement à-peu-près de la même manière que lors de la présence du calcul dans la vessie, ce qui vient de la contraction de l'urètre, qui est restée longtems sans fonction, mais cela ne dure pas au-delà d'un ou de deux jours & alors on rend l'urine avec autant d'aisance & de liberté qu'une personne saine.

Les malades ne doivent point faire des efforts pour aller à la selle, à moins de quelque raison particulière, parce que ces efforts portent atteinte à la plaie. Ils ne doivent jamais se lever que pour permettre d'arranger leur lit, jusqu'à ce que l'urine ait repris sa voie naturelle, parce que cette position les incommode, & retarde la guérison de la plaie. Il faut éviter avec soin l'impression du froid.

J'ai pratiqué cette opération pour la première fois, le 23 Décembre 1719, sur un jeune homme de 16 ans, & dans cinq semaines il a été parfaitement guéri.

Je l'ai pratiquée une seconde fois, le 12 Mai 1720, sur un enfant de huit ans, & il a été guéri dans un mois & demi.

Le troisième malade que j'ai opéré n'avoit

Année 1722.
N°. 371.

Année 1712.
N°. 171.

que trois ans, & il mourut dans les convulsions quinze jours après l'opération.

La quatrième opération de ce genre que j'ai faite a été sur un jeune homme de 14 ans, & dans un mois il a été parfaitement guéri.

Dans ce dernier malade je blessai un peu le péritoine, en sorte que les intestins se présentoient; je les poussai en arrière avec mes doigts; & un point de suture suffit pour les contenir; c'est-là un inconvénient.

Cette opération peut être pratiquée avec un succès égal sur les personnes des deux sexes quand la pierre a un gros volume; mais lorsqu'elle est petite on peut l'extraire par les voies ordinaires.

Je puis donc conclure avec l'ingénieux Rossetus :

Post hæc nemini dubium esse debet novam hanc nostram cystotomiam, vetere illâ tot doctissimorum chirurgorum cystotomiâ (tam periculosa ut eam aggredi vel ipse hippocrates chirurgon chirurgotatos metuerit) leniorem & tutiorem haberi.



ARTICLE III.

Exemple remarquable de quatre calculs raboteux qui ont été trouvés dans la vessie urinaire d'un homme, contre ce qu'on avoit lieu d'en attendre, & qui ont été heureusement extraits par l'opération latérale; par M. J. Warner, chirurgien de l'hôpital de Guy.

C'EST une maxime établie par ceux qui ont le mieux écrit sur les opérations de chirurgie, que lorsque la surface d'une pierre qu'on vient d'extraire de la vessie, paroît être totalement raboteuse, c'est une preuve qu'elle y étoit seule. Quoique cette assertion soit en général fondée, le cas suivant fera cependant voir qu'elle n'est point sans exception. C'est pour cela qu'il convient de ne se point déterminer par cette seule circonstance, mais qu'il est nécessaire au contraire au chirurgien de mettre en usage d'autres méthodes, pour s'assurer avec certitude qu'il n'y a point dans la vessie d'autres pierres que celle qu'il vient d'extraire.

La méthode que je recommanderois, c'est qu'après l'extraction d'une pierre de la vessie, l'opérateur introduise néanmoins son doigt indicateur de

Année 1758.
Vol. IV.

Année 1718.
Vol. IV.

la main gauche ou droite dans la cavité de la vessie. Par ce moyen, si le sujet opéré a moins de douze ans, il sera en état de toucher toutes les parties internes de la vessie avec son doigt ; mais si c'est un adulte ou une personne corpulente, le doigt dans ces circonstances n'étant pas assez long pour cet objet, il faut avoir recours à une sonde ou à quelqu'autre instrument qui soit droit, uni & poli & qui ait neuf à dix pouces de longueur. C'est ainsi que j'ai procédé ces dernières années, sans causer beaucoup de douleur au malade & sans retarder beaucoup l'opération.

Depuis que j'ai eu occasion de faire l'observation suivante aussi bien qu'une observation antérieure, analogue sur l'extraction de deux pierres raboteuses de la vessie d'un jeune homme de quinze ans, je ne puis m'empêcher de croire qu'il n'y ait eu plusieurs exemples de calculs laissés dans la vessie lors de l'opération, purement par la trop grande confiance qu'on a mise dans la règle générale. Ce qui me confirme dans ce soupçon, c'est que j'ai connu plusieurs personnes qui, après l'opération de la lithotomie sont retombées peu de tems après la cicatrice de la plaie dans les mêmes symptômes, en sorte qu'elles ont été obligées de se soumettre à une nouvelle opération ; & la pierre qu'on a tirée alors paroissoit d'un volume trop considérable pour qu'on n'eût pas lieu de soupçonner

qu'elle avoit mis plus de tems à croître que l'espace de tems qui s'étoit écoulé entre les deux opérations. Je ne connois point d'exception à la maxime établie par les auteurs, qu'une pierre qui a une surface unie & polie, n'est jamais seule dans la vessie, mais qu'elle y est accompagnée d'une ou de plusieurs pierres de la même espèce. Mais si ce phénomène se présentoit jamais, l'asservissement à cette règle qui nous est donnée par plusieurs écrivains judicieux, de fouiller alors toujours dans la vessie pour y trouver une ou plusieurs pierres, ne peut jamais être accompagné d'aucun inconvénient pour le malade, lorsqu'il est pratiqué avec soin par les méthodes qu'on recommande ci-dessus, & il doit toujours être suivi. L'état uni & poli des surfaces d'un calcul humain, est universellement attribué au frottement des calculs les uns contre les autres, comme on le peut supposer avec raison; mais j'avoue que cette conséquence ne me satisfait point, puisqu'il est probable que si c'étoit la seule cause du poli de leurs surfaces, le même effet seroit toujours produire quand il est accompagné du même degré de frottement.

O B S E R V A T I O N.

M. Woodmans, d'une habitude de corps robuste, & âgé de quarante-six ans, fut attaqué, il y

Année 1758.
Vol. IV.

a environ huit ans, de douleurs cruelles de lombes qui furent accompagnées d'une impossibilité de rendre l'urine sans le secours de médicamens convenables qui lui furent administrés par un apothicaire du lieu. Ces remèdes produisirent l'effet désiré; ils favorisèrent la sécrétion & l'évacuation de l'urine qui parut être chargée d'une quantité considérable de *mucus* blancs & de gravier. Dans l'espace de trois semaines, il fut parfaitement rétabli de cette attaque, & il continua ensuite de se bien porter durant l'espace de cinq ans, sans aucun retour de sa maladie, excepté quand il se fatiguoit trop, qu'il alloit à cheval ou qu'il faisoit un peu trop d'usage des liqueurs spiritueuses. Vers la cinquième année, il fut attaqué d'une fièvre aiguë dont il se réablit dans peu de semaines.

Bientôt après son rétablissement, il commença à se plaindre d'une douleur excessive lorsqu'il rendoit l'urine ou qu'il alloit à la selle. Ces symptômes augmentèrent tellement plusieurs mois avant de se soumettre à l'opération, qu'il fut incapable d'aller à cheval, de se promener ou de faire aucune sorte d'exercice. Il éprouvoit un écoulement involontaire d'urine en petite quantité, & il se plaignoit d'une grande douleur au fondement avec tenesme. Il resta ainsi trois années, ne jouissant que de courts intervalles de bien-être.

Le 30 Janvier 1758, je lui fis l'opération de la

lythotomie dans sa propre maison de Suffex, après l'avoir préparé suivant la méthode ordinaire. Dans cette opération je fis l'extraction de quatre pierres que j'ai envoyées à la société royale : toute la surface de ces pierres paroît raboteuse sans offrir aucune marque de frottement les unes contre les autres, durant leur séjour dans la vessie; mais cependant je conjecture que ce frottement a eu souvent lieu, parce que je n'ai point éprouvé de difficulté à saisir ces pierres avec le forceps; car si elles avoient été contenues dans différentes cellules ou kystes comme on l'a souvent observé d'après les dissections, cette circonstance m'auroit probablement empêché de les saisir facilement ou même auroit été un obstacle insurmontable.

Année 1752.
Vol. IV.

Le forceps fut introduit trois fois dans la vessie pour opérer l'extraction des trois premières pierres & seulement deux fois pour extraire la seconde. Outre les quatre pierres que j'ai présentées à la société royale, j'ai cru qu'il étoit à propos d'y joindre quelques autres calculs humains qui avoient été trouvés séparément dans la vessie de différens sujets. On peut remarquer que les surfaces de ces dernières pierres étoient moins raboteuses que la surface de l'une quelconque des quatre premières que j'ai extraites de la vessie de M. Woodmans, & par conséquent suivant l'opinion reçue il y avoit lieu de s'attendre de trouver cette pierre

Année 1758.
Vol. IV.

accompagnée d'une ou de plusieurs autres, plutôt que dans le cas qu'a présenté M. Woodmans.

Mais quant au fait que je viens de décrire, il fait voir le peu de convenance & le danger de déterminer par la surface de pareilles concrétions, les précautions qu'il faut prendre. Quoi qu'il en soit j'ai fait connoître deux pierres dont la surface étoit unie & qui avoient été trouvées dans la même vessie, pour faire voir qu'elles ne ressembleraient pas plus aux pierres de M. Woodmans, qu'un morceau de marbre poli ne peut être dit ressembler à un bloc raboteux de la même espèce.

P. S. J'ai été informé par une lettre écrite de Suffex le 18 Février, que M. Woodmans jouit d'une bonne santé, & que depuis cinq ou six jours l'urine a repris ses voies ordinaires à travers l'urètre.

ARTICLE IV.

Observation remarquable d'une opération de la taille par une nouvelle méthode qu'on appelle l'appareil latéral ; par M. G. Cheselden, chirurgien du Roi d'Angleterre.

Année 1746.
Vol. XLIV.

M. SIMON, âgé de 65 ans, après avoir été affligé du calcul pendant plus de cinq ans, & après

après avoir pris l'année précédente le remède de Mademoiselle Stepiens pendant sept mois successifs, sans en recevoir aucun effet, fut opéré par M. Chefelden, le 13 Mars 1741, époque à laquelle il avoit eu une attaque d'affection calculieuse qui avoit duré dix jours, & par conséquent la vessie & les voies urinaires étoient très-enflammées, & de plus le grand âge de la personne opérée rendoit le succès douteux. Cependant à sa demande, & d'après une consultation, l'opération avoit été pratiquée & on avoit extrait une grosse pierre aplatie qui pesoit près de quatre onces.

Année 1745,
Vol. XLIV.

Les petits vaisseaux de la plaie rendant beaucoup de sang, on introduisit seulement un morceau mince d'éponge humectée, afin que le sang pût couler à travers, & on se proposoit, si le cas le demandoit, de faire après cela la ligature à quelque'un de ces vaisseaux. Mais contre toute attente ce fut un moyen d'arrêter l'écoulement du sang, & d'après l'expérience faite dans plusieurs autres cas postérieurs, on a reconnu que rien n'étoit plus utile que cette méthode découverte par accident. Environ six heures après l'opération, le malade n'ayant perdu que peu de sang, on crut convenable de faire pratiquer une saignée au bras. L'urine coula librement à travers la blessure deux heures après l'opération, & il en sortit aussi par le canal de l'urètre; ce qui continua dans la suite, quoiqu'avec une

Année 1746.
Vol. XLIV.

grande douleur à cause de la chaleur & de l'âcreté de ce fluide qui excorioit les parties des environs, quoiqu'on eût l'attention de renouveler l'appareil toutes les deux ou trois heures, & quoiqu'on oignît les parties avec un liniment rafraîchissant.

Le quatrième jour, n'ayant point rendu des selles depuis l'opération, on prescrivit un clystère émollient qui produisit deux déjections & soulagea beaucoup le malade, & qui même calma de légers symptômes fébriles qu'on avoit observés. On répéta le même remède une fois le jour pendant près de trois semaines.

Environ une semaine après l'opération il se plaignit d'une douleur au côté, & il éprouva de légers mouvemens convulsifs dans les boyaux, avec des défaillances & un gonflement de l'abdomen; mais une saignée du bras à la dose de huit onces, fit cesser la douleur, & les autres symptômes disparurent en lui faisant prendre de la confectiion de Raleigh dans l'eau de pivoine composée, chaque nuit, pendant une semaine.

Durant cet espace de tems la plaie commença à suppurer, & il se détacha une grande escarre qui fut rejetée avec différens petits fragmens de calcul qui s'étoient détachés en faisant l'extraction du calcul avec les tenettes. Ces substances en obstruant le libre passage de l'urine, avoient quelquefois causé de grandes douleurs qui avoient

cessé par de fréquentes injections d'huile & d'eau d'orge chaude dans l'urètre & la blessure.

Année 1746.
Vol. XLIV.

Au commencement on fit usage d'une fomentation faite avec l'absinthe romaine & les fleurs de camomille; mais comme les parties charnues qui étoient excoriées étoient extrêmement sensibles, on fut obligé de l'abandonner, & on se contenta de bassiner les parties avec le lait chaud & quelquefois l'eau d'orge. Son régime pendant les trois premières semaines ne consista qu'en soupes ou bouillies, &c., & après cela du poulet bouilli; & quinze jours après l'opération il prit du lait soir & matin, ce qui lui fut très-avantageux, parce qu'il étoit très-maigre, & que depuis plusieurs années il éprouvoit une toux incommode qui sembloit annoncer une fièvre hectique.

A la fin de trois semaines, la plaie fut presque à demi-guérie, & l'urine commença à couler en grande partie par le canal de l'urètre, tandis qu'il en passoit moins de jour en jour par la plaie, & quand elle fut près d'être cicatrisée, ce fluide excrémentitiel prit la voie naturelle, après avoir perdu sa chaleur & son âcreté; alors sa salive prit un goût salé; c'est pourquoi durant tout le cours du traitement il fit un usage abondant des émulsions rafraîchissantes avec la gomme arabique, &c.; dans cinq semaines il fut parfaitement rétabli, & il a continué jusqu'à ce

T ij

jour (en Janvier 1745) sans éprouver aucun
 Année 1746. retour de sa maladie.
 Vol. XLIV.

ARTICLE V.

*Observation sur une opération de la taille faite
 par le haut appareil ; par M. Lecat, chirurgien
 en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen.*

JOSEPH BUNEL, âgé de douze ans, éprouvoit
 depuis huit à neuf ans les symptômes du calcul
 de la vessie. Ayant fixé le 17 Mai 1743 pour
 le jour de l'opération, je me préparai pour lui
 faire l'opération par l'appareil latéral, qui étoit
 la méthode alors usitée. A cinq heures du matin
 le malade fut placé dans une position convenable
 pour cette opération, & en tâchant d'introduire
 la sonde, je trouvai que la pierre étoit si grosse,
 ou au moins si avancée dans le cou de la vessie,
 que j'eus beaucoup de peine à le faire, & je
 ne pus y parvenir que par le côté. J'introduisis
 mon doigt dans l'anus, & je fus convaincu de la
 réalité des circonstances que la sonde m'avoit
 indiquées. Je pensai immédiatement que la position
 de la pierre dans le cou de la vessie m'empêcheroit
 de retirer librement l'instrument, c'est-à-dire que,
 comme ce corps dur sembloit remplir exactement

Année 1743.
 Vol. XLIV.

la vessie, il seroit impossible d'introduire les tenettes entre lui & les parois de la vessie, ou plutôt que son volume trop considérable causeroit une laceration mortelle par l'appareil latéral, & qu'enfin le malade paroïssoit être dans une circonstance qui sembloit nécessiter la méthode du haut appareil.

N'ayant point soupçonné tous ces inconvéniens, & n'étant pas beaucoup disposé à faire en ville une opération que je n'avois encore faite qu'une fois, je n'avois pas porté avec moi les instrumens nécessaires pour le haut appareil; mais voyant qu'il étoit téméraire dans ce cas d'entreprendre l'opération par l'appareil latéral, & qu'il falloit préférer le haut appareil, je différai l'opération jusqu'au lendemain, pour avoir le tems de faire venir les instrumens qui m'étoient nécessaires.

Ce jour je fis donner à midi une légère soupe au malade. Le lendemain 18 Mai j'e pratiquai l'opération par le haut appareil à huit heures du matin, en présence de plusieurs autres chirurgiens. Le malade fut placé sur un petit lit dont les deux extrémités étoient un peu élevées & le milieu un peu creux. La tête du malade étoit tournée vers la lumière, & je lui fis prendre la position convenable pour l'opération. De cette manière j'introduisis un algalie ou sonde creuse dans la vessie en pénétrant par le côté, comme

Année 1745.
Vol. XLIV.

je l'avois fait le jour précédent. J'injectai une pleine setingue d'eau chaude dans la vessie, ce qui occasionna une protubérance seulement trois ou quatre travers de doigt au-dessus du pubis, ce qui indiquoit que le calcul occupoit toute la partie extérieure & inférieure de la vessie.

J'ouvris les tégumens & j'introduisis mon instrument dans la vessie près du pubis; mais ne trouvant là qu'une membrane & le calcul, je fus obligé de diriger le bord de mon instrument en haut, & alors celui-ci entra facilement & il sortit aussi-tôt une grande quantité d'eau & d'urine. Je prolongeai l'incision vers le pubis, j'introduisis mon doigt dans la vessie, & ayant senti un calcul qui étoit au dessus du premier, je retirai avec les tenettes ce calcul qui n'étoit qu'un fragment du premier.

Ayant ôté ce fragment je reconnus distinctement avec mes doigts que la vessie étoit divisée en deux cavités; l'une supérieure que j'avois ouverte, & où l' injection avoit été reçue, l'autre qui étoit occupée par le grand calcul qui s'étendoit jusqu'au cou de la vessie & dont il paroissoit même que les parois étoient adhérentes à la surface du calcul. Je détruisis les adhérences de cette pierre avec mes doigts, & en la poussant au moyen d'autres doigts introduits dans l'anus je la fis sortir par l'incision pratiquée au-dessus du pubis. On appliqua sur la

plaie un plumasseau chargé d'un digestif; on fit une embrocation & on mit un cataplasme émollient. Le malade resta couché sur le ventre en appuyant sa tête sur un oreiller & sa poitrine sur un autre. On le saigna & il prit un cordial. Il sua beaucoup l'après-dîner, ce qui fit différer le bain jusqu'à sept heures & demie du soir. La première heure qu'il resta dans le bain il n'éprouva point de changement, mais après cela il s'y endormit pendant une heure. Son pouls parut plus lent & il se trouva très-bien au sortir du bain. Il fut pansé comme ci-devant à dix heures du soir. Le lendemain matin on lui tira encore deux palettes de sang du bras, & le bain fut différé jusqu'à quatre heures de l'après-midi, après lui avoir administré un clystère.

Le 19 il resta encore une heure & demie dans le bain, & il dormit bien pendant une grande partie de la nuit. Au quatrième bain qu'il prit, le 20 du même mois, il se trouva sans fièvre. Son état continua à s'améliorer, en sorte que la cicatrice de la vessie fut faite dans vingt jours, à compter du jour de l'opération; les tégumens ont été entièrement cicatrisés dans quarante jours.

Année 1745
Vol. XLIV,

SECTION II.

DES BLESSURES.

ARTICLE PREMIER.

Exemple de l'intestin ileum blessé par un coup de couteau & traité avec succès ; par M. P. Travers, chirurgien à Lisbonne.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

UN des messagers du Roi fut attaqué le 3 Août par deux hommes qui, après l'avoir frappé sur la tête, lui donnèrent un coup de couteau dans l'hypocondre droit à trois travers de doigt au-dessus du pubis. La plaie extérieure étoit grande en ce que le couteau avoit été dirigé obliquement vers l'ombilic, & elle avoit un pouce & demi de longueur. L'ouverture faite au péritoine étoit de trois quarts de pouce. L'intestin ileum pendoit hors du ventre à la longueur de dix à douze pouces, & la blessure de cet intestin de part en part, étoit assez grande pour donner entrée à mon doigt index. Après avoir nettoyé le sang grumelé avec de l'eau chaude & de l'eau de la reine de Hongrie, je fis une suture continue aux deux trous ; dilatant

alors les tégumens ordinaires du ventre, l'intestin fut réduit, en laissant les extrémités des deux fils, à la surface de la blessure. L'incision externe fut aussi réunie par quelques points de suture, & j'appliquai un appareil convenable. On donna un clystère immédiatement après cette opération avec l'huile d'olives, un jaune d'œuf & de l'eau chaude.

Le malade avoit passé le 4 dans les douleurs les plus cruelles, accompagnées d'un vomissement continuel. Sa fièvre étoit très-forte, son pouls plein & irrégulier. On lui tira par le bras dix onces de sang le matin & autant le soir. Les clystères furent continués trois fois le jour avec une décoction d'absinthe & de camomille, au lieu d'eau chaude; on y joignit une mixture de menthe poivrée, de laudanum liquide & de sucre, pour prendre de tems en tems; je prescrivis aussi trois onces de sirop de rhubarbe avec une once d'huile fraîche d'amandes douces pour en prendre une cuillerée ordinaire de deux en deux heures.

Le 5 les saignées furent continuées deux fois le jour, en tirant seulement trois onces de sang, & on administra des clystères chaque fois; son pouls & sa fièvre avoient une grande force; il rejeta par le haut quelques excréments, & vers la nuit il fut attaqué du hocquet.

Le 6 les saignées & le clystère furent réitérés comme précédemment. Apercevant que le vomis-

Année 1718.
Vol. LXXIX.

sement & le hocquet étoient très-incommodes, je prescrivis la teinture de quinquina d'Huxam; je la fis prendre dans une cuillerée à café six fois le jour dans un peu d'eau de menthe, ce qui le soulagea beaucoup; le hocquet & le vomissement devinrent moins fréquens.

Le 7 je trouvai sa peau moite & son poulx plus souple. Je restai avec lui pendant une heure, & je lui trouvai une transpiration abondante & générale. Je ne fis plus pratiquer la saignée, mais je continuai l'usage des clystères, & vers la nuit le malade rendit des déjections très-fétides & épaisses.

Le 8 je trouvai pour la première fois qu'il avoit dormi la nuit précédente, & que ses forces s'étoient rétablies; la fièvre symptomatique parut un peu diminuée & il avoit été plusieurs fois à la selle.

Le 9 il eut cinq selles; ses vomissemens furent bien moindres, & il continua d'éprouver une douce transpiration.

Le 10 le hocquet cessa; il vomit très-peu, son poulx devint déprimé, accéléré, & les battemens de l'artère imitoient ceux d'un fil. Il évacua violemment par le bas, & il se plaignit d'une douleur aiguë dans les parties blessées. On lui donna les poudres suivantes toutes les trois heures dans l'eau de ris; yeux d'écrevisses, corail préparé, de chacun un gros, opium crud, deux grains. On

en faisoit trois doses & le malade les prenoit comme je viens de le dire.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

Le 11 il dormit bien ; il avoit moins de douleur ; le pouls étoit plus égal & la diarrhée dans le même état.

Le 12 les fils avec lesquels j'avois fait la suture des intestins, sortirent d'eux-mêmes. La blessure étoit dans un bon état, la fièvre très-peu marquée, & la diarrhée avoit plutôt augmenté. Il m'envoya chercher vers le soir, étant fort allarmé, parce qu'il croyoit que quelques liquides avoient passé à travers les parties blessées.

Le 13 il se plaignit de grandes douleurs dans le ventre ; la suppuration par la plaie étoit abondante & d'une bonne qualité.

Le 14 il dormit bien, & il paroïssoit qu'on n'avoit rien à désirer dans son état. La diarrhée étoit encore incommode ; il prit la décoction de corne de cerf avec une addition de diascordium.

Le 15 je coupai les fils de la plaie extérieure, je continuai les pansemens avec l'onguent digestif, suivant l'usage.

Le 16 il alloit de mieux en mieux, & le 7 Septembre il n'eut plus besoin de mes secours, sa plaie étant entièrement guérie ; il se trouva à tous égards très-bien, libre de toute douleur & de tout autre symptôme relatif à sa blessure. On le nourrit pendant vingt-sept jours avec du bouillon de poulet,

Année 1758.
Vol. LXXIX.

en lui interdisant seulement les alimens solides pendant tout ce tems; après cela il a été nourri avec la viande de poulet, &c., & il s'est depuis ce tems-là bien porté.

ARTICLE II.

Cas remarquable d'un anévrisme ou d'une maladie de l'artère fémorale causée par une chute. On y a ajouté des réflexions sur l'incertitude des symptômes qui caractérisent cette maladie; par J. Warner, membre de la société royale.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

LORSQUE les tuniques d'une artère deviennent distendues outre nature, quand elles ont été blessées, ou quand elles éprouvent une rupture de manière à donner lieu à un épanchement sous les tégumens, sous une aponévrose ou sous une expansion tendineuse d'un muscle voisin, ou encore plus profondément sous les muscles eux-mêmes, il s'ensuivra plutôt ou plus tard une tumeur qu'on appelle *anévrisme*.

Si un anévrisme vrai a lieu, c'est-à-dire si un gonflement est la suite d'une foiblesse générale des tuniques d'un vaisseau artériel, d'une blessure ou d'une rupture de ses tuniques, on peut souvent le distinguer d'une tumeur qui provient de toute

autre cause, par un degré de pulsation, en supposant que le vaisseau blessé soit superficiel, comme on peut s'en convaincre dans des anévrismes récents de l'artère humérale qui proviennent souvent d'une saignée faite près le pli du coude, aussi bien que dans les anévrismes de la partie inférieure de l'artère radiale ou de l'artère antérieure de la jambe appelée *tibialis antica*, & comme on peut l'observer quelquefois dans le cas des artères qui ne sont pas superficielles comme dans les anévrismes de l'aorte ascendante, la courbure de l'aorte & les carotides.

Le symptôme de pulsation dans les tumeurs qui proviennent d'une blessure partielle ou d'une foiblesse générale & d'une dilatation subséquente des tuniques de l'artère, n'est point borné à cette espèce d'anévrisme, mais il est fréquemment accompagné d'anévrismes faux, c'est-à-dire de tumeurs occasionnées par un sang artériel extravasé, en supposant que la maladie soit récente dans l'un des vaisseaux précédens, ou dans tout autre vaisseau qui ne soit pas profondément situé, & ce symptôme de pulsation dans les anévrismes faux, sera toujours accompagné d'une décoloration ou d'une altération de la peau qui dépend de l'insinuation du sang au-dessous d'eux.

Mais si l'extravasation est bornée sous une aponeurose, ou si la maladie a été d'une si longue

Année 1782.
Vol. LXXIX.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

durée, que les parties les plus fluides du sang extravasé ayent été absorbées ou dispersées par tout autre moyen, & que la partie fibreuse qui est au-dessous ait été accumulée en une quantité considérable & ait acquis une consistance solide, de manière à ressembler par sa couleur & son tissu à du cuir brun macéré, ce que j'ai toujours observé dans les anévrismes anciens, alors les symptômes ordinaires de pulsation sur la tumeur & de décoloration des tégumens, deviennent pour la plus grande partie imperceptibles, & alors la vraie nature de la maladie peut être accompagnée d'une certaine obscurité.

Tous ceux qui ont eu occasion d'observer souvent ces maladies ont remarqué que les symptômes de pulsation & de décoloration des tégumens par une extravasation du sang, ne manquent pas seulement dans les anciens anévrismes, mais encore dans ceux qui sont récents; ce qui prouve que la non-existence de ces symptômes n'est pas un caractère certain que les tumeurs ne sont pas anévrisma-tiques; & on en conçoit facilement la raison par la situation profonde de plusieurs artères qu'on connoît sujettes à de pareilles affections, comme sont les artères fémorales, les *arteria tibiales postica*, les *arteria perronea* & quelques autres.

Quoique j'aie traité de la pulsation qu'on remarque dans certaines tumeurs & de la décolo-

ration des tégumens, quand elles existent comme des signes des anévrismes vrais, cependant on ne doit point en conclure que la présence de ces signes annonce toujours d'une manière certaine des tumeurs anévrismatiques. Il arrive souvent que de simples abcès ou des collections de matière qui proviennent de causes externes ou internes sont quelquefois situées si immédiatement sur le cœur ou sur de grandes artères, qu'ils participent immédiatement à leur contraction & à leur dilatation.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

J'en ai vu un exemple il y a quelques années sur un jeune homme qui s'étoit fracturé le sternum par une chute; il vint à l'hôpital de Saint-Guy seulement quinze jours après l'accident. En l'examinant on remarquoit une séparation évidente des parties fracturées qui étoient dans un certain éloignement l'une de l'autre; l'espace intermédiaire étoit occupé par une tumeur d'un volume considérable; les tégumens conservoient leur état naturel; la tumeur avoit une contraction & une dilatation régulières comme le cœur lui-même ou l'aorte auroit pu l'avoir.

En la comprimant, la tumeur s'éloignoit; en faisant cesser la compression, la tumeur reprenoit aussi-tôt son premier volume. Tous ces signes sembloient indiquer un anévrisme vrai. La situation & les symptômes du gonflement fournissoient des

Voilà les détails que je rapporte d'après le compte du malade lui-même. Voici maintenant ce que j'ai observé.

Année 1758.
Vol. LXXIX.

Le 28 Avril 1757, il fut confié à mes soins dans l'hôpital de Saint-Guy. En l'examinant, la cuisse paroissoit avoir acquis un énorme volume. La tumeur étoit uniforme, & s'étendoit depuis l'intérieur du genou jusques près de l'aîne. Les tégumens conservoient à tous égards leur couleur naturelle. En pressant la tumeur à l'intérieur, elle paroissoit molle, & on apercevoit une fluctuation évidente à la partie interne & latérale; mais il n'y avoit pas la moindre apparence de pulsation. La tumeur à sa partie supérieure & postérieure égaloit la dureté de la pierre. La jambe qui, suivant le compte qu'en avoit rendu le malade, avoit été depuis longtems fort enflée, ne paroissoit plus l'être. La douleur étoit continuelle & pendant quelque tems le sommeil avoit été nul. L'appétit étoit perdu, & le corps dans un extrême amaigrissement. Le malade éprouvoit une fièvre hectique qui s'étoit déclarée cinq semaines avant son admission dans l'hôpital. Depuis dix jours que je le voyois je n'apercevois aucun changement dans les symptômes ni dans le gonflement.

Dans l'attente par conséquent de lui donner le soulagement qu'on ne pouvoit lui procurer d'aucune autre manière, je jugeai convenable de

Tome II. Chirurgie.

V

Année 1718.
Vol. LXXIX.

faire une ouverture dans la tumeur; ce que je fis par une incision dans la partie la plus proéminente & où on apercevoit une fluctuation; il sortit aussi-tôt un grand jet d'un sang fleuri. Ce qui me fit connoître à l'instant l'état vrai de la maladie qui n'avoit pu être déterminé par aucun symptôme particulier qu'on peut distinguer au toucher ou à la vue. Je m'empressai donc de remplir le lieu de l'incision avec de la charpie & des éponges, & je procédai de la manière la plus expéditive à appliquer un bandage serré sur la cuisse près de l'aîne, & pour plus grande sûreté j'appliquai un second bandage sur le premier & je procédai à l'amputation du membre.

Durant l'opération le malade éprouva une défaillance, mais il revint bientôt à lui-même & sans aucun autre mauvais symptôme; il recouvra le repos, l'appétit & la force, & il jouit maintenant d'une santé parfaite. En disséquant la cuisse & la jambe j'ai constaté l'état suivant de ces parties.

Une grande partie des portions charnues des deux grands muscles extenseurs de la jambe, comme le vaste interne & le crural étoient détruits, ainsi que le périoste subjacent. Les muscles *gracilis*, *femitendinosus*, *femimembranosus* & *biceps tibia*, ensemble avec l'adducteur & le fléchisseur de la jambe appelé *sartorius* étoient éloignés à une distance considérable de la cuisse à la partie infé-

tière, & du *tibia* & du *peroné* à leurs parties supérieures. Il s'étoit formé par ce moyen une grande cavité pout contenir le sang extravasé qui consistoit en une partie fluide & en une partie coagulée; mais la plus grande partie de ce *coagulum* avoit acquis une consistance si ferme & si fibreuse qu'elle ressembloit à du cuir brun macéré, soit pour la couleur, soit pour le tissu. Les muscles voisins paroissoient livides & déchirés.

L'os fémur étoit carié à sa partie inférieure & postérieure; & à environ un pouce de distance au-dessus du condyle de cet os à l'intérieur, il y avoit une exostose considérable. Le ligament capsulaire du genou étoit très-épais & contenoit environ deux onces d'une synovie visqueuse & jaunâtre. L'artère fémorale à sa partie inférieure un peu au-dessus de sa division en tibiale antérieure & postérieure étoit dans un état de maladie, & cette affection s'étendoit à quatre pouces en-dessus. Les tuniques de l'artère étoient très-épaissies & déchirées longitudinalement. Le plus petit diamètre de la partie affectée de l'artère étoit de deux pouces & un quart. Le plus grand diamètre de cette même partie étoit de quatre pouces & demi.

Année 1718.
Vol. LXXIX.

ARTICLE III.

Extrait d'une lettre de M. J. Field, à M. Douglas, sur deux cas de blessures dans l'estomac.

Année 1724.
N^o. 370.

Un jeune nègre revenant le soir à sa case, trouvant du fruit-mûr sur une table, le mangea avec avidité; son père qui avoit environ 60 ans arriva bientôt après & demanda au jeune nègre qui avoit mangé le fruit qu'il conservoit? L'autre répondit que c'étoit lui, parce qu'il étoit pressé par la faim; le père en courroux de ce que son dîner lui avoit été ainsi enlevé, prit son couteau, & d'une main désespérée il frappa le jeune nègre à la partie supérieure du ventre, & lui fit ainsi une grande blessure à l'estomac, en sorte que le fruit que celui-ci avoit mangé s'échappa à travers cette ouverture qui étoit dirigée de haut en bas.

Le vieux nègre prit aussitôt la fuite, pour suivi par d'autres jeunes nègres qui avoient été témoins de l'accident & qui tenoient de gros bâtons dans leurs mains. Ce malheureux se voyant sur le point d'être atteint, & soupçonnant que leur dessein étoit de le tuer, dirigea contre lui-même le couteau avec lequel il avoit blessé son fils, & se fit aussi une profonde blessure dans la partie

supérieure de l'abdomen. On voyoit aussi son estomac avec cette différence que la direction de la blessure étoit de gauche à droite, au lieu que dans l'autre cas elle étoit de haut en bas. Ce vieux nègre fut transporté dans la même maison où étoit son autre fils qu'il avoit blessé.

Cet accident arriva vers midi, & M. Forest, chirurgien, ne vint panser leurs blessures que vers les cinq heures; il fit quelques points de suture à chacun des estomacs des deux blessés, ainsi qu'à leur ventre, en laissant seulement un petit passage pour la suppuration. La fièvre se déclara & le vieux nègre fut dans le plus grand danger; cette fièvre dura une quinzaine de jours; les blessures offrirent une suppuration de bonne qualité, & dans un mois ou environ le jeune nègre fut en état de sortir; mais le vieux nègre fut plus longtems retenu dans sa chambre. Ils ont été tous deux parfaitement guéris & se sont bien portés depuis cette époque, quoiqu'il y ait déjà quinze ans que cet accident leur est arrivé.

Nous croyons devoir joindre ici une autre affection de l'estomac qui a été heureusement guérie, & dont le détail se trouve dans le même volume, par M. Atkinson,

Un malade avoit une grosse tumeur à la partie supérieure du ventre; elle étoit dure & douloureuse; mais la couleur de la peau n'en étoit point

Année 1721.
N°. 370.

altérée & elle avoit été trois mois à s'accroître. J'appliquai un emplâtre suppuratif qui produisit l'effet désiré dans une quinzaine de jours. Je me servis alors d'un caustique de la largeur d'un schelling pour ouvrir l'abcès, & à la chute de l'escarre je vis paroître à l'orifice une substance solide; je la saisis avec mon forceps, je la tirai doucement vers moi, & j'en détachai avec effort une certaine quantité & autant que ma main pouvoit en contenir. Au pansement suivant, la même substance reparut de nouveau, & j'en détachai encore deux ou trois fois autant qu'auparavant. Je fus longtems à pouvoir déterminer quelle étoit cette substance, & je conclus enfin que c'étoit l'épiploon lui-même, & d'autres chirurgiens auxquels je la fis voir furent du même avis. Je doutois encore si l'estomac étoit attaqué dans ce cas, jusqu'à ce qu'enfin en levant l'appareil prochain il sortit en plein jet environ une demi-pinte de bierre, ce qui étoit une partie d'une pinte de la même liqueur qu'il avoit bue précédemment. Je conclus que le cas étoit mortel, & cependant je lui prescrivis de garder le lit, de rester constamment couché sur son dos & de ne prendre que des substances d'une digestion facile. La plus grande partie de ce qu'il avoit mangé & bu sortit à travers l'ulcère pendant huit ou dix jours, de sorte que je désespérois de pouvoir

le guérir; cependant contre mon attente il fut parfaitement guéri dans environ six semaines, & il jouit maintenant d'une parfaite santé.

Année 1722.
N°. 370.

ARTICLE IV.

Extrait d'une lettre de M. Derante, chirurgien à Wateford, à M. Douglas, membre de la société royale, sur une perte de l'omoplate & de la tête de l'humérus.

Le 3 Novembre 1713, J. Fletcher, matelot du vaisseau le Neptune, eut le malheur de se fracturer le radius & le cubitus de la main gauche, en sorte que les parties fracturées sortoient à travers la peau. Il fut soigné par le chirurgien du vaisseau, & les os furent remis en place & contenus avec un bandage ordinaire; cinq ou six jours après je fus mandé pour voir cet homme. A mon arrivée je trouvai auprès de lui son chirurgien qui me dit que tout alloit bien, parce qu'il n'y avoit plus de douleur. Cependant je désirai qu'on levât l'appareil pour voir la blessure par moi-même. C'est alors que je reconnus que le bras étoit insensible depuis les doigts jusqu'à l'épaule & que je conseillai l'amputation; mais le chirurgien s'y opposa. Toutefois je fis en plusieurs endroits des

Année 1722.
N°. 370.

~~CHirurgie~~ scarifications profondes & j'appliquai des ropiques
 Année 1722, échauffans.
 N. 170.

Le lendemain le vaisseau fit voile & ce malheureux blessé fut envoyé à Waterford & confié à mes soins. Aussi-tôt que j'eus mon appareil prêt, je fis l'amputation du bras aussi haut qu'il fût possible, & je cautérisai le moignon qui étoit dans un état de mortification jusqu'à l'acromion. Le lendemain je m'aperçus que la gangrène s'étendoit jusqu'à l'angle inférieur de l'omoplate; alors je frottai les bords de la partie mortifiée avec des sondes armées trempées dans une dissolution de mercure dans l'eau forte, ce qui remplir complètement mon indication; car dès cette époque la gangrène s'arrêta. Dans le pansement suivant je scarifiai & je cautérisai toute la partie gangrenée; & j'appliquai un appareil convenable. Je continuai cette méthode pendant près de dix-huit jours, & alors les escarres commencèrent à se séparer & à tomber de jour en jour. Quelque tems après l'omoplate commença à se séparer de l'humérus & de la clavicule, & enfin à tomber entièrement. Il restoit encore l'extrémité de l'humérus qui adhéroit encore au pectoral & au *latissimus dorsi*; mais dans peu de tems cette partie de l'humérus se sépara aussi sans hémorragie. Je fus ensuite obligé d'emporter une partie de la clavicule avant de pouvoir cicatrifier la blessure,

ce qui fut ensuite facile, J'ai l'omoplate & la tête de l'humérus encore en mon pouvoir, & je les ai fait voir à plusieurs chirurgiens & médecins.

Année 1722;
N^o. 179.

ARTICLE V.

Description d'un instrument de nouvelle invention pour la fracture des jambes, consistant dans deux atelles, l'une supérieure & l'autre inférieure, & recommandé au lieu de l'appareil ordinaire.

CET instrument ou appareil, est composé de deux atelles, l'une inférieure & l'autre supérieure; l'atelle inférieure est d'une forme irrégulière & adaptée à celle de la jambe; elle est un peu convexe au-dehors & concavé au-dedans. Pour les personnes d'une taille moyenne, sa longueur doit être de dix-huit pouces; il convient d'en avoir deux autres, l'une de vingt pouces & l'autre de seize. Leur largeur est de deux pouces trois quarts vers la partie supérieure, & de deux pouces un quart vers l'inférieure. On attache en travers, à des distances à-peu-près égales, trois courtoies de cuir, longues de vingt pouces & d'un pouce de large avec des petits trous vers leurs extrémités pour les fixer convenablement; la partie inférieure de la même atelle a une autre courtoie, destinée

Année 1767.
Vol. LVII.

Année 1767.
Vol. LVII.

à être passée sous le pied pour venir s'attacher à l'atelle supérieure qui a aussi une forme convenable pour s'adapter à la partie de la jambe à laquelle elle est destinée. Cette atelle est aussi garnie de petites pointes aux endroits où elle doit recevoir les extrémités percées des courtoies de cuir. L'une & l'autre de ces atelles ont des trous pour recevoir le malléoles, soit internes soit externes, car elles sont faites de manière à devoir être seulement adaptées aux parties latérales de la jambe.

Quand un chirurgien est appelé pour une fracture de jambe au lieu où l'accident est arrivé, il fait placer le blessé sur une surface plane, & il fait élever le genou de la jambe fracturée vers l'abdomen, faisant plier en même tems le genou de manière que les extenseurs du pied soient dans un état de relâchement. Il replacera alors facilement les parties fracturées dans leur situation naturelle, sans recourir à des extensions du membre; il mettra alors l'atelle inférieure à la partie latérale extérieure de la jambe, & si elle ne s'y adaptoit pas bien, il y suppléeroit avec des compresses, de la filasse ou toute autre substance souple propre à remplir les vides. Il appliquera ensuite à la partie latérale interne de la jambe l'atelle supérieure, & il la fixera, soit avec la courtoie qui passe sous le pied, soit avec les trois courtoies de cuir qui sont en travers de l'atelle inférieure (on suppose le malade cou-

ché sur le côté blessé). C'est ainsi que le malade pourra être transporté sans douleur & sans que les pointes fracturées de l'os agissent l'une sur l'autre.

Année 1767.
Vol. LVII.

Quand le malade est rendu chez lui, l'auteur propose de substituer au bandage à dix-huit chefs, un assemblage de plusieurs bandes de linge qui empiètent l'une sur l'autre de presque leur demi-largeur, & dont la longueur décroît depuis vingt ou dix-huit pouces jusqu'à quatorze, & même douze, suivant qu'elles correspondent à la partie supérieure ou inférieure de la jambe; chacune de ces bandes a deux pouces de largeur, & elle est disposée de manière que la moitié de sa largeur couvre la moitié de celle qui est au-dessous. Ces bandes sont cousues à une bande transversale qui passe par leur milieu & qui sert ainsi à les fixer. On applique ensuite les atelles ci-dessus sur le bandage qui a servi à envelopper la jambe fracturée; & on conserve le blessé dans la position qui a été déjà indiquée.

Quand la fracture est compliquée on la panse ainsi sans produire d'irritation. On a aussi l'avantage de pouvoir élever la jambe en entier avec tout l'appareil, & l'articulation du genou peut ainsi être doucement remuée aussi souvent qu'il est nécessaire, pour prévenir sa rigidité qui a toujours lieu dans des cas de cette sorte, & qui est accompagnée de beaucoup d'inconvéniens & de douleurs,

Année 1737.
Vol. LVII.

lors même que la fracture est guérie. Le malade aussi de cette manière peut être facilement retiré souvent de son lit sans douleur & sans danger. Quelquefois il est utile de laisser le soulier pour qu'il y ait un poids d'appui plus fort à la courroie qui passe sous le pied. C'est à dessein qu'on n'emploie que des atelles peu larges, afin de pouvoir examiner l'état des parries fracturées, & afin que celles-ci soient délivrées d'une compression douloureuse. Si on ne les trouve point assez larges pour une grosse jambe, on peut remédier à cet inconvénient en plaçant entr'elles & à la parrie antérieure de la jambe, s'il est nécessaire, une autre atelle de carron ou de bois mince.

On fait les atelles supérieure & inférieure avec des plaques de fer recouvertes d'un fort carton. On pourroit employer un moyen analogue pour les fractures de la cuisse. L'auteur remarque qu'au lieu d'appeler les deux atelles ci-dessus, l'une supérieure & l'autre inférieure, il auroit été peut-être plus convenable de les appeler l'une tibiale & l'autre fibulaire relativement aux os auxquels elles répondent.

Note du rédacteur. Cette observation a été traduite & inférée avec les gravures dans une traduction de l'ouvrage de M. Percival Pott, sur les luxations & les fractures, par M. Laffus.

ARTICLE VI.

Exposition d'une hydro-enterocèle qui ressembloit à un hydrosarcocèle, & qui se termina par la mort du malade, dans laquelle l'intestin avoit passé du sac herniaire dans celui de l'hydrocèle, ce qui avoit formé un étranglement de l'intestin; par M. Lecat, membre de la société royale.

Le malade étoit sujet à une hernie qui n'avoit pas été réduite depuis quinze jours; & depuis huit jours il étoit attaqué de vomissemens & ne pouvoit prendre aucune nourriture. En l'examinant, la tumeur étoit molle, sur-tout à la partie supérieure. L'extrémité de l'ensure qui étoit du volume d'une grosse orange étoit évidemment une hydrocèle transparente. On sentoit à sa base quelques points durs qui furent pris pour des tumeurs squirreuses. M. Lecat crut par conséquent que c'étoit une hernie ancienne à laquelle avoit succédé un sarcocèle ou une hydrocèle, & que l'intestin étoit alors rentré. Il imagina que les vomissemens qui n'étoient point fréquens pouvoient être causés par quelque autre affection, peut-être par le progrès que le sarcocèle avoit fait dans l'abdomen. Mais la mort étant survenue, M. Lecat reconnut la vraie nature de ce cas.

Année 1767.
Vol. LVII.

SECTION III.

SUR QUELQUES OPÉRATIONS DE
CHIRURGIE.

ARTICLE PREMIER.

*Observations sur le spina ventosa; par M. Amyand;
chirurgien & membre de la société royale.*

Année 1746.
Vol. XLIV.

CE que les praticiens appellent en général *spina ventosa* est une carie de l'os, qui provient de l'extravasation de quelques humeurs âcres qui s'y déposent, qui relâchent le ton de ses fibres, le gonflent & augmentent son volume au-delà des bornes naturelles.

Dans ce cas l'humeur extravasée se renferme dans l'os, se fraye une route en-dehors, soit à travers sa surface extérieure, soit dans les jointures ou bien dans les deux ensemble. Par le séjour elle acquiert une acrimonie, & de même que le vinaigre ou d'autres suc acides, non-seulement elle relâche le ton des tuyaux osseux, mais encore elle les ramollit, & de même qu'un caustique, elle les perce & les déchire. L'os alors se gonfle, se tumé-
fie

& se distend, & le suc osseux en coulant & se frayant une route au-dehors à travers les tubes dilacérés, s'étend à la surface, y forme un calus & s'y endurecit. Lorsque cet accident arrive aux articulations ou tout auprès, les os qui sont en contact se réunissent, & la partie cariée est incrustée & recouverte d'une exostose dans d'autant d'endroits que la matière confinée dans l'intérieur de l'os, rompt sa surface extérieure & se fraye une route au-dehors. C'est ainsi que la maladie peut être considérée sous différens points de vue suivant ses différens périodes.

Année 1746.
Vol. XLIV.

L'altération que l'os éprouve par la matière qui s'extravase dans sa substance intime ou dans ses cavités, dans le premier période du *spina ventosa*, devient l'occasion d'une exfoliation, ou d'un détachement d'une partie osseuse. A mesure que la matière acquiert une plus grande acrimonie, le tissu de l'os étant relâché & ses lames étant devenues plus souples, l'os augmente beaucoup dans ses dimensions & dans le dernier période lorsque l'os est carié, la matière corrosive détruit sa continuité, à mesure qu'elle se fraye une route à travers sa surface extérieure ou quelque articulation. Alors il se forme des abcès en plusieurs endroits, à mesure que la matière peut se frayer une route au-dehors. La matière calleuse qui est au dessous du périoste s'ossifie par degrés, & re-

Année 1758.
Vol. XLIV.

couvre plus ou moins l'os d'exostoses, & il se forme des ankiloses par l'extravasation & l'induration du suc osseux qui s'y fraye une issue dans ces parties.

Les abcès qui surviennent dans l'os vers le centre des os longs sont toujours accompagnés d'un surcroît de maux, à mesure que l'effort de la matière ; pour se porter au-dehors, trouve plus de résistance de la part des lames osseuses qui sont plus serrées & plus compactes. Les exfoliations faites dans le premier période, ou dans le commencement du *spina ventosa*, se bornent souvent à la surface de l'os ou à quelque expansion calleuse de sa surface. Dans le dernier période de cette même maladie, au même endroit de l'os, ce dernier se trouve ordinairement percé de grands trous, d'ouvertures fistuleuses, en même tems qu'il est carié, & alors les exfoliations qui y sont bornées conservent leur état primitif & leur solidité. Le malade ne peut survivre longtems à ces accidens ; car à mesure que la fièvre hectique & la diarrhée sont sans cesse alimentées par une absorption continuelle de la matière dans le sang, le corps est desséché par une perte extraordinaire qui se fait par ces plaies. L'amputation du membre est dans ce cas le remède ordinaire ; mais on peut attendre un changement en mieux avant d'en venir à ce période, comme on va le voir par les observations suivantes :

OBSERVATION

OBSERVATION PREMIERE.

Année 1746
Vol. XLIV

THOMAS PENTNEY, berget, dans le comté de Norfolk, âgé d'environ vingt-deux ans, fut reçu dans l'hôpital de Saint-Georges vers le commencement d'Août 1739, & confié aux soins de M. Middleron. Cinq ans auparavant, par l'effet d'un effort critique d'une fièvre, il avoit éprouvé une grande douleur dans l'os de l'humérus du côté droit, qui avoit continué pendant plusieurs mois; durant cet espace de tems, les dimensions de l'os s'étoient si augmentées que vers la fin de l'année le bras avoit acquis un volume double de son état naturel. Vers ce tems il se forma un grand abcès, & la matière s'étant fait une issue à travers les tégumens au dehors du bras, le malade se trouva si bien qu'il fut en état de conduire son troupeau comme précédemment.

Quand il se rendit à l'hôpital, quatre années après cette époque, il avoit plus de douze trous à travers les tégumens à l'extérieur du bras qui correspondoient à d'autres ouvertures dans la cavité médullaire de l'os; quelques-unes de celles-ci étoient assez grandes pour laisser passer l'extrémité du doigt. Il y avoit une ankylosé au coude, & depuis les deux dernières années il ne pouvoit plier son bras, ni le mettre en pronation ou en

Année 1746.
Vol. XLIV.

supination. Tout l'os étoit épais & inégal au haut de l'épaule où l'articulation étoit libre. Le malade ne se plaignoit pas beaucoup alors. L'écoulement par les plaies étoit modéré; son sommeil, son estomac, son pouls étoient aussi bons qu'on peut le desirer, & par conséquent il étoit déterminé à essayer toute autre chose, plutôt que de se soumettre à l'amputation qui lui étoit proposée.

Etant en consultation avec d'autres médecins, il fut convenu de faire une incision depuis le deltoïde jusqu'en bas, vers le coude, pour mettre à nu l'os dans toute sa partie affectée, & ensuite avec un trépan exfoliatif de faire une grande ouverture dans la cavité médullaire de l'os, en ôtant tout ce qui étoit percé à la partie extérieure du bras, & d'appliquer ensuite le cautère actuel si on le jugeoit nécessaire.

Ces deux opérations furent faites avec facilité, car à mesure que dans l'incision, le périoste fut aisément détaché de l'os, & que la substance osseuse, proprement dite, fut mise à découvert, comme elle étoit presque d'une nature cartilagineuse, & qu'elle faisoit peu de résistance, on l'ôta facilement par une application répétée du trépan exfoliatif. Dans le cours de l'opération M. Middleton trouva un os libre qui avoit été jusqu'alors caché par l'enveloppe extérieure de l'os trépané; celui-là ayant été ôté en entier &

mesuré dans sa longueur; il se trouva avoir plus de sept pouces en longueur, & plus de deux pouces en circonférence. Le centre formoit un conduit tubulaire dans lequel la moelle de l'os avoit été précédemment renfermée. C'étoit une exfoliation parfaitement séparée de la surface de toute la cavité médullaire de l'os, mais improprement appelée exfoliation, puisque l'épaisseur de l'os à travers lequel il avoit été porté au-dehors, étoit celle d'un scelling. Il avoit plus de substance dans quelques endroits que dans d'autres, & il étoit ouvert de distance en distance de manière à former un tuyau complet. Mais ce qui peut-être mérite le plus d'attention, c'est que cet os qui étoit libre, quoiqu'il eût resté plusieurs années flottant dans la matière que contenoit l'autre os, & matière qui s'étoit frayé une issue en perçant à l'extérieur la surface de l'humérus; cependant cette partie exfoliée n'étoit nullement altérée ni frappée de carie comme l'autre os l'étoit; mais à tous égards elle étoit si saine, qu'on avoit lieu d'attendre que la partie postérieure de l'os de l'humérus le seroit aussi; mais il en fut autrement.

Après avoir ôté la partie exfoliée, toute la surface interne de l'os fut trouvée d'une substance semblable à un cartilage; cet os étoit à découvert dans certains endroits, & couvert de chair dans d'autres. La chair étoit fongueuse à l'extrémité

Année 1746.
Vol. XLIV.

inférieure de l'os qui étoit carié; elle étoit plus ferme vers la partie supérieure, & calleuse dans la partie moyenne qui avoit dégénéré en une substance cartilagineuse.

Après l'exfoliation, tout l'os étant à découvert, on trouva dans la partie inférieure un sinus qui conduisoit dans l'articulation du coude, & il y avoit une carie; & dans la partie supérieure où l'os paroissoit maintenant sain, mais où il avoit été précédemment affecté, il y avoit différens trous remplis de chair & recouverts du muscle deltoïde.

A cette époque la surface de la plaie étoit très-étendue & l'écoulement étoit trop considérable pour ne point épuiser le malade. Les fonctions de l'estomac s'étoient soutenues jusqu'alors; mais elles commencèrent alors à s'altérer; la fièvre hectique se déclara avec une diarrhée colliquative, & on se détermina à l'amputation du bras; elle fut faite près de l'articulation de l'omoplate où l'os étoit sain; le malade ne survécut pas long-tems, car la diarrhée prenant de l'accroissement, il mourut quatre jours après l'opération.

OBSERVATION DEUXIÈME.

M. JOHNSON, âgé d'environ vingt-six ans, s'étoit plaint depuis plus d'un an d'un gonflement dans l'os humérus du bras droit, & il s'étoit formé

ensuite différens abcès dans ces parties. Il ne pouvoit assigner d'autre cause à ce gonflement qu'une impression du froid après un exercice violent qui avoit consisté à jeter des pierres à une grande distance; car bientôt après il fut attaqué de la fièvre, & son bras s'enfla depuis le cou jusqu'à l'extrémité de ses doigts; le mal s'étoit ensuite fixé vers le milieu de l'os humérus où il s'étoit fait différentes ouvertures fistuleuses, & il s'étoit écoulé une grande quantité de matière au moyen d'une incision qu'on lui avoit faite à Nottingham. Le même chirurgien avoit pratiqué une ouverture à la partie postérieure où il s'étoit formé un autre dépôt, & l'os avoit été aussi mis à découvert dans cet endroit; les deux plaies avoient été pansées en attendant l'exfoliation; mais ces plaies se recouvrant aussi souvent qu'elles étoient cicatrisées, & se formant des dépôts dans d'autres endroits, à mesure que le gonflement de l'os augmentoit, le malade se détermina à se rendre à Londres pour se faire soigner.

Il y avoit à cette époque cinq ou six ouvertures fistuleuses qui conduisoient jusqu'à l'os & qui donnoient issue à une matière sanieuse sur les côtés du tendon du muscle deltoïde, & à la partie postérieure du bras où l'os étoit principalement devenu volumineux, quoiqu'il eut d'ailleurs beaucoup augmenté en volume dans toute son

Année 1746.
Vol. XLIV.

étendue jusqu'au coude. Je ne pus point reconnaître l'état de l'os avec ma sonde, mais reconnoissant qu'il étoit carié, & que c'étoit un *spina ventosa*, je proposai pour la cure de tenir l'os découvert dans toute sa partie antérieure, & le malade y donna son consentement.

Je trouvai que la carie qui avoit attaqué l'os *humérus*, en avoit détruit la substance à la longueur de quatre pouces, & qu'il s'y étoit formé une exostose ou expansion calleuse, excepté dans quelques endroits où la matière s'échappant de la cavité médullaire y avoit maintenu une ouverture.

Je suivis dans cette maladie le même traitement que dans l'exemple précédent; je commençai par faire une incision à l'os à la partie extérieure du bras, d'environ six pouces de long sur un pouce de large, depuis l'insertion du muscle deltoïde & un peu à côté, & alors détruisant avec la pierre infernale toutes les chairs qui s'étendoient sur l'exostose ou l'expansion calleuse, ou autour, je parvins jusqu'à l'os, & l'ayant ratissé le lendemain, l'ouverture fistuleuse qui conduisoit dans la cavité médullaire se présenta alors à ma vue, & la sonde y pénétrant bien avant, je procédai à l'opération du trepan sur cet os. Le lendemain j'appliquai l'instrument au-dessus & au-dessous de l'ouverture que j'avois déjà pratiquée, & en emportant les angles qui étoient entre ces ouvertures avec un

instrument dont les graveurs font usage, je fis ainsi une grande ouverture dans la cavité médullaire de l'os, & c'est alors que je découvris que la carie s'étendoit à quatre pouces dans sa substance; j'ôtai les fragmens & les sequestres enfermés dans la cavité médullaire, & j'employai les moyens propres à arrêter les progrès du mal & à faire régénérer la partie de l'os affecté de carie.

Mais ma tâche étoit encore loin d'être remplie, puisque par l'extraction des sequestres il se manifesta un fungus qui végeoit de la circonférence de la cavité médullaire au-dessus & au-dessous de la partie de l'os sur laquelle j'avois opéré, aussi bien que de l'expansion calleuse qui s'étendoit à sa surface extérieure, ce qui occasionnoit un trop grand écoulement de matière sanieuse pour que le malade put le supporter. Comme l'ouverture que j'avois pratiquée n'étoit pas encore suffisante pour donner issue à toute la matière qui y étoit déposée, non plus qu'une ouverture fistuleuse qui répondoit à la partie interne de l'os vers l'aisselle, je fus encore obligé d'augmenter l'ouverture de la cavité médullaire, & je facilitai ainsi l'écoulement de toutes ses cavités; & je n'eus alors qu'à combattre l'écoulement qui devint de jour en jour moindre, en consumant le fungus avec une solution de pierre infernale. M. Singleton, chirurgien, ayant été consulté sur ce cas, le 18^e

Année 1746.
Vol. XLIV.

jour après la première opération; pensoit que l'amputation pouvoit à peine être pratiquée, puisque le sinus qui pénéroit dans la cavité médullaire s'étendoit jusqu'à l'extrémité de l'os; il fut donc d'avis qu'il étoit plus prudent d'insister sur la méthode de traitement qui avoit été adoptée. Nous n'étions encore parvenus qu'en partie à nous rendre maîtres du fungus qui étoit continuellement à végéter à travers la cavité sinieuse de la partie supérieure de l'os, où la moelle étoit entièrement détruite; il en étoit de même du fungus qui croissoit au-dehors de l'os de l'expansion calleuse dont l'os carié étoit recouvert. Mais ces excroissances furent si efficacement domptées par des applications répétées du cautère actuel, que dans moins de deux mois toute la partie de l'os cariée fut détruite.

Toute cette perte de l'os, dans une étendue d'environ quatre pouces, fut bientôt réparée par la matière qui s'écouloit de la circonférence de l'expansion calleuse, ce qui affermit tellement le bras du malade, qu'il fut en état de mettre & d'ôter ses bas. Cette cure pénible dura près de six mois, & maintenant le malade peut aussi bien se servir de son bras qu'il le faisoit précédemment. Ce membre n'est ni défiguré ni raccourci, à cela près que vers l'endroit de l'ancienne plaie, il est plus épais que dans l'état naturel; mais cela

même sert à le fortifier & à suppléer au défaut qui se trouve dans la partie antérieure du bras où il y a un creux considérable.

Année 1746.
Vol. XLIV.

Je ferai ici un petit nombre de remarques en faveur des jeunes chirurgiens, & je décrirai la figure de quelques os que m'a fait voir M. Hawkins, chirurgien du prince de Galles.

1°. Il est très-probable qu'un phlegmon dans la moelle, lors de la solution critique d'une fièvre, a été la cause primitive du *spina ventosa* dans les deux cas que j'ai rapportés, & que si l'os avoit été mis à nu, & l'ouverture qu'on y avoit pratiquée fort augmentée aussi-tôt que la matière s'étoit frayé une issue à travers les tégumens, le progrès du mal auroit été prévenu, & la cure dans ce dernier cas auroit été beaucoup plus facile.

2°. Une grande ouverture est toujours plus avantageuse qu'une plus petite, en donnant une issue plus libre à la matière; c'est-là un objet que le chirurgien ne doit point perdre de vue, lorsque la maladie attaque le centre des os longs.

3°. Dans le *spina ventosa* qui attaque les os vers leur centre, l'application du trépan, pour en ôter une portion considérable, est nécessaire pour ôter les exfoliations qui se détachent de la cavité intérieure de l'os dans la première période de la maladie; ces séquestres ont été cachés dans les deux cas précédens; & dans plusieurs autres on

Année 1746.
Vol. XLIV.

peut les peser & les soupçonner par l'induration de la matière calleuse qui est à la surface de l'os, comme le démontrent des pièces conservées dans des cabinets d'anatomie.

4°. Dans le *spina ventosa* qui se forme au centre des os longs, si quelqu'une des articulations perd son mouvement par une expansion calleuse qui soude les deux os qui sont en contact ; la seule ressource qui reste alors est l'amputation du membre ; car plus on la diffère, plus la fièvre hectique qui attaque le malade fait des progrès ; il survient des sueurs colliquatives, une diarrhée & tous les autres symptômes qui dénotent un reflux de la matière dans la masse du sang, & alors l'opération ne laisse que peu d'espoir de succès. Le *spina ventosa* qui affecte les extrémités des os longs seulement, & qui dans les cas d'écroûelles, paroît seulement aux os du carpe & du tarse, lorsque l'écoulement n'est pas considérable, il faut recourir à des méthodes moins violentes.

5°. Dans la période du *spina ventosa* où l'os est carnisé, avec formation d'un fungus & d'une matière calleuse qui s'étend au-dessus de l'os carié changé en chair, aussi bien que sur l'os carié lui-même dégénéré, on ne peut point attendre de guérison que par l'amputation de l'os dégénéré, puisque ce n'est que de cette manière qu'on peut appliquer le cautère actuel sur lequel porte

principalement la cure, comme je l'ai vu arriver à un homme dont le ponce étoit devenu un vrai lambeau de chair.

Année 1746.
Vol. XLIV.

Note du rédacteur. M. Amyand a donné la gravure de quelques os qui avoient été affectés du *spina ventosa*; mais comme il n'est pas rare d'en trouver de semblables exemples dans les cabinets anatomiques, nous nous bornerons à en rendre un compte peu détaillé, & nous nous dispenserons d'en faire représenter la figure.

Un de ces os est l'humérus du côté sur lequel, durant la vie du sujet, on avoit fait l'opération avec le trépan exfoliatif. La carie de l'os étoit compliquée d'une ankylose ou d'une carie des têtes du cubitus & du radius dans l'articulation du coude; le séquestre étoit resté dans l'os jusqu'à l'époque de l'opération. Il faut observer que durant la vie de l'individu, la substance de l'os avoit été rendue si molle qu'elle cédoit au contact, & que l'os ne conservoit sa position en ligne droite que par une sorte d'exostose qui l'incrustoit depuis une extrémité jusqu'à l'autre, & qui sans doute devoit donner un grand volume au bras. Il s'étoit formé une exfoliation tubuleuse de toute la circonférence de la cavité médullaire de sept pouces de long & de presque deux pouces de circonférence; cette exfoliation étoit séquestrée & séparée

Année 1746.
Vol. XLIV.

du reste de l'os, & fut extraite en entier par la grande ouverture qui y fut pratiquée.

Il paroît par conséquent que dans ce cas l'inflammation, la suppuration & l'ulcère qui avoient eu d'abord lieu dans la moelle allongée, avoit consumé toute la substance médullaire de l'os, & qu'aussi-tôt après, il s'étoit fait une certaine altération qui avoit abouti à l'exfoliation précédente. La matière ayant acquis une plus grande acrimonie, avoit amolli, dissous & presque détruit la substance osseuse, tandis que l'autre os qui n'avoit point participé par son isolement à la circulation des suc viciés, étoit resté sans altération dans l'intérieur de l'autre, quoique flottant longtems dans la matière épanchée dans la cavité. On ne peut donc attendre une guérison du *spina ventosa* qu'en faisant aussi-tôt qu'il est possible une grande ouverture dans la cavité de l'os.

L'auteur a aussi représenté par une autre figure la surface antérieure du tibia gauche d'une jeune personne affectée du *spina ventosa*; on voit à travers une ouverture de quatre pouces de long l'exfoliation qui s'est formée dans son intérieur. La carie du tibia à la jointure du genou s'étoit communiquée avec l'os du fémur avec lequel il s'étoit formé une ankylose. Il est inutile de parler d'une quatrième & cinquième figures par lesquelles l'auteur a représenté la surface antérieure & in-

terne du tibia gauche & l'os humérus, tous deux
attaqués du *spina ventosa*, puisque ces parties ne
présentent rien de particulier.

Année 1746.
Vol. XLIV.

Rhazes paroît être le premier auteur qui ait
parlé du *spina ventosa*; maladie qui, suivant lui,
consiste dans une corrosion & une corruption de
l'os avec tumeur & une douleur punitive. Marc-
Aurele Severin lui avoit donné le nom de *Padar-
throcace*, c'est-à-dire, maladie des articulations
de la jeunesse (*abscessus corruptorius seu spha-
celismus ossis*). Un autre auteur estimable (Pétrus
de Marchettis) remarque que cette maladie peut
attaquer les hommes & les femmes jusqu'à l'âge
de vingt-cinq ans, suivant ses propres observations,
mais qu'après cette époque on en est exempt, à
moins que ce soit un retour de la maladie qui se
soit antérieurement déclarée.

Ce qui a fait distinguer cette sorte de carie de
toute autre qui peut provenir d'une cause externe,
c'est qu'elle doit sa naissance à un vice interne,
& dont le siège est la substance médullaire de
l'os; ce vice se répand peu-à-peu dans toute la
substance de l'os, & y produit les symptômes qui
sont si bien décrits dans les deux observations
précédentes. On peut pressentir la nature de ce
mal avant qu'il soit entièrement développé, par
une douleur profonde, opiniâtre & très-vive qui
semble être fixée dans l'intérieur de l'os affecté,

Année 1746.
Vol. XLIV.

sur-tout si le malade éprouve d'autres symptômes de mal vénérien, de scorbut ou de rachitis. Les deux cas précédens sont dus à d'autres causes occasionnelles qui ont produit le même effet. On peut voir dans le premier volume des commentaires de Vanswieten sur les aphorismes de Boerhaave, la méthode de traitement qu'il propose dans la première période de la maladie. Quant aux deux autres périodes, on peut se faire une juste idée des moyens qu'il faut employer par l'historique des deux observations qui viennent d'être rapportées ci-dessus.

ARTICLE II.

Lettre de M. Georges Martin à M. Grame, sur l'opération de la bronchoromie; telle qu'on la pratique à l'hôpital Saint-André.

Après 1750.
N°. 416.

Je suis appelé pour donner des secours à une jeune demoiselle, qui étant assez bien portante pour rendre visite à une de ses voisines, fut tout-à-coup attaquée d'un violent mal de gorge; en l'examinant de près je vis que les amygdales &c d'autres parties qui s'offroient à ma vue étoient seulement dans un plus grand état de sécheresse qu'à l'ordinaire, mais sans aucune tumeur exté-

rière aux environs du larynx, & sans aucun autre symptôme febrile; la malade éprouvoit seulement une douleur extrême avec une grande difficulté de respirer & une impossibilité d'avaler aucune nourriture, soit solide, soit liquide. Tous les alimens revenoient par la bouche & le nez, quand elle faisoit effort de déglutition. Je reconnus là une esquinance de l'espèce la plus redoutable, *sine apparente tumore*, (*Hipp. prog. XXIII. & pronost. coâ. III, 96*) & le siège de cette affection étoit dans le larynx & dans les fibres qui lui sont communes, ainsi qu'au sommet de l'arrière-bouche. Malgré les saignées, les vésicatoires entre les épaules, les ventouses, &c., la maladie se soutenoit avec la même violence & la personne étoit prête à suffoquer. Je proposai le lendemain la bronchotomie à laquelle ses parens se refusèrent d'abord, mais ils y consentirent l'après-midi, & la jeune personne se prêta à toutes sortes de moyens propres à lui conserver la vie; elle eut en effet raison; car il est probable que sans cela elle auroit été étranglée dans peu d'heures, *constante mente, integrisque sensibus*, comme le dit l'élégant Fernel. Cette opération fut faite avec tant de succès, que dans moins de quatre jours la respiration devint parfaitement libre, & la déglutition si bien rétablie, que nous ôtâmes la cannule & nous laissâmes la glotte remplir ses fonctions.

Année 1710.
N°. 416.

Année 1730,
Nº. 416.

Suivant Cœlius Aurelianus (*acut.* III, 4) & l'auteur du *liber introductorius* (*cap.* 13) attribué à Galien , la bronchotomie a été proposée par Asclepiade; elle est décrite & fortement recommandée par la plupart des écrivains systématiques de chirurgie , depuis Paul d'Egine , (*de re medicâ* , VI, 33) & comme il le dit lui-même depuis Antyllus & quelques autres chirurgiens les plus distingués jusqu'à nos jours; mais quand je vois tant d'empressement de leur part à la justifier & tant d'affectation à citer des exemples de blessures accidentelles de la trachée-artère , sans parler des procédés de l'opération , même de la bronchotomie , je suis porté à croire qu'elle a été rarement réduite en pratique. Les exemples en sont si rares qu'Arétée , auteur doué d'un jugement si sain & d'une si grande habileté dans le traitement des maladies (*cur. âcut.* 77) croit que cette opération n'a jamais été faite avec succès. Cœlius Aurelianus la regarde comme une fiction impraticable d'Asclepiade. Avenzoar & Albucasis ne connoissoient aucun de leurs compatriotes qui l'eut mise en pratique , & on sait que les Arabes ont été assez hardis en chirurgie. Avenzoar a fait seulement l'expérience sur une chèvre , & il a guéri la blessure , ce qui fait voir l'industrie & le génie de l'auteur. Ce qu'en dit Rhazes est plein d'obscurité; & quant au célèbre Fabrice,

ab

ab aquapendente, il avoue avec candeur qu'aucun de ses contemporains n'avoit osé faire cette opération. Son successeur en chirurgie & son rival en anatomie, Julius Casserius de Plaifance (*de voc. org.* 20,) ne prétend point l'avoir faite, quoiqu'il rende sensible le procédé opératoire par des figures insérées dans son ouvrage, d'après ce qu'il avoit vu sur le cadavre.

Année 1730.
N°. 416.

M. Aurelius Severinus (*chirurg. eff.* II, 40) qui a été un auteur très-savant & très-judicieux, & en même tems le chirurgien le plus habile & le plus hardi de son tems, la recommande avec chaleur, quoiqu'il ne l'ait jamais pratiquée même dans les derniers tems de sa vie, faute d'occasion, de sorte que le premier exemple authentique qu'on puisse citer de cette opération est celui d'*Ant. Musa Brasavolus* (*comment. in Hipp. de diat. acutis* IV, 35)* qui la pratique dans un cas d'équifnancie désespérée, pendant que le chirurgien ordinaire refusoit d'y recourir, & il la répéta encore dans un cas semblable. M. Arnaud, chirurgien françois, eut aussi occasion de la faire, mais le malade en mourut. Un autre françois, M. Binard, eut un meilleur succès comme le rapporte Gareugeot. Le docteur Freind (*histo. de la méd.*) cite Purman comme l'ayant pratiquée, & il dit que dans un autre cas elle fut pratiquée par un chirurgien qu'il ne nomme

Tome II. Chirurgie.

Y

Année 1730.
N^o. 416.

point. Excepté ceux-là je crois qu'on ne peut rapporter que peu d'exemples d'une semblable opération pratiquée sur le vivant. J'ai appris seulement que M. Baster & M. Oliphant, tous deux chirurgiens anglois, l'ont pratiquée depuis peu d'années avec le succès le plus marqué.

Quant au procédé opératoire on auroit dû certainement suppléer à ce qui a été omis par les auteurs. Il est bon d'abord de remarquer que dans l'incision, avant même d'ouvrir la trachée-artère & d'introduire la canule, le malade éprouve quelque soulagement, ce qui doit être attribué à l'épanchement du sang durant l'opération. A ce sujet, *fabrice ab aquapendente & julius Gualtavinus*, (voyez Marc-Aurele Severin, pag. 103) ont fait une supposition qui a été confirmée par l'expérience. L'écoulement est encore plus considérable durant la période de la suppuration. Je pense que par-là la circulation dans les muscles du larynx est moins forte qu'à l'ordinaire, & qu'elle contribue probablement à diminuer la force de la voix, car celle-ci reste beaucoup plus foible pendant quelques jours. C'est à cette cause aussi bien qu'au régime rigoureux & affoiblissant du malade qu'on doit rapporter la diminution, & non à une atteinte portée aux nerfs récurrents qui sont situés trop profondément, pour qu'on put les couper aussi facilement qu'on l'a anciennement supposé.

En faisant cette opération sur une personne vivante, il faut remarquer d'abord que la canule ne doit pas être aussi courte qu'on le propose ordinairement dans les ouvrages & les leçons de chirurgie; car on trouve qu'en incisant ces parties, sur-tout la glande thyroïde (à laquelle on n'a point fait assez d'attention dans les descriptions ordinaires qu'on a faites de cette opération) elles se tuméfient tellement qu'il faut une canule d'environ un pouce de longueur pour pénétrer assez dans la trachée-artère, ce qui est le double de la longueur indiquée par Garengot, l'un des auteurs les plus récents, & qui a fait le tableau de la chirurgie françoise. La canule de plomb que nous avons préparée ne répondant point à nos vues, celle dont nous faisons usage étant trop longue & trop petite, puisque c'est la canule ordinaire dont on se sert en partie pour la ponction dans l'hydropisie, elle a été un peu aplatie à son extrémité, & on l'empêche au moyen d'une compresse épaisse, percée dans son milieu, de pénétrer trop profondément dans la trachée.

Les particules muqueuses & le fluide en vapeurs qui sort par l'orifice de la canule, épaississent ou bouchent sa cavité, ce qui gêne la respiration du malade, de manière qu'il est souvent nécessaire d'ôter cette canule & de la nettoyer. Et lorsque par conséquent quelques modernes recommandent

Y ij

Année 1730.
N^o. 416.

Année 1730.
N°. 416.

expressément de mettre un morceau mince d'éponge ou de coton sur l'orifice de la canule, pour empêcher l'entrée de la poussière, du duvet ou de tout autre objet semblable dans les poumons, ils confirment ce qui a été dit ci-dessus sur l'insuétude de cette opération, & sur la manière de traiter cet objet, *in abstracto*, comme disent les métaphysiciens, sans considérer qu'ils n'ont point à faire avec un air sec & subtil, mais avec un fluide hétérogène qui est rendu humide & épais par des particules visqueuses qui sont propres à former des concrétions épaisses; & par conséquent, quoiqu'on doive reconnoître qu'il y auroit bien moins de danger de boucher ce passage, si notre canule avoit été plus courte & plus ample, sur-tout à son orifice, je crois que c'est une vue ingénieuse qu'on a proposée lorsqu'on a recommandé de faire la canule double ou d'en établir une à l'intérieur de l'autre, afin que celle du dedans pût être ôtée avec facilité & nettoyée, quand il est nécessaire, sans incommoder le malade.

Le malade a été aussi-tôt réabli. Il respire, parle, mange, boit & fait toutes les autres fonctions de la vie. Que signifient donc toutes les peines que semblent se donner les auteurs pour faire opérer la guérison de la blessure, par un bandage, une suture, &c. J'ai obtenu dans peu de jours la cicatrice, en pansant seulement chaque

jour ou avec une tente diminuée à chaque pansement & enduite avec le liniment d'Arceus. Je pense que la guérison auroit été moins prompte si la personne avoit été plus avancée en âge.

Année 1730.
N°. 416.

Dans le rapport que j'ai fait, j'ai ômis les choses qui étoient les plus communes ou les moins importantes, & je ne me suis arrêté qu'à quelques circonstances remarquables de cette opération. Je n'aurois rien dit sur le moyen de sauver la vie d'un danger imminent, si je n'avois pas remarqué que cette opération avoit été décrite plutôt par des vues théoriques & d'après l'imagination, que suivant l'expérience.

ARTICLE III.

*Extrait d'une lettre de M. Antoine Benevoli ;
chirurgien de Florence, au docteur Valsalva.*

L'AUTEUR de cette lettre dit au docteur Valsalva que le 13 Juillet 1720 il avoit opéré un soldat Allemand de la cataracte dont ses deux yeux étoient affectés, & que ce soldat avoit recouvré la vue immédiatement après l'opération, & qu'il avoit continué d'en jouir jusqu'à sa mort, qui arriva vingt mois après à la suite d'une maladie aiguë. M. Benevoli retira les deux yeux des

Année 1720.
N°. 379.

Année 1712.
N.º 373.

orbites de ce cadavre pour examiner si ces cataractes dont ce soldat avoit été opéré consistoient dans une pellicule membraneuse comme quelques écrivains le prétendent, ou si, comme d'autres le pensent, elles consistoient dans l'opacité du cristallin. Procédant immédiatement après à la dissection de l'œil gauche, d'après un examen attentif & très-exact de toutes les parties qu'il contenoit, il n'y trouva point de pellicule au-dedans, mais il découvrit un petit corps jaunâtre au fond du bulbe de l'œil, d'une forme lenticulaire, sans adhésion à aucune autre partie de l'œil; en en faisant l'extraction, il parut que c'étoit l'humeur cristalline qui étoit devenue opaque & moindre en volume que dans l'état naturel, ayant deux ou trois dents ou impressions faites dans sa circonférence, ce qui étoit l'effet de l'aiguille durant le procédé opératoire.

Le lendemain il examina l'œil droit de la même manière en présence de médecins distingués & d'autres personnes qu'il avoit invitées à cette démonstration, & il trouva que le cristallin étoit aussi devenu opaque & déprimé de la même manière que le premier, & qu'il portoit évidemment des impressions de l'aiguille, mais il ne trouva point de pellicule dans l'œil quelque exacte recherche qu'il put faire. M. Benevoli rapporte aussi qu'ayant fait précédemment quelques expé-

riences sur des yeux de quelques cadavres à Boulogne, en présence de M. Valsava, il avoit introduit l'aiguille dans l'œil au même endroit & de la même manière qu'on le pratique ordinairement dans cette opération, & ayant après cela disséqué les mêmes yeux, il avoit toujours trouvé que l'aiguille avoit passé dans l'œil par derrière l'humeur cristalline, de sorte qu'il avoit été impossible de conduire l'aiguille de-là dans cette partie de l'humeur aqueuse qui est placée entre l'uvée & l'humeur cristalline, pour y déprimer une pellicule située dans cet endroit, suivant l'opinion commune, à moins que de passer l'aiguille à travers le corps du cristallin.

L'auteur cité observe aussi que l'espace susdit situé entre l'uvée & l'humeur cristalline est si étroit que, quoiqu'il ne regarde pas comme impossible d'introduire une aiguille dans cet espace, cependant il n'y a point assez de place pour tourner l'aiguille en haut, en bas, dans toutes les directions, avec la liberté ordinaire dans l'opération de la cataracte, sans blesser l'uvée ou le cristallin.

Enfin M. Benevoli observe que dans sa méthode de pratiquer la cataracte depuis plusieurs années, au point d'opérer douze ou quatorze personnes dans l'année, il avoit travaillé sur une substance dure & résistante, qui étant légèrement touchée par l'aiguille, pouvoit balancer en arrière

Année 1722.
N°. 373.

& en devant, & pouvoit revenir contre l'aiguille avec un certain choc sensible, ce qui ne s'accorde nullement avec l'idée ordinaire d'une catacte qui consiste dans une pellicule ou une substance membraneuse.

ARTICLE IV.

Tumeur extraordinaire venue au genou d'une personne dont la jambe fut amputée ; par M. Pierce, chirurgien de Buth. (Planch. I.).

Année 1739.
Vol. XLII.

G. HEDGES, fils d'un fermier & âgé de vingt-cinq ans, d'une habitude de corps robuste & musculeuse, n'avoit jamais éprouvé aucune espèce de maladie ; mais depuis huit ans il avoit observé pour la première fois une petite tumeur à la jambe droite près de l'épiphyse supérieure du tibia. Il ne se rappeloit point d'avoir éprouvé aucune contusion dans cette partie qui n'étoit nullement douloureuse ; il n'y fit attention qu'à raison de son accroissement continuel qui étoit très-lent pendant les deux premières années ; mais après cela il fut si rapide, quoique sans douleur, que le jeune homme devint incapable de travailler depuis le tems de la moisson de l'année 1735.

Après avoir amputé la jambe, je la pesai &

Je trouvai qu'elle pesoit 69 livres; ce qui étoit 27 livres de plus que la jambe qui fut amputée à l'hôpital de Saint-Barthelemi quelques années auparavant pour la même maladie. L'opération elle-même ne présenta rien de remarquable, excepté la quantité de sang qui sembloit proportionnée à l'augmentation de volume de la partie.

Année 1739.
Vol. XII.

En examinant cette tumeur surprenante on reconnut que les muscles adjacens étoient destitués de leur partie fibreuse ou charnue, sans doute par la grande compression & l'extension qu'ils avoient éprouvées, & la cessation de leurs fonctions sur le tarle & les orteils; mais la membrane *fascia* & les autres membranes des muscles étant très-épaisses & calleuses adhéroient à la tumeur sub-jacente, & en ôtant cette couverture calleuse, la tumeur parut parsemée d'une grande quantité de vaisseaux sanguins très-distendus & d'une couleur rouge plus vive qu'ils ne le sont dans leur état naturel.

La tumeur elle-même étoit cartilagineuse à la profondeur d'un demi-pouce de sa surface extérieure; de-là elle formoit un nombre infini de substances osseuses de diverses formes & de différente consistance, & qui devenant de plus en plus nombreuses à mesure qu'elles étoient situées plus profondément, finissoient par constituer une substance continue complètement ossifiée. Dans

Année 1739.
Vol. LXI.

le centre de cette substance osseuse, on trouva une liqueur mucilagineuse qui n'étoit nullement fétide, quoique ce fut dix jours après l'opération qu'on l'examina. Sa couleur & sa consistance ressembloient à-peu-près à celles des huiles siccarives. On y observa plusieurs petites substances osseuses qui s'y trouvoient comme flottantes, & elles étoient parfaitement semblables à plusieurs autres qui étoient adhérentes à la surface interne de la cavité; elles avoient presque toutes l'apparence de ces incrustations irrégulières qui ont lieu quelquefois dans les creux des rochers, par des eaux putrifiantes. Après l'opération la cure fut aussi heureuse qu'on put le désirer, & le moignon est à présent guéri.

Il faut observer que les parties au-dessus de la tumeur, ont été très-peu altérées de leur état naturel. L'extrémité cartilagineuse du fémur étoit parfaitement polie, & la rotule n'avoit éprouvé d'autre atteinte que l'ossification du ligament par lequel elle est fixée au tibia. Mais l'extrémité supérieure du péroné étoit presque entièrement perdue dans la tumeur.

On doit admirer la bonne constitution du malade qui a été en état de supporter une extension aussi énorme des régumens, l'état tendineux du *fascia* & même l'os, sans douleur ni inflammation. On doit aussi s'étonner que ces fluides

ayent été si peu disposés à la putréfaction, puisque leurs mouvemens ont resté si longtems rallentis sans vicier la constitution, ou même sans changer la couleur des parties affectées. On peut voir deux figures (planch. 1 ,) qui représentent ce cas étonnant; la première représente la jambe immédiatement après l'opération; la seconde montre la partie après qu'elle a été ouverte; dans les deux l'artiste a été assez heureux pour représenter avec exactitude les dimensions, soit dans les couleurs, soit dans la forme extérieure.

Année 1759.
Vol. XLI.

A R T I C L E V.

*Observations de chirurgie sur la production du calus ;
par M. Sherman, chirurgien à Kelvedon.*

Un homme en tombant du haut d'un arbre se fractura l'os fémur en deux endroits à la distance de deux pouces & demi; toute cette partie de l'os intermédiaire aux deux fractures se détacha, & malgré un calus aussi étendu qui fut nécessaire pour réunir les extrémités fracturées, la cuisse ne fut pas raccourcie d'un quart de pouce de son état naturel. Le chirurgien qui fut chargé de son traitement prit tous les soins possibles pour conserver la cuisse dans un état d'extension pendant toute la cure; mais il attribue la production d'un

Année 1759.
Vol. XL.

Année 1739.
Vol. XL.

calus si considérable à la grande quantité d'ostéocole qu'il lui fit prendre.

Nous avons cru devoir rapporter cette observation, plutôt comme un exemple de crédulité extrême que comme un moyen à imiter. Comment en effet pourroit-on croire qu'une terre calcaire inerte telle que celle de l'ostéocole, prise, comme le dit M. Sherman, en électuaire, en poudre dans le lait & dans les alimens, ait pu contribuer à la génération du calus, & ne fait-on point que c'est à la nature même qu'on doit l'élaboration du suc osseux qui est nécessaire pour la reproduction des parties des os qui se détachent, & qu'il suffit seulement que les malades prennent de bons alimens. D'ailleurs la chimie moderne a appris que les os étoient loin d'être une terre calcaire & de la nature de la stalaélite comme l'osteocolle, qu'au contraire c'étoit un phosphate calcaire; si donc l'auteur de l'observation précédente avoit voulu donner quelque vraisemblance à son opinion, il auroit dû prescrire la terre de l'ostéocole réunie avec l'acide phosphorique; mais maintenant qu'on a acquis des connoissances plus justes & plus étendues dans l'économie animale, on se repose entièrement pour la reproduction du calus sur les soins de la nature en se contentant de fournir au malade une nourriture de bonne qualité.

Nous ne rapporterons point ici une observation de même nature qui est jointe à la précédente, & dans laquelle l'auteur croit avoir aussi contribué par la prescription de l'ostéocole à la reproduction d'une partie de l'os maxillaire inférieur. On est maintenant trop éclairé pour embrasser de semblables opinions, & il suffit de faire remarquer combien, dans une collection immense, telle que celle des Transactions Philosophiques, il faut mettre du choix, ou même passer sous silence tout ce qui ne peut s'accorder avec des lumières postérieurement acquises.

Le même chirurgien a mis à la suite des deux faits précédens une autre observation qui mérite plus d'être connue.

Un homme vint le trouver pour le consulter sur un ulcère sinueux qui étoit dans le rectum, à deux pouces de distance de l'anus; il y avoit près d'un an qu'il avoit cette incommodité qui avoit été prise pour des hémorroïdes & traitée en conséquence par des remèdes externes & internes. M. Sherman aperçut une tumeur au-dehors de la fesse à près de trois pouces de l'anus, & cette tumeur étant venue à suppuration il y pratiqua une incision; après avoir pansé la plaie plusieurs semaines sans espoir de succès, il découvrit au fonds de l'ulcère un os qui, ayant été extrait, fut reconnu pour l'os maxillaire inférieur d'un

Année 17394
Vol. XL

Année 1739.
Vol. XL.

poisson. Il paroît que le malade avoit avalé cet os l'année précédente, parce que la douleur vive qu'il avoit éprouvée, lorsque la pointe de l'os s'arrêta dans le rectum, fut un des symptômes qui fit soupçonner à faux l'existence des hémorroïdes; cet os s'étant ensuite frayé un passage par le rectum & étant parvenu dans les parties charnues, il s'ensuivit un abcès, & l'os ayant été extrait, l'ulcère se cicatrisa ensuite par les méthodes ordinaires.

ARTICLE V I.

Blessure faite à la cornée de l'œil droit, heureusement guérie par M. Baker, chirurgien de l'hôpital Saint-Thomas.

Année 1739.
Vol. XLI.

UNE fille de quinze ans reçut une blessure à la pupille avec la pointe d'une fourche ordinaire. L'œil devint très-enflammé & très-douloureux; les humeurs y paroissoient dans un état de confusion & la vue étoit trouble. M. Baker fit saigner la personne au bras & lui fit tirer dix onces de sang. Il fit ensuite faire des lotions avec un collyre des *thoracisci albi rhazis* & de l'eau ordinaire, au degré de la chaleur du sang; le pansement fut fait avec un cataplasme de lait & de pain blanc & un

peu de safran. Le lendemain il parut, au lieu de la blessure de la cornée, une escarre épaisse. M. Baker continua son traitement pendant douze jours, & alors l'escarre tomba. Il lui fit prendre durant tout ce tems un purgatif ordinaire de trois en trois jours, à mesure que les forces purent en permettre l'usage. L'inflammation & la douleur se calmèrent par degrés; la vue resta perdue jusqu'à la chute de l'escarre, & après cela la personne se plaignit de voir les objets doubles. Ce vice se corrigea peu-à-peu; & la vue, sans devenir aussi distincte qu'elle l'étoit auparavant, reprit ses fonctions; il paroissoit seulement comme un nuage au-devant des objets que la personne regardoit.

Année 1719
Vol. XL.

Je lui fis six visites de trois en trois jours après l'époque dont je viens de parler, & quand je cessai de la voir, le nuage dont elle se plaignoit étoit presque totalement dissipé. Son œil paroissoit beau & clair, & suivant le rapport de la personne il exerçoit ses fonctions avec autant de force & de netteté qu'à l'ordinaire. Il y avoit une petite tache formée par la cicatrice de la blessure qui restoit dans la cornée, ce qui me détermina à ouvrir un cautère au bras, & à lui prescrire de le tenir ouvert sans appliquer aucun topique sur l'œil. Il y a déjà plus de deux ans que la tache s'est dissipée par degrés, & elle est maintenant si petite qu'elle est à peine sensible. La vue est aussi parfaite qu'elle l'étoit auparavant.

ARTICLE VII.

Fièvre maligne contractée en faisant l'opération de la paracentèse sur le cadavre d'une personne morte d'hydropisie ; par M. Cox , chirurgien de Péterbouroug.

Année 1739.
Vol. XLI.

UNE femme hydropique depuis un an, & sur laquelle on avoit pratiqué plusieurs fois l'opération de la paracentèse, succomba à sa maladie ; ses amis demandèrent au chirurgien d'évacuer l'eau contenue dans l'abdomen pour préserver plus long-tems le corps de la putréfaction, & pour épargner au convoi funéraire une odeur désagréable & nuisible. Quoique M. Cox procédât à cette opération peu d'heures après la mort, cependant le fluide renfermé étoit parvenu à un tel degré de putréfaction, que les parois abdominales avoient acquis une couleur d'un vert livide. Le liquide évacué étoit même un peu vert & un peu plus épais que le lait ; je n'avois jamais senti une odeur aussi fétide ; mais les circonstances suivantes vont faire juger quel étoit son degré de malignité.

« La nuit qui succéda à cette opération, j'éprouvai,
» dit M. Cox, beaucoup d'agitation & d'inquié-
» tude, & le lendemain je sentis de petits trem-
» blemens

» blemens & une lassitude extraordinaire; trois
» jours après il s'éleva sur mes mains & mes
» doigts plusieurs pustules, sur tous les endroits,
» je pense, où il étoit tombé quelque goutte de
» fluide pendant l'opération. Le pouce de la main
» droite & le doigt du milieu de l'autre furent
» plus cruellement affectés que toute autre partie,
» la douleur étant plus vive, l'enflure plus con-
» sidérable & la couleur de la peau d'un rouge
» foncé. Ce fut le sixième jour de mon indis-
» position que les douleurs devinrent continuelles
» dans ces parties, malgré les suppuratifs les plus
» forts dont je fis usage. Etant persuadé par la
» grande pulsation & le sentiment de pesanteur
» que j'éprouvois, que la matière étoit logée
» au-dessous ou au-dessus du périoste, je fis pra-
» tiquer une incision jusqu'à l'os, ce qui ne fit
» écouler que deux ou trois gouttes de matière.
» J'avois cru que ce petit écoulement appaiseroit
» jusqu'à un certain degré la douleur, mais ce fut
» le contraire. Un soir cette douleur locale, dont
» je me plaignois, se changea en des convulsions
» universelles, & une oppression si grande des
» forces vitales, que j'étois menacé immédiatement
» de la mort ».

« Le médecin qui dirigea alors mon traitement
» me donna des cordiaux pour aider la nature à
» résister à la malignité de la maladie, & pour

Année 1719.
Vol. XLI.

» tâcher d'amener les plaies à une suppuration de
 » bonne qualité. Il me donna d'abord les alexi-
 » pharmiques les plus décidés; vers le huitième
 » jour de ma maladie, les convulsions continuant,
 » & le pouls étant inégal & très-déprimé, &
 » comme d'ailleurs il y avoit un peu d'apparence
 » de matière, les vésicatoires furent appliqués
 » aussi près des parties qu'il fut possible pour faire
 » une révulsion au-dehors & attirer la matière
 » morbifique dans les plaies. Dans trois jours on
 » parvint à cet objet; les convulsions commen-
 » cèrent à s'abattre & les plaies à suppurer; dans
 » quatre jours de plus, les symptômes cessèrent,
 » excepté un abattement général & un sentiment
 » de défaillance qui continuèrent encore quelques
 » jours après, comme c'est l'ordinaire dans les
 » fièvres malignes ».

Il paroît que j'avois reçu la contagion autant par inspiration que par contact; car quelques-uns de ceux qui avoient assisté à l'opération, & qui s'étoient trouvés seulement dans la chambre sans toucher aucune goutte de liqueur, se trouvèrent très-affectés & éprouvèrent après cela des éruptions rouges & livides; ce qui prouve que non-seulement la liqueur elle-même, mais encore les émanations qui s'en élevèrent étoient parvenues au plus haut degré de subtilité & de malignité.

ARTICLE VIII.

*Tumeur extraordinaire à la cuisse & sa description ;
par M. J. Chandler, membre de la société royale.*

UNE pauvre femme de la paroisse de Saint-James, qui avoit beaucoup d'embonpoint, dont la fibre étoit très-relâchée, & qui étoit très-livrée à la boisson des liqueurs spiritueuses, éprouvoit en conséquence, depuis plusieurs années, des douleurs rhumatismales qui tenoient quelques-uns de ses doigts dans un état habituel de contraction ; elle étoit sujette aussi à des affections nerveuses de la tête, à des vertiges & autres symptômes. Quoiqu'elle se fût plainte précédemment de ce qu'on appelle *procentia uteri*, cependant on n'y reconnoissoit aucun symptôme scrophuleux que ce qu'elle avoit remarqué vers l'âge de trente ans, aussi-tôt après un accouchement, c'est-à-dire une petite tumeur dure sur le muscle biceps & à la partie postérieure, inférieure & latérale, externe de la cuisse, un peu au-dessus du jarret, sans pouvoir en assigner la cause. L'accroissement de cette tumeur avoit été d'abord lent, mais il avoit été ensuite plus rapide, à mesure qu'elle datoit de plus loin, & enfin elle étoit parvenue à un tel volume qu'elle

Année 1739.
Vol. XII.

Z ij

Année 1799.
Vol. XLI.

avoit près d'un pied de circonférence; elle avoit une forme sphéroïdale allongée, & sa base qui étoit d'un tissu plus relâché n'avoit que la moitié de la circonférence de la tumeur qui étoit par conséquent pendante & qui ressembloit à la tête d'un enfant avec son cou.

Depuis que cette tumeur s'étoit manifestée jusqu'au moment de son amputation, il s'étoit écoulé plus de trente ans. La malade y avoit éprouvé des douleurs excessives, & enfin son volume & sa pesanteur y avoient intercepté jusqu'à un certain degré la faculté de se nourrir, de sorte qu'on remarquoit à la partie inférieure un ulcère très-putride & très-sinueux qui duroit depuis près de six mois.

Cette excroissance étoit de la couleur naturelle de la peau, & étoit pour la plus grande partie un amas de graisse; le centre & la base étoit un atherome, mais qui étoit plus squirreux qu'à l'ordinaire. Quoiqu'elle fût devenue si grosse, elle n'étoit point contenue dans un kyste manifeste, mais elle avoit de grandes circonvolutions de graisse qui étoient adhérentes aux régumens ordinaires, comme on le remarque après l'excision.

Mon dessein dans ce cas avoit été de faire une extirpation totale de cette excroissance; mais comme elle avoit de gros vaisseaux, & qu'elle étoit placée entre les tendons des muscles, je fus d'avis, suivant

les préceptes de Turner, d'en venir à des escarotiques répétés pour consumer, autant qu'il seroit possible, la glande & le reste de la substance de la tumeur, & pour pénétrer aussi profondément que la prudence pourroit le permettre, imaginant qu'après cela quelque déscicatif puissant pourroit produire une cicatrice & détruire les restes de la tumeur sans causer aucun inconvénient.

Année 1739.
Vol. XL.

La tumeur avoit été examinée par la plupart des médecins & des chirurgiens des environs, quelques-uns d'une habileté & d'un savoir distingués, qui sembloient approuver l'opération. C'est pourquoi le 5 Juillet 1735 je fis une ligature à la base de la tumeur, avec un nœud coulant que je serrois graduellement une ou deux fois par jour, autant que la malade pouvoit le supporter, sans éprouver des symptômes dangereux; je continuai ainsi jusqu'au 17 du même mois; mais à cette époque il se déclara de violentes convulsions, une fièvre lente, des syncopes & une perte des fonctions des sens qui continuèrent tout le jour & la nuit suivante. Depuis ces accidens je m'abstins de serrer la tumeur, je prescrivis des cordiaux, des gouttes volatiles, un clystère purgatif & une potion parégorique pour la nuit; ce qui produisit un si bon effet que le jour suivant la malade revint à elle-même. La ligature commença à produire une séparation dans le cou de cette excroissance, & le 20 du même mois, en

Année 1719.
Vol. XLI.

présence d'un seul chirurgien, j'extirpai toute la tumeur sans produire une grande hémorragie.

Quoique la plaie offrit d'abord un mauvais aspect, cependant par des pansemens convenables & l'usage des digestifs les plus marqués, des détergifs & autres topiques, la suppuration fut d'une bonne qualité, l'ulcère se détergea, la cicatrice se forma par degrés, & la guérison fut parfaite le 21 Septembre, sans qu'il restât aucune dureté ni le moindre inconvénient qui fût capable de gêner sa marche ou l'incommoder de toute autre manière.

ARTICLE IX.

Cure remarquable d'une blessure de la tête compliquée d'une grande fracture & d'une dépression du crâne, avec perte d'une partie de la dure-mère & du cerveau; par M. J. Cagua, chirurgien. (Voyez la planche II).

Année 1719.
Vol. XLI.

J. Darton, près de Plymouth, me fit appeler le 11 Juin 1729, pour voir son fils âgé de dix ans qui étoit tombé du sommet d'un vieux mur où il avoit été prendre un nid d'oiseaux; la hauteur de sa chute étoit de vingt pieds, & à mon arrivée je le trouvai dans un état comateux, privé de l'usage

de la parole avec une face pâle & blême, une perte considérable de sang par le nez & les oreilles, une grande hémorragie & un vomissement. En l'examinant je remarquai une blessure très-étendue, longue & profonde, & une contusion qui s'étendait depuis la paupière jusques sur tout le côté gauche de la tête. Après l'avoir rasé je fus surpris de sentir au doigt plusieurs esquilles raboteuses du crâne confusément déprimées à travers la dure-mère & la pie-mère dans la substance du cerveau; comme les extrémités de ces fragmens osseux se montraient au-dessus de la dure-mère, je fis l'extraction de cinq d'entr'eux, tels qu'ils sont représentés dans la planche II, suivant leur volume & leur figure. J'ôtai aussi plusieurs autres petits fragmens.

J'ôtai la dernière esquille qui étoit une partie de la voûte de l'orbite, & qui contenoit une partie de la base de l'os frontal, jointe par une suture transversale à la partie supérieure de l'os de la pommette, avec une portion de ladite suture & l'extrémité supérieure du sphénoïde, presque jusqu'à l'extrémité inférieure de la suture coronale & écailleuse. Cette esquille étoit pour la plus grande partie déprimée sous la partie supérieure de la dépression de l'os frontal. En faisant cette extraction je fis sortir aussi deux petits lambeaux de la substance du cerveau, avec du sang caillé; l'un

Année 1739.
Vol. XLI.

deux avoit le volume d'un gros haricot, & l'autre celui d'un gros pois. Le malade étant tombé en défaillance & faisant après cela des efforts violens de vomissement, il rendit une grande partie de ce qui étoit contenu dans son estomac, avec un mélange de bile & de matière sanguinolente. La dure-mère étoit très-contuse, déchirée & mise à découvert dans la longueur de trois pouces & un quart, & avoit un pouce & demi ou un pouce en largeur. A la partie supérieure de la fracture il y avoit une dépression de l'os frontal qui s'étendoit jusqu'à la suture sagittale près de la suture coronale. Une partie du crâne avoit glissé sur l'autre, & j'emportai cette partie le quatrième jour de la chute; elle avoit un pouce de long, & elle me causa beaucoup de peine, pour pouvoir l'enlever avec mon élévateur, parce que la partie du crâne qui étoit au-dessous étoit mince & foible. La portion de l'os déprimé se terminoit par une longue fissure à un pouce au-delà de la suture coronale dans le pariétal.

Le péricrâne étoit si contus & si déchiré, qu'il commença à se gangrener dès le lendemain; ce qui m'obligea de laisser tout ce côté du coronal & la plus grande partie du bregma ou os pariétal à découvert, & depuis la partie supérieure de la tête jusqu'au dessous de l'oreille, comme on peut le voir dans la figure de la planche II. La dure-mère & la pie-mère étoient très-

livides & insensibles au toucher, excepté les parties où le cerveau avoit été blessé. Dans les pansemens, le mouvement & la pulsation de cerveau étoient très-marqués & porrés quelquefois à un tel degré que la substance du cerveau s'élevoit beaucoup au-dessus du niveau du crâne; ce qui m'obligea dans ces cas de le réprimer pendant deux ou trois minutes avec mes doigts, & un linge étendu & épais, plongé auparavant dans une lotion détergente chaude que j'introduisois entre la dure-mère & la fracture.

La paupière supérieure abcéda dans une semaine, & forma une tumeur aussi grosse qu'un œuf de poule; après y avoir pratiqué une incision je laissai longrems la plaie ouverte, parce qu'il y avoit un écoulement considérable de matière, qui étoit d'abord très-fétide, & qui après cela devint d'une bonne qualité. La partie du cerveau qui avoit été blessée rendit aussi une matière purulente à travers la fracture qui étoit au-dessus de l'orbite. Dans environ quinze jours j'obtins une suppuration de bonne qualité de toute la blessure, & tous ces symptômes ayant cessé, la dure-mère commença à se régénérer, en prenant une couleur d'un beau rouge; les parties livides & déchirées se détachèrent, & les extrémités de la fracture commencèrent à offrir les progrès de l'ossification de l'intérieur du diploë & des deux tables du

Année 1719.
Vol. XII

Année 1719.
Vol. XII.

crâne, comme de petites excroissances, ou des points charnus qui, dans un mois, s'étendirent sur toute la fracture, & autant que je pus l'observer ils devinrent plutôt durs aux extrémités de la fracture qu'au centre.

Les mouvemens & les pulsations du cerveau continuèrent encore, & étoient très-sensibles longtemps après; on les éprouva même quelque tems après la guérison de la blessure, sur-tout à la partie inférieure du coronal & du pariétal, au-dessus de la partie inférieure de la suture coronale près de l'écailluse: excepté trois ou quatre jours le blessé conserva le sentiment; mais durant les six premières semaines il se plaignoit souvent d'une violente douleur de tête, accompagnée d'un état comateux & de fièvre; mais ces symptômes se dissipèrent en lui donnant un clystère émollient & laxatif, & un léger purgatif. Le 6 Octobre suivant, avant que la plaie fut guérie, il fut attaqué d'une petite vérole confluente, dont il se rétablit cependant, malgré la violence de ses symptômes & le délire qui se déclara au commencement. Le 11 Novembre suivant la plaie fut parfaitement guérie, mais vers la fin il s'exfolia plusieurs lames de la partie supérieure du coronal. Depuis cette époque, il est fort & bien portant, (année 1736) & il sert avec beaucoup d'activité & d'intelligence à bord d'un vaisseau marchand.

TABLE II.

Année 17394
Vol. XLI.

Cette figure représente la tête du jeune homme, avec sa blessure, & une partie du crâne à découvert.

TABLE III.

Cette table représente le crâne avec les fractures & différentes esquilles qu'on en avoit ôtées.

A... Est la partie externe de l'esquille adjacente à la partie supérieure de l'os de la pommette, & la partie supérieure de l'orbite suivant son volume & sa figure.

1. Est la protubérance épaisse de la base & de la partie inférieure de l'os frontal brisée, & séparée de l'extrémité supérieure de l'os de la pommette dans sa suture transversale.

2. Est la partie inférieure du même os frontal séparée de la partie de l'os sphénoïde.

3. Est la partie de la suture transverse.

4. Est le diploë & son épaisseur qui est très-rude & irrégulière.

B. représente la partie interne & concave avec l'épaisseur de la même esquille.

1. Est la concavité de la partie supérieure de l'orbite.

2. Représente sa partie supérieure & son diploë.

Année 1739.
Vol. XLI.

3. La partie inférieure & interne séparée de l'os sphénoïde ; le milieu est une cavité profonde.

4, 4. Un bord rude qui naît de sa cavité.

5. La partie interne & concave.

6 & 7. Représentent les tables externe & interne.

8, 8. Partie de la suture transverse.

C... Est une partie de la base de l'os frontal & du pariétal, avec un peu de la partie inférieure de la suture coronale ; elle est très-mince au milieu où est la suture ; on a représenté sa grosseur & sa figure.

D, D. D. Les autres esquilles sont représentées avec leur grandeur convenable & leur figure.

E. Représente l'esquille qui avoit glissé au-dessus de la dépression du crâne & qui a été sciée..

ARTICLE X.

Remèdes & moyens chirurgicaux employés par les sauvages de la Virginie ; par M. Clayton.

Année 1739.
Vol. XLI.

LES fonctions de médecin sont unies avec celles de prêtre parmi les sauvages de la Virginie, & ils donnent le nom de *Wiochist* à celui qui les exerce. Il suit par eux du plus haut degré d'honneur & d'estime après leur roi, ou plutôt leur premier chef dans les expéditions de guerre. La nature

est leur grand apothicaire, puisque chaque médecin, suivant son habileté, se pourvoit de feuilles, de fruits, de racines ou d'écorce des arbres; il en tire quelquefois un suc & quelquefois il les réduit en poudre pour en faire ensuite une décoction.

Année 17394
Vol. XLII.

Quoiqu'une personne, suivant son degré d'habileté, puisse s'ériger en docteur, cependant c'est en général leur prêtre qui est éminemment décoré de cette qualité & qui doit être consulté dans les grandes circonstances. Sa pratique est purement empirique, & il ne se mêle nullement de raisonner sur les causes des maladies. Voici de quelle manière il instruit ceux qui se destinent à l'art de guérir. On place dans les maisons appelées *Wiochisan*, c'est-à-dire leurs temples, certaines sortes de reliques comme des crânes humains, certains grains ou légumes & différentes plantes consacrées à leurs divinités. Les crânes rappellent la mémoire de leurs combats & de leurs conquêtes; les légumes sont offerts en actions de grâces pour leurs provisions, & les plantes servent à perpétuer le souvenir de quelque cure particulière à laquelle elles ont contribué; car lorsque quelqu'un est guéri, au moyen d'une plante, il en prend une partie & il en fait une offrande à la divinité. C'est ainsi qu'on conserve non seulement le souvenir de la plante & de ses vertus, mais encore que le prêtre

Année 1739.
Vol. XII.

en devient mieux instruit & plus habile dans l'art de guérir. Je ne saurois dire si le prêtre prend certaines personnes pour les instruire, ou s'il se borne à communiquer ses connoissances à ses enfans. Souvent quand ces sauvages sont à chasser dans les bois, qu'ils tombent malades ou qu'il se font par accident quelque blessure, ils sont obligés de faire usage des plantes qui sont sous leurs mains, & souvent ils ne craignent pas d'essayer même celles dont ils ne connoissent ni les vertus ni les qualités; c'est ainsi qu'en faisant des essais & des expériences, ils découvrent les vertus des plantes, & qu'employant des remèdes simples, ils ne se trompent point sur ceux qui ont produit d'heureux effets.

Ils sont en général très-réputés pour la guérison des blessures, & en effet ils possèdent une grande quantité de plantes vulnérables, comme une plante qu'ils appellent *indian-weed* qu'on peut rapporter peut-être au genre des *valetianes*, & qu'on dit avoir des feuilles semblables au platane. Ils usent aussi du *gnafalium americanum*, vulgairement appelé *plantain blanc*. Quant à notre *plaintain*, ou *heptaplevron* qu'ils appellent nourriture des Anglois, ils croient, suivant une tradition singulière, qu'il ne vient que sur le sol qui a été foulé par les pieds des Anglois, & qu'il n'étoit pas connu avant l'arrivée de ces étrangers en Amérique. Le plus fameux des anciens médecins parmi les Indiens *apomatiques*,

suivant le rapport d'un homme très-digne de foi ;
se servoit beaucoup d'une plante qu'il lui montra,
& dont la feuille étoit très-approchante de celle
du fanicle. Appliquée sur les plaies, elle paroît
très-utile & n'a que l'inconvénient de faire croître
trop promptement les chairs. Les grands succès
qu'on lui attribue pour la guérison des plaies &
d'autres maux paroît dépendre principalement de
la manière de les panser.

Ils nettoient d'abord ces plaies en les suçant , ce
qui , sans douleur, est le moyen le plus efficace & le
plus avantageux, à cela près qu'il est sale & dégoû-
tant; ils prennent alors des feuilles de persicaire
qu'ils mâchent dans leur bouche, & ils en injectent
le suc dans la plaie, ce qu'ils font avec autant
d'adresse qu'avec une seringue. Ils appliquent alors
les plantes, soit contuses, soit réduites en onguent
avec la graisse, & ils les lient avec de l'écorce ou
d'autres herbes. Le colonel Spencer qui a demeuré
en Virginie, m'a fait part d'une cure très-singulière
& très-extraordinaire faite par un Indien sur un de
ses nègres. Le nègre étoit excellent pour le se-
vice, & son maître mettoit un grand prix à sa
conservation; mais par degrés sa vue s'obscurcit,
& il éprouva des douleurs insupportables dans les
yeux, de sorte qu'il ne voyoit que très-peu d'un
œil & point du tout de l'autre. Comme la douleur
augmentoient encore, son maître craignoit beaucoup

Année 1791
Vol. XL,

Année 1739.
Vol. XLI.

qu'il ne perdît entièrement la vue. Il consulta divers chirurgiens qui tâchèrent en vain de le guérir. Un Indien étant venu dans la maison lui dit qu'il le guériroit au moins d'un œil, mais que pout l'autre la vue resteroit perdue sans ressoutce; il fut convenu que le colonel lui donneroit en reconnoissance deux quartes de rum. Le lendemain matin l'Indien ayant été chercher des plant:s dans les bois, revint environ à midi; il pita ces plantes en y mettant un peu d'eau, & les ayant exprimées il en tira du suc qu'il fit tomber goutte à goutte dans l'œil dont il avoit dit que la vue étoit perdue sans retour; il y appliqua les herbes & il les lia avec de l'écorce; mais le colonel fit porter des bandes de linges qui furent appliquées par-dessus. L'Indien dit alors qu'aussi-tôt après le coucher du soleil, le nègre tomberoit dans la phrénésie si le remède faisoit son effet, mais qu'il reviendroit à lui-même avant le matin. On donna donc des ordres rigoureux pour que le malade fût surveillé avec soin, & pour qu'on ne changeât rien à l'appareil, quelque chose qu'il pût arriver. Les ordres de l'Indien ayant été ponctuellement exécutés, ce qu'il avoit prédit sur la guérison du malade se vérifia. Vers les onze heures du lendemain matin l'appareil fut levé, & l'Indien ayant ordonné au nègre d'abaisser sa tête, celui-ci laissa tomber le cristallin & l'humeur aqueuse de l'œil dont

dont la vue devoit être perdue. L'Indien continua d'appliquer son appareil, & par degrés la douleur se calma entièrement & le nègre recouvra pleinement la vue de l'autre œil. On demanda en vain à l'Indien de faire connoître les plantes dont il s'étoit servi; il garda imperturbablement le secret.

Les maladies qui règnent parmi les Anglois d'origine qui habirent la Virginie, car je ne puis rien dire de celles des Indiens, sont des affections scorbutiques, des cachexies, des léthargies & des maladies de la saison qui sont des fièvres intermittentes, ou plutôt des fièvres continues avec des paroxismes de fièvres quotidiennes; leurs symptômes sont rarement graves. Ils sont sujets à des coliques sèches, & quand les tranchées du ventre ont cessé, la matière morbifique attaque leurs membres & s'y fixe en produisant une sorte de goutte qui les rend perclus. Ces affections attaquent d'une manière si cruelle la peau & les os que les jointures semblent disloquées & leurs mains extropiées. Il régna ces dernières années des maux de gorge qui sembloient contagieux & qui attaquoient des familles entières, en sorte que si on ne les prévenoit de bonne heure, elles dégénéroient en une humeur cancéreuse qui offroit toutes les apparences du mal vénérien. Les malades éprouvoient aussi des douleurs dans les membres, provenant de cette humeur erratique; ces douleurs sont très-vives

Année 1759.
Vol. XLI.

sur-tout la nuit, car la marche, lorsque le libre usage des membres la permet, dissipe entièrement ces douleurs. L'huile d'un poisson appelé *drum* est très-efficace pour guérir ces douleurs & rétablir l'usage des membres. J'ai vu une femme qui avoit entièrement perdu l'usage de ses jambes, & qui l'avoit recouvré en usant de ce remède; car ses pieds ayant été frottés avec cette huile, les douleurs se portèrent à la tête; cette partie du corps ayant été ointe à son tour, les douleurs redescendirent aux pieds; mais elles se dissipèrent lorsque les onctions furent pratiquées sur ces deux extrémités du corps. Ils sont aussi sujets à une sorte de maladie qu'on peut appeler la *lèpre des Grecs*, & on a lieu de présumer que cette maladie provient principalement de ce qu'ils se nourrissent de la chair fade & délicate du cochon.

Les Indiens ne consultent ni le poulx ni l'urine; & ils jugent de la maladie par le symptôme le plus remarquable; quelques-uns prétendent tirer leurs indications de l'aspect du malade, & on les regarde comme bons physiognomistes. Je n'ai point appris qu'ils pratiquent jamais la saignée. Ils purgent avec différentes sortes de racines des plantes qui croissent dans leurs contrées, & ils font vomir avec différentes herbes. Ils se font suer d'une manière téméraire & excessive, & souvent très-extraordinaire, car ils établissent leurs étuves toujours

près du bord des rivières; lorsqu'ils sont au plus haut point de sueur, ils se précipitent dans l'eau froide, ils s'y lavent & s'y baignent avec complaisance. Ils n'usent point de vésicatoires, mais ils employent à l'excès les ventouses, de même que les orientaux usent du *moxa*: les Virginiens se servent de la partie intérieure d'une excroissance ou exubérance du chêne. Lorsqu'ils veulent purger ils ont recours au *solanum bacciferum* qui est un fort purgatif & regardé par la plupart des auteurs comme un poison. Ils employent aussi pour cet objet deux espèces de tithymale, l'une *flore minimo herbaceo*, l'autre *flore albo*. La fleur de cette dernière est petite, mais grande en comparaison de l'autre; elles sont rampantes; les Indiens font sur-tout usage de la dernière espèce comme du plus excellent purgatif, quoiqu'il provoque quelquefois le vomissement. Ils usent aussi beaucoup, à titre de purgatif, de l'*apocinum* que Gerard appelle *vincetoxicum Americanum*.

Ils employent plusieurs plantes pour exciter le vomissement; une de ces plantes est une petite espèce de scille. Ils prennent aussi les feuilles d'un certain arbrisseau odoriférant qui croît dans les marécages, & que je regarde comme le *petit saffra*s; ils l'écrasent avec un peu d'eau, & en tirent un suc qu'ils boivent chaud. Un interprète Indien me le faisoit regarder comme un souverain

Année 1739.
Vol. XLI.

remède; c'est un des arbrisseaux les plus odoriférans que je connoisse; & une fois qu'on a senti son odeur on ne peut plus l'oublier, parce qu'elle a quelque chose de particulier.

Le reste de leur matière médicale consiste en plantes qui abondent dans leurs climats. J'en ai recueilli plus de trois cens espèces qui ne se trouvent point en Europe; je ne parlerai que de celles dont les vertus sont les plus remarquables. Je rappellerai d'abord l'arbre de sassafra dont la racine est si connue. L'arbre à gomme semble être une espèce de platane. Ses feuilles ont l'odeur de celles de citronnier; leur procédé consiste à battre l'arbre, à enlever l'écorce & à rarifier la matière gommeuse ou résineuse qui ressemble à la térébenthine, mais qui est plus astringente & plus desséchante. Ils employent aussi beaucoup les boutons du tulipier, arbre qui offre un très-bel aspect. Ils usent, contre les fièvres, d'un arbre (*forrel trée*) dont la feuille est ressemblante au laurier, & qui, pour la saveur, approche de *lujula*. Ils ont aussi un prunier dont ils réduisent le bois en charbon qu'ils pulvérisent ensuite, & qu'ils mêlent avec de la graisse pour en faire un onguent dont ils se frottent tout le corps; ils y joignent ensuite des fomentations pour guérir l'hydropisie, par-là ils ouvrent les pores à un tel degré que l'eau coule jusqu'aux jambes. Ils publient aussi des merveilles d'une sorte de dictame

qui n'est autre chose que le calament de montagne.

Je ferai maintenant mention d'une plante qui, quoiqu'inconnue encore, mérite qu'on s'y arrête, c'est ce qu'on appelle *Angélique en Virginie*; mais je crois que c'est *libanotis vera latifolia Dodonai*. Sa racine s'enfonce dans la terre quelquefois à trois pieds de profondeur; elle est très-tendre & se rompt aisément; elle ne fleurit guères ou ne porte des fruits qu'après cinq années. Sa feuille ressemble à notre *Angélique* sauvage; elle est très-bonne contre la constipation & les tranchées de colique, sur-tout lorsqu'elles viennent de l'impression du froid. Les Indiens toujours amoureux du merveilleux prétendent qu'on peut s'en servir à la chasse pour attirer près de soi les cerfs, en rompant cette racine de manière que son odeur parvienne à ces animaux, & qu'on peut par-là les tuer facilement. On trouve aussi en Virginie une autre racine d'une espèce d'hyacinthe, qui pousse une tige à deux pieds de haut; la couleur de cette racine est noire au-dehors & blanche au-dedans; elle est amère & je pense qu'elle a les mêmes vertus que la petite centaurée. J'ai aussi entendu parler d'une racine dont les Indiens se servent pour guérir les contusions; je crois que c'est la même racine qui a servi à opérer la guérison du nègre dont j'ai parlé ci-dessus; car elle paroît opérer de la même manière suivant le rap-

Année 1739
Vol. XLI.

A a iij

Année 1739.
Vol. XLI.

port des Indiens , puisque son application produit une phrénésie de quelques heures. On ne l'applique point sur les endroits où la peau est entamée ; mais les Indiens s'en servent de la manière suivante : ils mâchent un peu de cette racine dans leur bouche , & ils injectent sur la contusion le suc imprégné avec la salive , ensuite ils fomentent la partie avec leurs mains. Ils en donnent un peu à mâcher à la personne blessée qui doit avaler le suc , mais qui doit rejeter la substance solide de cette racine qui est ensuite appliquée sur la partie contuse. Si le rapport des cures opérées par ce moyen est vrai , on n'a point encore découvert un remède plus surprenant.

On prétend qu'ils ont l'art d'empoisonner leurs flèches ; mais je n'ai pu parvenir à vérifier ce point ; au contraire je crois qu'on doit s'en défier ; j'ai observé que dans ces pays , à cause de la mauvaise constitution du corps , la moindre égratignure est dangereuse , & que , quelque soin qu'on prenne pour l'empêcher , elle dégénère en un état ulcéreux désespéré. Comme les sauvages s'engagent dans de longues marches qui les exposent à beaucoup d'accidens , qui peuvent contribuer à altérer leur santé , lorsqu'une légère blessure dans une bataille est devenue mortelle , ils sont plutôt tentés d'attribuer la mort du malade à l'impression d'une arme empoisonnée qu'à leur défaut d'habileté.

Quant à leur morale ils sont simples & crédules, doués d'une certaine droiture, & étrangers à l'art de feindre & de dissimuler; mais quant à leurs passions brutales, ils sont fougueux & sensuels comme les bêtes brutes des champs. Ils sont toujours à manger ou à dormir, à moins qu'ils ne soient à la chasse. Toutes les fois qu'ils s'éveillent pendant la nuit, ils vont manger ou des grains préparés ou un morceau de venaison, enveloppé dans des feuilles d'arbres, & qu'ils ont fait cuire sous leurs cendres chaudes. Ils boivent de l'eau, excepté lorsqu'ils peuvent se procurer du rhum des Anglois; ils boivent toujours cette liqueur avec excès; mais ils ne s'en soucient pas beaucoup, à moins qu'ils en aient assez pour s'enivrer. Je leur ai entendu dire qu'ils s'étonnoient que les Anglois se procurassent du vin à si haut prix, tandis que le rhum est à bien meilleur marché, & qu'il enivre bien plus vite.

Ils usent du tabac qu'ils fument dans des courtes pipes fabriquées par eux-mêmes avec une excellente argile. Ils font aussi avec la même argile des pots de terre qui supportent le feu pour les usages domestiques. Ils n'ont point d'opium, quoiqu'on trouve chez eux des pavots qui ne sont point à mépriser. J'ai appris que dans les fièvres, & les cas d'insomnie, ils appliquent sur les tempes des malades des fleurs de *stramonium* qui produisent

A a iv

Année 1739
Vol. XL.

Année 1719.
Vol. XLI.

l'effet du *laudanum*. Leurs passe-tems sont la danse & quelques jeux qu'ils font avec de la paille. Leur exercice est la chasse qui consiste à tirer un fusil, ou à lancer un dard & une flèche; ils excellent dans cet art. Leurs femmes travaillent & cultivent les grains qui leur sont nécessaires; elles s'occupent aussi à faire des paniers & des nattes. Les sauvages aborigènes de la Virginie sont maintenant en petit nombre, quoiqu'ils vivent sous la protection des Anglois, & qu'on n'exerce point de violence contre eux. Ils disent qu'un de leurs fameux Wiachistes leur avoit prédit qu'il viendrait une race d'hommes barbus (car les Indiens n'ont point de barbe) qui envahiroient leurs contrées, & feroient éteindre la race des naturels du pays. Ils sont silencieux par leur nature & lents à parler; cependant leur manière de s'exprimer paroît véhémement & emphatique, & toujours accompagnée de fortes gesticulations. Ils sont en général bien proportionnés, & ils ont pour la plupart une taille plus avantageuse que les Anglois.

Note du rédacteur. Quelqu'empirique & quelque bornée que soit la pratique des sauvages de la Virginie, j'ai cru qu'il étoit à propos de la faire connoître, soit pour apprendre à connoître les premiers essais de l'esprit humain, lorsqu'il est encore dans un état d'enfance, soit même pour

Suggérer des vues nouvelles à des esprits accoutumés à marcher dans des routes battues. Il est facile de reconnoître dans la grossière simplicité de l'art de guérir employé par les sauvages, des méthodes qui, suivies avec soin, s'éloignent bien moins de la nature que beaucoup d'autres moyens compliqués qui ont eu une grande vogue parmi des nations éclairées. L'usage des Indiens, par exemple, de bien nettoyer les plaies avec des suc des plantes délayées dans la salive, & d'appliquer ensuite ces mêmes plantes contuses, est certainement bien préférable à cette prodigalité d'onguens & de corps gras dont les pharmacopées regorgent, & auxquels les praticiens peu éclairés & livrés à la routine ont si vainement recours.

Au reste les sauvages ont un instinct particulier pour découvrir les plantes qui peuvent leur être utiles, & tout le monde sait qu'on leur doit peut-être les plus efficaces qu'on emploie dans l'art de guérir. On peut consulter sur cet objet curieux une dissertation qui a pour titre : *specificæ Canadensium*, & qui a été insérée dans le quatrième volume des *amanitates academicae Linnæi*.

Année 1732
Vol. XII.



ARTICLE XI.

*Nouvelle méthode de traiter la fistule lacrymale ;
par M. W. Bliard, chirurgien & membre de
la société royale.*

Année 1785.
Vol. LXX.

ON fait que dans toutes les périodes de la fistule lacrymale, il existe un certain degré d'obstruction du conduit nasal, de sorte que la matière des larmes, en plus ou moins grande quantité, mêlée avec la sécrétion huileuse des glandes sébacées & le mucus de la surface interne du sac lacrymal, ne pouvant passer dans le nez, est chassée par les points lacrymaux à la surface de l'œil & en bas de la joue.

Les auteurs de chirurgie divisent cette maladie en diverses périodes ; la première & la plus simple, est celle de l'obstruction avec peu ou point d'inflammation. Les autres font ensuite, suivant le degré & les effets de l'inflammation, un état d'ulcération du sac & des tégumens, & quelquefois la carie des parties osseuses.

Quoique la maladie soit souvent l'effet d'un virus dans l'habitude du corps, cependant les chirurgiens reconnoissent que quelquefois la cause est très-simple, & on peut aisément le concevoir d'après

Analogie. Les portions membraneuses du conduit nasal & du sac lacrymal sont une continuation de la membrane piruitaire du nez. Cette membrane est extrêmement vasculaire ; elle fait la sécrétion d'une grande quantité de mucus à sa surface interne, & elle est douée d'un grand degré de sensibilité.

Année 1780,
Vol. LXX.

L'expérience démontre qu'il se produit quelquefois de grandes fluxions sur la membrane piruitaire, que la sécrétion du mucus est augmentée par l'application de divers stimulans, & qu'elle acquiert souvent une consistance ferme par la stagnation, l'absorption & l'évaporation des parties les plus fluides ; il paroît enfin que souvent cette membrane s'enflamme d'elle-même, & qu'elle devient plus épaisse.

Le conduit & le sac peuvent aussi être affectés par une suppression de la transpiration, & acquérir plus d'épaisseur par la turgescence des vaisseaux. La sécrétion du mucus peut être aussi considérablement augmentée, lorsque la membrane du conduit est épaissie ; les fluides dans le sac passent avec difficulté ; par la rétention, la chaleur & l'absorption, ils sont rendus plus visqueux, & la difficulté qui naît de l'accroissement d'épaisseur de la membrane est augmentée ensuite par l'épaississement des fluides.

Il y a sans doute des causes plus simples de l'obstruction du conduit nasal ; mais quelle qu'en

soit l'origine, lorsqu'elle n'est point accompagnée dans sa première période d'un changement morbifique des parties contiguës, on la considère comme le premier état de la fistule lacrymale ; c'est alors que les moyens de prévenir la nécessité d'une opération incommode & incertaine peuvent être employés avec une espérance de succès.

Les principaux de ces moyens sont :

1°. La compression que quelques praticiens expérimentés regardent comme peu judicieuse ;

2°. L'introduction d'un instrument dans la narine, en le portant en haut vers le conduit. C'est une opération très-douloureuse pour le malade & excessivement incommode pour l'opérateur ;

3°. L'introduction d'une sonde par les points lacrymaux dans le conduit, suivant la méthode de M. Anel. L'expérience a prouvé qu'on ne parvenoit point par-là au but indiqué ;

4°. L'injection d'un fluide avec une seringue par un des points lacrymaux, comme le propose M. Anel. Les chirurgiens expérimentés & judicieux conviennent que cette méthode est quelquefois utile.

En réfléchissant sur cette dernière méthode, j'ai été porté à penser que si un fluide qui a un grand degré de gravité spécifique, comme le mercure pouvoit passer par un des points, de manière à remplir le sac & le conduit, & à comprimer les

parties obstruées, on pourroit, avec vraisemblance, faite cesser l'obstruction dans la première période de la maladie, ou que du moins ce seroit un moyen plus avantageux pour produire cet effet, que l'injection d'un fluide aqueux poussé à travers le point lacrymal dans une direction peu favorable. En outre ce ne seroit point un obstacle pour avoir recours aux moyens généraux qui peuvent convenir.

Année 1780.
Vol. LXX.

Me flattant moi-même que cette opinion étoit conforme à la raison, & convaincu qu'on pouvoit tenter cette expérience en toute sûreté, j'avois résolu d'en faire l'essai à la première occasion. C'est ce qui arriva en effet bientôt après.

M. Sellier, dans la rue de Mark-lane, éprouvoit depuis environ six mois un écoulement des larmes & du mucus sur la joue, & la matière dérhoit des points lacrymaux des paupières de l'œil droit. Il y avoit un certain degré de gonflement & de distension du sac qui étoit accompagné de douleur. En comprimant le sac on faisoit sortir par les points lacrymaux un fluide visqueux & d'une couleur blanchâtre. L'écoulement étoit très-abondant le soir, & alors il éprouvoit un obscurcissement de la vue de ce côté.

Tous les moyens employés par le chirurgien ordinaire avoient été inutiles; il approuva celui que je lui proposai, & le malade se détermina à en faire l'essai.

Année 1780.
Vol. LXX.

MM. Naimé & Bluxat me firent un instrument pour cet objet. Il consiste en un tuyau d'acier, délié & un peu recourbé; ce tuyau s'adapte à un tube de verre qui a environ six pouces de longueur; au sommet de ce tube est un entonnoir de bois, & au fond est une valvule qui peut être élevée avec un fil de soie qui passe à travers un trou dans le fond de l'entonnoir & qui pend aux côtés du tube (1).

On fait passer le tuyau d'acier dans le point lacrymal inférieur sans douleur & sans difficulté. On verse alors le mercure dans l'entonnoir, & on tire le fil de la valvule. Lorsque le mercure regorge par le point supérieur, on retire l'instrument. Le mercure porté dans le sac & le conduit, sans exciter de la douleur, y reste environ trente heures, & par son poids il tombe dans le nez & le malade en retrouve une partie dans son mouchoir.

Je pense qu'il faut s'abstenir alors de comprimer le sac, de crainte de faire sortir le mercure par les points lacrymaux & d'empêcher ainsi sa manière d'agir.

On répète l'opération le troisième jour, lorsqu'en

(1) J'ai décrit cet instrument tel que je l'ai employé; mais j'ai pensé ensuite qu'il seroit plus simple & aussi bon pour l'usage, sans y mettre une valvule, puisqu'il suffit de faire verser le mercure par un aide.

comprimant un peu le sac, il est passé un peu de mercure dans le nez, & avec ce minéral un peu de mucus blanchâtre qui a pris une forme concrète. Une petite quantité de mercure, en faisant la compression, revient par les points lacrymaux.

Année 1784
Vol. LXX.

En répétant ce procédé trois ou quatre fois, sans aucune compression, à peu de jours d'intervalle, le mercure passe aisément dans le nez.

J'ai une fois introduit l'extrémité d'un tuyau d'acier ordinaire dont on se sert pour l'injection des vaisseaux lymphatiques. Je l'ai joint avec un ciment à un tube de verre de dix-huit pouces de long. Ce tuyau n'est pas aussi délié que celui de l'autre instrument; cependant il a été facilement introduit dans le point lacrymal avec peu ou point de douleur. Pour augmenter la force d'impulsion, j'élevai la colonne du mercure à environ onze pouces, & alors il s'écoula dans le nez avec un degré considérable de vitesse.

Depuis que le mercure a passé dans le nez, il s'est écoulé moins de fluide sur la joue qu'auparavant. Après la seconde ou troisième opération l'enflure & la distension du sac se sont entièrement affaïssées; le malade n'éprouve plus d'écoulement du mucus, & la matière des larmes s'échappe rarement au-dehors. Les parties paroissent avoir recouvert leur état primitif de santé.

Pour fixer les effets des médicamens dans les

Année 1780.
Vol. LXX.

maladies qui tiennent à la constitution, il est nécessaire de répéter les expériences dans diverses circonstances. Mais quant aux objets qui peuvent être déterminés par un procédé mécanique, l'effet, autant que nous pouvons nous en assurer par les sens, est en général manifeste & susceptible d'explications.

Dans le cas ci-dessus il est manifeste qu'antérieurement à l'injection du mercure, les larmes, la matière sébacée & le mucus ne passaient point à travers le conduit nasal, ou que ce n'étoit que dans une très-petite proportion relativement à la sécrétion qui s'en faisoit; il est clair aussi qu'après la première expérience le mercure ne passoit pas, mais qu'enfin le mercure, les larmes, &c., n'ont plus éprouvé d'obstacle.

Cette opération est simple, d'une exécution facile, ne produit que peu de douleur & n'est accompagnée d'aucun danger.



ARTICLE XII.

Calculs sur le nombre des accidens ou des morts qui surviennent à la suite de l'accouchement, & de la proportion des enfans mâles à ceux de l'autre sexe, aussi bien que des jumeaux, des productions monstrueuses & des fœtus nés morts. (Ces rapports sur les accouchemens ont été pris des registres du dispensaire général de Westminster); on y joint un essai pour déterminer les chances de la vie dans différentes périodes, depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 26 ans, & la proportion des originaires au reste des habitans de Londres; par M. Robert Bland, accoucheur.

Le grand avantage des hôpitaux, & d'autres institutions semblables pour perfectionner & répandre les connoissances relatives à l'art de guérir sont généralement connues; mais on peut les rendre encore utiles sous d'autres points de vue qui, quoique subordonnés au premier, n'en méritent pas moins attention, puisqu'ils peuvent jeter quelque lumière, & peut-être déterminer définitivement certaines questions politiques sur lesquelles l'opinion a beaucoup varié. Ainsi il est connu que

Année 1781.
Vol. LXXI.

Année 1781.
Vol. LXXI.

Londres contient des habitans originaires de différens pays, & que ceux qui y ont pris naissance sont en petit nombre; cependant la proportion de ces derniers comparés aux autres, peut-être facilement augurée à présent, & la question peut être résolue avec une exactitude suffisante, si dans le registre des noms des personnes qui participent à différentes œuvres de charité, on a soin de faire indiquer les lieux de leur naissance. En outre la grande mortalité de l'espèce humaine, particulièrement dans l'enfance, & le peu de chances qu'a un enfant d'atteindre l'âge de maturité, ont été calculées sur des registres de paroisse, sur des relevés de mortalité, &c. Mais je ne sache point qu'on ait essayé de le fixer en renant une note du nombre des enfans qu'une multitude de femmes, prises indistinctement, ont mis au monde, & du nombre de ceux qu'elles ont été en état de conserver.

C'est cependant ce que je fais ici, & c'est d'après ces principes que j'ai tâché de former une table qui montre les chances de la vie à différentes périodes. Je suis loin de prétendre que par cette méthode on puisse obtenir une intelligence claire & certaine; mais dans un objet d'une aussi grande importance, je présume que tous les efforts doivent être favorablement reçus. Le docteur Smellie a rapporté succinctement pour l'encouragement de ses élèves la petite proportion des accouchemens non

naturels & laborieux aux naturels; mais il ne porte pas plus loin ses vues, & il n'indique point le nombre proportionné des accidens qui s'ensuivent; ce qui peut retarder ou prévenir le rétablissement d'une femme, quoique cet objet ne mérite pas moins d'être connu que tout autre; c'est sous ce rapport & sous d'autres points de vue utiles qu'on a tenu un registre des circonstances les plus remarquables sur les malades admises dans le département des accouchemens du dispensaire général de Westminster, depuis sa première institution en 1774, jusqu'à l'époque présente. On y a tenu compte,

- 1°. De l'âge de différentes femmes;
- 2°. Du nombre des enfans qu'elles ont mis au monde;
- 3°. Du sexe de ces enfans;
- 4°. Du nombre des enfans qu'elles ont été en état de conserver;
- 5°. Des villes ou des campagnes où leurs maris sont nés.

Et après l'accouchement j'ai eu soin de noter constamment,

- 1°. Les accidens concomitans ou les conséquences de l'accouchement;
- 2°. Les sexes des enfans venus au monde;
- 3°. Le nombre des jumeaux ou d'autres produits d'accouchemens multipares;

B b ij

Année 1781.
Vol. LXXI.

Année 1781.
Vol. LXXI.

4°. Le nombre d'enfans qui étoient nés avec quelque difformité ou monstruosité;

5°. Le nombre des enfans venus morts au monde, & comme on avoit prescrit aux femmes de faire écrire aussitôt qu'elles seroient revenues chez elles, je m'étois proposé d'y ajouter la proportion des enfans morts les quatre ou cinq premières semaines; mais plusieurs de ces femmes négligeant cette attention, ont empêché que mon information fût aussi complète que je l'aurois désiré. Cependant celles qui ont rempli ce devoir ou sur lesquelles j'ai reçu des renseignemens sûrs m'ont fourni des lumières qui doivent être ici exposées.

C'est sur le registre ci-dessus mentionné que les tables suivantes & les calculs ont été dressés; & même que le plus grand soin & la plus grande exactitude ont été employés pour fixer toutes les circonstances diverses qui peuvent influer sur les faits; on a été aussi ponctuel pour recueillir ces derniers & pour les coordonner entr'eux; & pour éviter, autant qu'il est possible, toute erreur, les tables de chaque année ont été d'abord composées & comparées entr'elles; mais n'y trouvant point de variation remarquable, je n'ai pas cru nécessaire de les produire sous cette forme. Ma première intention avoit été de donner des tables simples & sans aucune observation explicative; mais trou-

vant que je ne pouvois pas introduire toutes les circonstances que j'avois notées dans mon registre, comme je l'avois fait particulièrement dans ma première table, & voyant que dans quelques endroits on ne pouvoit pas les comprendre parfaitement sans quelque explication, comme par exemple dans la table des chances de la vie à différentes périodes, j'ai tâché d'ajouter quelques remarques que j'ai cru propres à éclaircir cet objet.

Comme mon premier dessein avoit été de trouver la proportion des accouchemens laborieux & de quelques accidens ou des morts qui surviennent en conséquence de l'accouchement, je vais commencer par la table suivante :

Sur 1897 femmes qui ont accouché sous la direction du dispensaire, il y en a eu 63, c'est-à-dire 1 sur 30 qui ont eu des accouchemens contre nature; & parmi ce nombre il y en a eu 18, c'est-à-dire 1 sur 105, dont les fœtus se sont présentés par les pieds; il y en a eu 36, c'est-à-dire 1 sur 52, dont les fœtus ont présenté les fesses au passage; dans huit cas, le fœtus a présenté les bras, & dans un cas le cordon ombilical. Il faut remarquer que dans ces deux derniers cas qui font le nombre de 9, & qui, par rapport au nombre total des femmes accouchées, forment la proportion d'un sur 120, on a été obligé de tourner le fœtus.

Année 1781.
Vol. LXXI.

Sur le nombre des accouchées ci-dessus, il y en a eu 17, c'est-à-dire 1 sur 111 qui ont eu des accouchemens laborieux. Dans ces cas on en (1) compte 8, c'est-à-dire dans la proportion d'un sur 236, dans lesquels il a été nécessaire de comprimer la tête de l'enfant. Dans quatre cas il n'a été nécessaire de faire usage que d'une des branches du forceps, & à l'égard des autres cinq, le visage de l'enfant étoit tourné vers le pubis, & l'accouchement s'est enfin terminé par les douleurs naturelles. Une de ces femmes a eu des convulsions vers le septième mois de sa grossesse, & a accouché un mois après d'un enfant mort, & elle s'est rétablie. Une autre femme a eu des convulsions durant le travail; elle a mis au monde un enfant vivant & s'est rétablie.

En revenant toujours au nombre total des accouchées, il y en a eu 9 (c'est-à-dire une sur 210)

(1) Deux de ces femmes ont ensuite accouché de fœtus sains & d'un juste volume; une troisième a mis au monde un enfant foible & très-petit, qui est mort deux ou trois jours après. Une quatrième a mis au monde un fœtus de sept mois qui, sans avoir été mutilé, est mort au passage. Le nombre des femmes qui, par conséquent par un vice de conformation, ne peuvent mettre au monde des enfans vivans est très-peu considérable. Je n'ai rien à dire sur les quatre autres cas sur lesquels je n'ai point eu des informations nécessaires.

qui ont été attaquées d'hémorragies utérines avant ou durant l'enfantement. Dans ces neuf cas on n'a sauvé qu'un enfant. Parmi ces neuf, une est morte sans être délivrée, une est morte peu d'heures après l'accouchement & une autre dix jours après; six par conséquent ont échappé à la mort.

Cinq femmes ont été attaquées de la fièvre puerpérale, & quatre en sont mortes. Dans un de ces cas le placenta n'étoit pas sorti & a resté dans la matrice jusqu'à la mort. Deux femmes ont été attaquées de la manie & se sont rétablies environ trois mois après. Dans une de ces femmes, la suppuration a eu lieu aussi-tôt après l'accouchement, du vagin dans la vessie & le rectum. Cette malade s'est rétablie, mais l'urine & les selles ont continué de passer à travers la plaie.

Une femme a eu le périnée déchiré jusqu'au sphincter de l'anüs; on a tâché de faire une suture, mais sans produire aucun effet, elle s'est rétablie, mais elle a éprouvé une descente de matrice.

Il y a eu cinq femmes qui ont eu des enflures considérables & douloureuses des jambes & des cuisses; mais elles se sont rétablies.

En rapprochant tous les nombres ci-dessus sur les accouchemens contre nature ou laborieux, ou sur celles qui ont eu des accidens, il s'ensuit qu'il y en a eu 105 sur le nombre total des accouchées, c'est-à-dire sur 1897; ce qui fait la proportion.

B b iv

Année 1781.
Vol. LXXI.

Année 1781.
Vol. LXXI.

d'un sur 18. Parmi ce nombre il y en a eu 43 (ce qui fait la proportion d'un sur 44) qui ont éprouvé une difficulté particulière ou un grand danger, & il en est mort seulement 7, c'est-à-dire une sur 270. Les autres 62 ont accouché & se sont rétablies avec un peu plus qu'un secours ordinaire. Il y a eu par conséquent 1792 accouchées qui n'ont éprouvé aucun accident particulier.

Il y eut deux femmes qui éprouvèrent une rétroversion de l'utérus le troisième ou le quatrième mois de leur grossesse; mais dans l'une & l'autre l'utérus fut remis en place, & ces femmes parvinrent à leur terme de grossesse, & mirent des enfans vivans au monde.

Outre ces accidens, il est bon d'observer que plusieurs de ces femmes furent attaquées après l'accouchement des plus vives douleurs, ou de ce qu'on appelle la fièvre de lait; mais comme ces affections se calmoient en général dans trois ou quatre jours, & qu'elles ne paroissent point retarder leur rétablissement, ou influer sur leur constitution, je n'en ai point tenu compte. Quelques femmes eurent aussi des symptômes d'une chute commençante de matrice, ce qu'elles n'avoient point éprouvé auparavant; comme je n'ai eu occasion d'observer ces cas qu'une ou deux fois, je ne puis point en donner ici le résultat. Mais comme il y en avoit peu d'entr'elles qui pussent

se livrer au repos, ou suivre les règles nécessaires pour le traitement, il étoit à craindre que cette incommodité n'augmentât graduellement, & que dans le cours de quelques années, l'utérus ne se montrât au-dehors, à moins qu'elles ne menassent une vie moins active, ou qu'elles eussent soin de porter des pessaires ou de pareils palliatifs qu'on peut administrer dans des cas semblables.

Excepté cet accident & les fleurs blanches auxquelles plusieurs d'entr'elles étoient sujettes après l'accouchement, mais qui n'affectoient point leur santé d'une manière remarquable jusqu'aux derniers périodes de leur vie, je suis porté à croire que les femmes des classes inférieures du peuple se rétablissent plus aisément après l'accouchement que les personnes des conditions plus élevées; elles sont moins sujettes à la fièvre puerpérale qui est si funeste, si on ne l'arrête point dès son début; il faut même reconnoître que cette fièvre, si elle n'est pas produite, est certainement fomentée, & que sa malignité s'accroît par de grands feux qu'on allume auprès des malades, par l'air des chambres qu'on ferme soigneusement, par un régime chaud & par la constipation. Mais les habitations des pauvres sont en général si mal construites que, sans ouvrir les portes & les fenêtres, l'air s'y insinue facilement de tous les côtés. Il faut ajouter à cette circonstance qu'ils ne sont pas en état d'en-

Année 1781,
Vol. LXXI.

Année 1781.
Vol. LXXI.

entretenir de grands feux, ou de se nourrir de substances animales; le soin d'ailleurs qu'ils prennent de s'évacuer de très-bonne heure, me paroît un moyen d'échapper en général à cette funeste maladie; c'est en adoptant dans ma pratique particulière des préceptes relatifs à cette idée, que j'ai en la satisfaction de voir les accouchées auxquelles j'ai donné des soins, entièrement exemptes de la fièvre puerpérale depuis trois ou quatre années.

Table qui représente la proportion des enfans mâles à ceux de l'autre sexe, le nombre des jumeaux & celui des enfans qui avoient des difformités ou des monstruosités, & enfin celui des fœtus venus morts au monde.

1897 femmes ont donné le jour à 1923 enfans, 972 enfans mâles & 951 de l'autre sexe, c'est-à-dire dans la proportion de 46 garçons & de 45 filles.

23 de ces femmes (ou 1 sur 80) ont mis au monde des jumeaux, & dans ce nombre il s'est trouvé 16 garçons & 30 filles.

Une femme a accouché de trois filles. On voit par conséquent que dans les accouchemens multipares le nombre des filles est beaucoup plus grand & presque double de celui des garçons.

Il s'est trouvé 8 enfans avec des difformités ou des monstruosités.

Sur ce nombre il y en avoit un dont les doigts étoient réunis par la peau.

Année 1781.
Vol. LXXI.

Un avoit un bec de lièvre.

Un avoit une hydrocéphale & une distorsion de l'épine.

Un avoit une hydrocéphale.

Dans un de ces fœtus il manquoit une partie du palais, & dans deux, une portion considérable du crâne. (Un de ces derniers a vécu une heure).

Un avoit deux têtes, quatre bras, deux épines qui s'unissoient au sacrum & qui se terminoient au bassin; il n'avoit que deux extrémités inférieures & les organes de la génération du mâle. En ouvrant le corps on y trouva deux cavités thorachiques, la droite plus complète que la gauche; le cœur, ainsi que les poumons du côté droit, étoient plus parfaits que ceux du côté gauche. Il y avoit deux estomacs, deux ordres d'intestins qui se réunissoient enfin & se terminoient par un seul rectum & un anus. Il n'y avoit qu'une vessie urinaire.

Une femme accoucha d'une fille & fut délivrée bientôt après de son placenta, dans lequel on ne remarqua rien d'extraordinaire, & quoique l'utérus conservât un volume peu ordinaire, cependant les douleurs ne recommençant point, on soupçonna qu'il y restoit encore du sang coagulé. Le troisième jour les douleurs devinrent violentes & la femme

Année 1781.
Vol. LXXI.

accoucha d'une masse informe, sphérique & un peu applatie. Son plus grand diamètre étoit de 8 pouces, & le poids total d'environ 18 onces. Cette masse s'étoit nourrie par une sorte de cordon ombilical auquel étoit attaché une portion des membranes; en la disséquant on la trouva parsemée d'une grande quantité de vaisseaux sanguins qui paroissoient être des ramifications du cordon ombilical. On y trouvoit un petit cerveau & une moelle de l'épine qui se prolongeoit dans une enveloppe osseuse; mais on n'y trouvoit rien de ressemblant aux viscères thorachiques ou abdominaux. Le reste du volume étoit composé de graisse.

Sur le nombre total 1898 d'accouchemens, il se trouva 84 enfans venus morts au monde, c'est-à-dire dans la proportion d'un sur 23: J'entends par enfans venus morts au monde ceux qui meurent après que la mère a senti leur mouvement dans la matrice, ce qui arrive en général après quatre mois. Les avortemens & les morts qui ont lieu avant cette période peuvent être estimés raisonnablement, deux fois ce nombre; de sorte qu'il paroît qu'il meurt dans la matrice, ou lors de leur expulsion, un fœtus sur huit. Je dois encore faire remarquer que parmi les 84 fœtus venus morts au monde, il y en avoit 49 de garçons ou presque les cinq huitièmes, & 35 de filles.

Parmi les 1400 femmes sur lesquelles on a eu

des renseignemens, après leur départ, il y en a eu 85 (ou nne sur 16) qui ont perdu leur enfant avant deux mois. Sur ce nombre il y avoit 53 garçons & 32 filles, c'est-à-dire la proportion des garçons est de cinq huitièmes.

Cette circonstance singulière d'un plus grand nombre de mâles que d'enfans de l'autre sexe, parmi ceux qui viennent morts au monde, & d'un plus grand nombre de mâles qui périssent dans l'enfance que des enfans de l'autre sexe, cette circonstance, dis-je, a été observée par le docteur Price & d'autres auteurs. M. Haygart a montré qu'à Chester il est mort, dans une période donnée, plus de maris que de femmes. Cela conduit à une question naturelle, savoir si la vie des hommes sont dans toutes les périodes de l'âge plus précaires que celles des femmes.

Pour donner une solution de cette question j'ai ajouté l'article suivant à mon registre.

Table des âges auxquels les femmes avoient commencé & avoient cessé d'être fécondes, & des périodes intermédiaires dans lesquelles la plupart d'entr'elles se trouvoient.

Il y avoit 2102 femmes grosses; mais quoique toutes obtinssent des lettres qui leur donnoient

Année 1781.
Vol. LXXI.

Année 1781.
Vol. LXXI.

des droits au secours des sages-femmes, cependant il n'y en eut que 1897 qui fussent accouchées par elles; les autres ou bien s'éloignèrent entièrement du dispensaire, ou bien par quelques changemens dans les circonstances, furent obligées d'aller à l'hôpital ou dans des ateliers.

Années d'âge.

(1)	36 (1 sur 58) . . .	entre 15 & 19 ans.
	49 (ou 1 sur 43) .	20
	578 (ou 5 sur 19) .	entre 21 & 25
	699 (presque 1 sur 3) .	entre 26 & 30
	407 (presque 1 sur 5) .	entre 31 & 35
	291 (ou 3 sur 22) . .	entre 37 & 40
	36 (ou 1 sur 58) . .	entre 41 & 45
	6 (ou 1 sur 350) .	depuis 46 à 49

2102

- (1) Une de ces femmes avoit entre 15 & 16 ans.
 Une autre entre 16 & 17.
 Trois entre 17 & 18.
 Dix entre 18 & 19.
 Vingt-une entre 19 & 20.

Table du nombre des enfans nés de 1389 femmes avec le nombre de ceux qui étoient vivans, lorsqu'ils se sont présentés au dispensaire. (On n'a commencé cette table que quelques mois après la précédente).

Année 1781.
Vol. LXXI.

Femmes.	N°. des enfans nés de chaque femme.	Total des enfans nés.	Total des enfans vivans.	N°. des femmes qui ont conservé leurs enfans.	N°. des enfans conservés par chaque femme.	Total des enfans conservés.
1	24	24	5			
1	17	17	3			
3	16	48	5			
2	14	28	11			
11	13	155	46			
14	12	168	44			
15	11	165	45	1	11	11
22	10	220	84			
33	9	297	93			
56	8	448	151	4	8	32
74	7	518	213	3	7	21
89	6	534	214	11	6	66
138	5	690	288	32	5	160
169	4	676	293	84	4	336
208	3	624	299	174	3	322
254	2	508	259	306	2	612
299	1	299	271	374	1	464
1389		5419		1079		2223

Il y a eu par conséquent, 310 femmes qui ont perdu tous leurs enfans.

Année 1781.
Vol. LXXI.

Dans le nombre ci-dessus de 5419 enfans, il y avoit 2747 garçons & 2672 filles, ce qui est dans le rapport de 36 garçons sur 35 filles. Cette proportion est très-peu différente de celle qui a été exposée dans une autre table.

J'ai placé ces deux tables l'une près de l'autre, afin qu'on pût voir de quelle fécondité excessive sont douées les femmes des classes inférieures de la société dans les pays que j'habite, & en même tems pour montrer combien il y en a peu qui puissent élever un nombre considérable d'enfans, car quoiqu'il y ait en 321 femmes qui ont donné naissance chacune à six enfans & au-delà, & qu'elles fussent encore toutes grosses, il n'y en a eu cependant que 19 qui aient été en état d'élever six ou un plus grand nombre d'enfans, & quoiqu'il y ait eu 102 de ces femmes qui aient produit chacune neuf enfans & au-delà, cependant il n'y en a eu qu'une seule qui ait été capable de conserver ce nombre vivant.

Je suis porté à croire que cette grande mortalité parmi les enfans, ne provient point d'aucune débilité naturelle ou d'une constitution viciée depuis la naissance, plusieurs de ces victimes étant nées avec toutes les apparences de la santé & de la vigueur; mais il paroît que cette mortalité doit être attribuée à la pauvreté des parens qui les empêche de leur prodiguer les soins nécessaires ou même
de

de fournir les vêtemens & la nourriture convenables à leurs enfans. C'est un objet digne des recherches & de l'attention du gouvernement, que d'examiner si ce grand obstacle à la population est d'une nature irrémédiable, & si une diminution des impositions & des taxes pour toutes les personnes qui élèvent un certain nombre d'enfans, ou si tout autre moyen de les soulager ou de les encourager, ne contribueroit point à arrêter un mal aussi funeste. Pour faire avec quelque fondement des conjectures sur cet objet, il seroit peut-être utile de connoître la proportion des morts dans les familles les plus opulentes où la cause ci-dessus mentionnée n'a que peu d'influence. Mais ce ne peut être que le résultat des observations réunies de différens praticiens.

Je vais tâcher maintenant de déduire de ces tables quelles sont les chances de la vie à différentes périodes, depuis l'enfance jusqu'à 26 ans ; mais pour me faire mieux entendre je vais mettre en avant quelques détails sur la méthode que j'ai suivie.

J'ai supposé que chacune de ces femmes a porté son enfant deux ans ; cette supposition est fondée sur ce qu'il y a de ces femmes qui se représentent au dispensaire deux, trois, quatre fois, & je m'en tiens à un terme moyen qui est le nombre deux. Sur ce principe, quand je trouve une femme qui

Année 1781.
Vol. LXXI.

se présente au dispensaire, & qui a eu auparavant un enfant, je conclus que cet enfant auroit deux ans s'il avoit vécu; mais si la femme a mis au monde deux enfans, je suppose que le premier auroit quatre ans & le second deux ans, & ainsi de suite. Trouvant ainsi que sur 299 enfans nés de plusieurs femmes qui étoient alors avancées dans leur seconde grossesse, il y en avoit 171 ou sept douzièmes seulement de vivans, j'en ai conclu que les cinq douzièmes des enfans périssent avant d'avoir atteint la deuxième année de leur âge, & observant que sur 508 enfans nés de 254 femmes qui étoient avancées dans leur troisième grossesse, il y en avoit seulement 259 de vivans, j'en ai d'abord déduit 210, ce qui forme les cinq douzièmes du nombre total, & qui ont péri avant d'avoir atteint la deuxième année de leur âge; j'ai trouvé alors que 39 qui est presque le douzième du nombre total ou un septième de ceux qui ont survécu, périssent entre la deuxième & la quatrième année de l'âge.



*Table des chances de la vie depuis l'enfance
jusqu'à 26 ans.*

Année 1781,
Vol. LXXI.

Age.	Personnes vivantes.		
0.	5400	2250	5 sur 12.
2	3150	450	8 sur 12, ou 1 sur 7 qui survit.
4	2700	180	8 sur 15, ou 1 sur 15 qui survit.
6	2520	204	4 sur 7, ou 1 sur 12 $\frac{1}{2}$ qui survit.
8	2313	156	6 sur 10, ou 1 sur 15 qui survit.
18	2160	540	
26	1620		

Il en est donc mort 3780
ou 7 dixièmes.

Il y en a eu de vivans 1620
jusqu'à 26 ans.

Total des enfans. . 5400

Je ne fais point si ceux qui se sont appliqués spécialement à ces sortes de calculs, approuveront cette manière de calculer les chances de la vie. J'avoue que, lorsque j'y ai pensé pour la première fois, j'ai cru qu'elle deviendrait plus certaine & plus exacte en l'examinant de près; car quoique

C c ij

Année 1781.
Vol. LXXI.

dans les premières séries d'années où les morts sont nombreuses, les proportions s'accordent assez bien avec les tables de M. Buffon & d'autres auteurs, cependant à mesure qu'on avance en âge, on est obligé de prendre des périodes plus longues que deux années. C'est ainsi, par exemple, que nous pouvons observer que quoique de deux à quatre; de quatre à six & de six à huit années d'âge le décroissement continue d'une manière progressive, cependant il n'en est pas ainsi entre la 8^e, 10^e ou 12^e année de l'âge, car alors il paroît qu'il y a quelque léger accroissement. Mais comme la proportion des morts depuis la 8^e jusqu'à la 10^e ou 12^e année, est probablement peu considérable, une très-petite déduction des morts dans les premières années de la vie, rectifiera probablement cette différence. Je présume qu'une déviation de cette nature peut être occasionnée par la petite vérole ou quelque autre maladie épidémique qui aura régné parmi les enfans durant les deux ou trois années de tems que j'ai fait ce recueil, ce qui rendroit le décroissement dans la première & seconde série plus grand qu'à l'ordinaire. Si c'est-là le cas, il est probable que dans le cours des années on trouvera le véritable terme moyen en comparant la table que j'ai dressée avec une certaine variété de tables semblables.

Table comparative de la population de Londres avec des vues sur la proportion des originaires comparés à ceux qui ont reçu la naissance dans différens comtés d'Angleterre , du pays de Galles , de l'Ecosse , de l'Irlande ou des nations étrangères.

Année 1781;
Vol. LXXI.

Sur 3236 personnes mariées,
824 ou un quart sont nées à Londres;
1870 ou quatre septièmes, dans différens comtés
de l'Angleterre ou du pays de Galles;
209 ou 1 sur 15 sont nées en Ecosse;
280 ou 1 sur 11 sont nées en Irlande;
53 ou 1 sur 60 sont étrangères.

3236

Voici maintenant les proportions respectives des individus de l'un & de l'autre sexe.

Hommes.

Femmes.

329 nés à Londres , &	495 c'est-à-dire 166
	de plus.
952 dans différens comtés.	917 c'est-à-dire 35
	de moins que
	d'hommes,
135 en Ecosse.	74 ou 61 de moins
	que d'hommes.

C c iij

	Hommes.	Femmes.
Année 1781.	1416	1486
Vol. LXXI.	161 en Irlande.	119 ou 43 de moins * que d'hommes.
	40 étoient étrangers. . .	13 ou 27 de moins que d'hommes.
	1618	1618

Ainsi sur 824 personnes mariées & nées à Londres, il y avoit un cinquième de plus de femmes que d'hommes. On peut en rendre compte en supposant qu'un plus grand nombre de mâles périt ou émigrât avant d'avoir atteint l'âge du mariage, que de femmes. Il faut aussi observer qu'en Ecosse & parmi les étrangers, les femmes sont en proportion relativement aux hommes comme 1 à 3 ; mais en Irlande le rapport est de 3 à 7.

On voit par cette table combien Londres se soutient aux dépens de la population des campagnes, & comme on peut supposer que le grand nombre d'Ecossois, d'Irlandois ou d'étrangers qui viennent en Angleterre, résident à Londres, nous pouvons connoître dans quelles proportions ils contribuent à réparer la perte qu'éprouve son excessive population.

ARTICLE XIII.

Exemple d'une femme qui a eu la petite-vérole durant sa grossesse, & qui paroît avoir communiqué la même maladie au fœtus qu'elle portoit; par M. J. Hunter.

Le 5 Décembre 1776, madame Ford avoit éprouvé des frissons & d'autres symptômes précurseurs de la fièvre, auxquels s'étoient joints une grande difficulté de respirer & une toux très-incommode. M. Grant la vit le-sept du même mois; après lui avoir fait une saignée, il lui prescrivit une composition d'une mixture saline avec le blanc de baleine & la magnésie de six en six heures.

Ce remède fit pousser deux ou trois selles, & alors les symptômes purent diminuer; mais la toux étant encore violente, il parut nécessaire de répéter la saignée, sur-tout comme elle disoit être dans le sixième mois de sa grossesse. Le soir du même jour, c'est-à-dire le 8 du mois, la petite vérole se manifesta & elle parut être d'un caractère benin. Ses progrès furent plus lents qu'on n'auroit dû l'attendre; mais la maladie parcourut aisément ses périodes, & la dame resta levée une partie du jour en prenant seulement le soir un parégorique,

C c iv

Année 1780.
Vol. LXX.

Année 1780.
Vol. LXX.

& suivant les circonstances un peu de magnésie ; ainsi les symptômes se calmèrent & la toux devint très-peu incommode.

Le 25 du même mois elle se plaignit d'une douleur au côté ; on lui tira huit onces de sang ; le lendemain elle fut exempte de douleur , & se trouva aussi-bien que sa situation actuelle peut le permettre. Après cela M. Grant ne la revit plus que le 21 du même mois que le travail de l'enfantement se déclara ; c'est alors que M. Wastalk fut appelé ; à son arrivée, cette dame se plaignoit de violentes douleurs, & il trouva avec les autres symptômes d'un accouchement prochain, que l'orifice de la matrice étoit peu dilaté ; il lui fit prendre une émulsion anodyne avec le blanc de baleine. Après quelques douleurs longues & cruelles, elle accoucha d'un enfant mort. Observant une éruption sur tout le corps de l'enfant & différentes pustules remplies de matière, on les examina plus particulièrement, & me rappelant que M. Leake, dans son introduction à la pratique des accouchemens, avoit observé qu'il falloit rechercher si les adultes, qu'on dit échapper entièrement à la petite vérole, n'en avoient point été attaquées précédemment, lorsqu'ils étoient encore dans le sein maternel, j'en envoyai une note à M. Leake & à M. Hunter, pour déterminer un fait sur lequel on étoit encore en suspens. M. Leake vint lui-

même le soir & vit l'enfant, & après lui M. Hunter & M. Cruickshanks l'examinèrent aussi, & convinrent tous qu'il avoit eu la petite vérole. M. Hunter en particulier pensa que l'éruption étoit si semblable à la petite vérole, qu'on ne pouvoit nullement en douter; mais il ajouta que dans tous les autres cas de la même espèce qu'il avoit eu occasion de voir, le fœtus placé dans l'utérus avoit échappé à la contagion. L'accouchement eut lieu vingt-trois jours après l'éruption de la petite vérole de la mère.

Année 1780.
Vol. LXX.

Réflexions de M. Hunter. L'intervalle de tems qui s'étoit écoulé entre la petite vérole & l'accouchement, joint à l'état de la maladie, quand l'enfant vint au monde (qui paroïssoit être le sixième ou le septième de l'éruption propre au fœtus, & le quinzième ou seizième à compter de l'éruption de la mère), font voir la possibilité que la contagion ait été communiquée au fœtus dans le sein de sa mère. Plusieurs des pustules étoient distinctes; mais quelques-unes étoient réunies à la base; elles avoient tous les caractères de la petite vérole.

M. Hunter dit que toutes les fois qu'il a eu occasion d'ouvrir les corps des personnes mortes de la petite vérole, il avoit examiné avec soin les cavités intérieures, comme l'œsophage, la trachée-artère, l'estomac, les intestins, la plèvre, le péri-

Année 1780.
Vol. LXX.

toine, pour voir si ces parties offroient quelque éruption, & qu'il n'en avoit jamais trouvé aucun vestige. Il commença alors à soupçonner que la peau elle-même étoit la seule partie du corps susceptible d'un pareil *stimulus*, ou que la peau étoit sujette à quelqu'influence à laquelle les autres parties du corps n'étoient point sujettes, & qui la rendoit seule capable de recevoir le virus varioleux.

Pour éclaircir ce point, il ouvrit le corps d'un fœtus dont il a été parlé ci-dessus, & il examina attentivement toutes les cavités intérieures, telles que la surface interne du péritoine, de la plèvre, des intestins, de la rachée-artère, de l'œsophage, de l'estomac, &c., & il n'observa rien qui eût quelque rapport avec la petite vérole. Il faut observer que le même fœtus avoit la face & les extrémités pleines de pustules parfaitement semblables à celles que produit ordinairement la petite vérole; d'où l'on peut déduire que la peau est la partie principale qui est susceptible du *stimulus* varioleux, & qu'elle n'est point attaquée par une influence extérieure.

La communication de la petite vérole au fœtus dans le sein de la mère, peut avoir eu lieu de deux manières; une, par la communication immédiate de la maladie de la mère à l'enfant; l'autre, par une sorte d'absorption à l'instant que la

mère a contracté la maladie par l'impression d'une cause quelconque. Quoi qu'il en soit de ces deux moyens d'infection, Boerhaave semble avoir été conduit par l'observation à penser que ni l'une ni l'autre n'avoient lieu; car il donna ses soins à une dame qui eut la petite vérole confluyente au sixième mois de sa grossesse, & qui accoucha à terme d'un enfant qui n'offroit pas le moindre vestige de la maladie de la mère.

Son commentateur Wanswieten a cependant une opinion différente, & il cite l'exemple d'une femme qui, durant le cours d'une petite vérole bénigne, fit une fausse couche, & le fœtus qu'elle rendit se trouva couvert de pustules varioleuses qui étoient à leur plus haut point de maturité. Il est vrai que cette observation est fondée sur le rapport d'une sage-femme, & qu'on ne peut point le regarder comme incontestable. Cependant on ne peut guère le révoquer en doute d'après l'exemple analogue qui vient d'être rapporté. Wanswieten d'ailleurs rapporte d'autres observations en faveur de l'opinion opposée à celle de Boerhaave. Sans doute que si de pareils exemples ne sont point fréquens, on doit les attribuer à ce que la petite vérole contractée pendant la grossesse, est le plus souvent mortelle.

Année 1780.
Vol. LXX.

ARTICLE XIV.

Exemple d'un enfant qui eut la petite vérole dans le sein de sa mère; par M. Wright, docteur-médecin, dans une lettre adressée à M. Hunter.

Année 1780.
Vol. LXXI.

J'ai lu, Monsieur, avec plaisir le cas que vous avez consigné dans le volume LXX des transactions philosophiques sur la communication de la petite vérole au fœtus renfermé dans le sein de la matrice. D'après les faits que vous rapportez, il paroît que le fœtus avoit reçu l'infection de la petite vérole dans le sein de sa mère.

C'est ce qui m'a engagé à vous rapporter un cas singulier que j'ai eu occasion d'observer il y a quelques années. Je suis fâché d'avoir perdu malheureusement tous mes ouvrages & mes remarques de pratique sur des cas semblables, par la prise d'un convoi le mois d'Août dernier.

En 1768 la petite vérole étoit si générale à la Jamaïque, que très-peu de personnes échappoient à la contagion. Vers le milieu de Juin M. Peterkin, négociant très-connu de Marta-Brac, reçut environ soixante nouveaux nègres d'un vaisseau qui arrivoit; aussi-tôt après le débarquement, diverses autres personnes furent immédiatement

attaquées de la fièvre, & la petite vérole se manifesta; les autres furent aussi-tôt inoculés. Parmi ceux qui eurent la petite vérole par les voies naturelles, il y avoit une femme d'environ 22 ans & enceinte. La fièvre éruptive étoit légère, & l'éruption avoit paru avant que je visse la malade. Les boutons étoient en petit nombre, discrets & étendus; la maladie parcourut ses périodes suivant son cours ordinaire; mais vers le 14^e jour de l'éruption, la femme éprouva un accès fébrile de quelques heures. Elle fut prise le même jour du travail de l'enfantement, & elle accoucha d'un fœtus dont la tête, les extrémités & le corps étoient couverts de petite vérole. Les boutons étoient distincts & très-étendus, tels qu'ils paroissent ordinairement le huitième ou le neuvième jour dans des cas favorables. Le fœtus étoit petit & foible, il ne put têter que peu; on lui procura une nourrice & on prit tous les soins possibles de l'enfant; mais il mourut le troisième jour à dater de celui de sa naissance. La mère se rétablit, aussi & elle est dans l'habitation de M. Peterkin.

Durant une pratique de plusieurs années à la Jamaïque, j'ai remarqué que lorsque les femmes grosses avoient été attaquées d'une petite vérole naturelle, ou qu'elles avoient été inoculées par erreur, elles faisoient en général de fausses couches, dans le tems ou aussi-tôt après la fièvre d'é-

Année 1780.
Vol. LXXI.

Année 1780.
Vol. LXXI.

ruption; mais je n'ai vu aucuns signes de petite vérole sur leurs corps, excepté sur le fœtus dont je viens de parler.

ARTICLE XV.

Offification du conduit thorachique; par M. Cheston, chirurgien de l'infirmerie de Glochester.

Année 1780.
Vol. LXX.

JONES, âgé de 22 ans, fut reçu dans l'infirmerie de Glochester le 5 Juin 1775; il se plaignoit de douleurs très-incommodes au dos & à la hanche, & ces douleurs, d'après toutes les circonstances de sa description, paroissoient d'une nature rhumatique.

En l'examinant peu de jours après, on trouva la hanche droite plus pleine qu'elle ne devoit l'être; mais la cuisse paroissoit être très-peu altérée dans son état naturel. On appliqua un vésicatoire sur la jointure, & les remèdes antirhumatiques ordinaires furent prescrits par un médecin aux soins duquel il fut confié. Dans une quinzaine de jours il se plaignit d'une douleur violente au genou, pour laquelle on appliqua un vésicatoire à l'extrémité du péroné. Durant tout ce tems il marchoit avec un bâton, mais bientôt après il eut besoin de béquilles.

Sa cuisse étoit augmentée en volume & devenoit

œdémateuse ; c'est pour cela qu'on appliqua un vésicatoire vers le milieu , & le genou se trouvant dans un état de contraction , on frotta cette partie avec un liniment volatil ; comme il ne pouvoit se remuer même à l'aide de béquilles , il fut retenu entièrement dans son lit.

Depuis cette époque l'augmentation de la cuisse fut très-rapide , & son genou devint contracté en proportion , de sorte que la cuisse conservoit la même position que celle qu'on lui donne dans une fracture du bras.

Aussi-tôt après il commença à éprouver quelque difficulté à rendre l'urine , ce qui augmenta par degrés à un tel point que les médicamens prescrits pour le soulager à cet égard n'ayant point l'effet désiré , & son ventre paroissant distendu , on voulut le sonder , mais la sonde ne put point outrepasser le cou de la vessie ; on y introduisit cependant une bougie & il sortit un peu d'urine.

Depuis cette époque , au moyen des grands efforts des muscles abdominaux , & au moyen d'une compression externe , il commença à uriner , mais avec difficulté. Il se déclara alors de violentes douleurs dans l'abdomen , mais particulièrement à la région du pubis ; l'écoulement de l'urine devint alors involontaire. La fièvre étoit très-considérable par intervalles ; les forces s'abattirent très-prompement , & il n'y avoit que les opiat qui procurassent

Année 1780.
Vol. LXXI.

Année 1780.
Vol. LXXI.

quelque soulagement; il languit dans cet état déplorable jusqu'au commencement d'Octobre, & alors la violence des douleurs commencèrent à se calmer, & la mort survint le 10 Octobre.

A l'ouverture du corps, outre les autres changemens, on trouva que le réservoir du chyle n'étoit pas si pleinement rempli; qu'il ne pût encore recevoir une petite quantité de fluide, mais le conduit thorachique étoit osseux & obstrué.

Dissection.

LES tégumens de l'abdomen étoient durs & secs comme du parchemin. Les veines étoient fort grosses & leurs branches étoient tracées à la surface du corps d'une manière très-distincte. Au côté gauche il y avoit une tumeur évidente qui pouffoit les tégumens au-dehors & qui contenoit une grande quantité de fluide.

La cuisse étoit dans un état œdémateux, de sorte que d'après les circonstances & la distension de l'abdomen on ne pouvoit rien observer au-dehors, à la partie inférieure de l'abdomen & au côté droit plus qu'au côté gauche.

En examinant la cavité, les intestins se présentèrent presque dans l'état naturel; ils étoient sains en apparence, mais ils étoient très-distendus. La tumeur du côté gauche étoit occasionnée par la

la distension de la vessie pleine d'urine & légèrement adhérente au péritoine; à cela se joignoit le colon vers sa terminaison au rectum, & qui remplissoit la région iliaque de ce côté, pendant que le côté droit, & plus de la moitié du bassin, étoient remplis par une masse confuse & irrégulière qui sembloit formée de cartilage, & d'une matière osseuse & pierreuse.

Année 1780.
Vol. LXXI.

Comme un grand cartilage (substance qui devint osseuse par le dessèchement) sembloit couvrir tout le corps des vertèbres, j'éloignai les intestins; & en examinant cette masse, je poursuivis son trajet en haut dans la direction de l'épine & des grands vaisseaux, jusqu'à sa terminaison un peu au-dessus des reins.

En mettant à découvert le sternum & les côtes, pour examiner la cavité de la poitrine, les cartilages se présentèrent eux-mêmes & offrirent une plus belle blancheur que dans l'état ordinaire; ils ressembloient à du papier blanc, & retenoient encore leur fermeté naturelle & leur tissu.

Les poumons étoient dans un plein état de distension, & obstrués, dans plusieurs endroits, de la même espèce de substance cartilagineuse qui paroissoit si abondante dans la cavité abdominale.

Soupçonnant que le système artériel pouvoit être jusqu'à un certain degré affecté par cette maladie, je separai le cœur des poumons, afin d'examiner

~~Année 1780.~~ le grand systême des vaisseaux, & en divisant l'aorte un peu au-dessous de sa courbure ou de ce qu'on appelle la crosse de l'aorte, on trouva en l'examinant que le cœur étoit très-relâché, vide, & d'un volume bien moindre qu'il ne l'est dans les adultes du même âge que celui de cet individu, mais sain à tous égards.

Les valvules semi-lunaires & mitrales n'étoient point dans un état morbifique, & on n'apercevoit point dans l'aorte la plus légère déviation de l'état de santé, quoiqu'elle fût environnée de cette substance singulière jusqu'à sa bifurcation dans les deux iliaques.

En élevant l'aorte de l'épine, après que je l'eus divisée à sa courbure, je trouvai une dureté singulière au côté droit comme un paquet de filets qui étoit dans le trajet du conduit thorachique. Je continuai par conséquent ma dissection avec beaucoup de précaution, & je m'assurai en dégageant pleinement cette patrie que c'étoit le conduit thorachique qui étoit pleinement obstrué par une matière osseuse, immédiatement au-dessus du réservoir de pecquet.

Malheureusement étant alors pressé par le tems au moment où j'ouvris le corps, je fus obligé d'emporter les parties pour les examiner plus soigneusement chez moi; ce qui me priva de l'avantage de déterminer les circonstances ci-dessus

dans le tems de la séparation des parties, & par conséquent de rechercher l'extension ultérieure de cette concrétion osseuse, & de voir l'état du conduit dans son entrée dans la veine sous-clavière. La veine azigos aussi bien que l'aorte étoit parfaitement saine.

Année 1780.
Vol. LXXI.

La veine cave se trouvoit davantage dans un état morbifique, car quoiqu'elle n'en offrit aucune apparence à l'extérieur, cependant quand je l'ouvris, je trouvai sa cavité à demi-remplie d'une substance ferme & sans élasticité. Cette substance prenoit son origine de sa surface interne près de l'entrée de la veine émulgente; elle y étoit attachée en différens endroits par des points séparés jusqu'à sa projection dans le sacrum, où la cavité de la veine étoit presque remplie d'une continuation de la même substance.

La rate, le pancreas & le foie étoient parfaitement sains; la vésicule du fiel étoit très-petite & presque vide; leurs conduits étoient dans l'état naturel.

Les reins étoient plus volumineux que dans l'état naturel; ils paroissoient livides à l'extérieur & offroient des signes d'une inflammation antérieure. L'uretère du côté droit étoit fort augmenté, & contenoit une quantité considérable d'urine qui y paroissoit retenue par la distension de la vessie. L'uretère gauche étoit dans l'état naturel. Les ta-

Année 1780.
Vol. LXXI.

niques de la vessie étoient très-épaisses; mais elles conservoient à l'extérieur, aussi bien qu'à l'intérieur, toutes les apparences d'un état sain.

Il faut observer que comme la vessie ne peut point s'étendre latéralement, elle se prolongeoit en haut en prenant une forme oblongue, & ne contenoit guères plus d'une pinte d'urine.

La tumeur qui occupoit la région iliaque droite s'étendoit elle-même irrégulièrement dans toutes les directions, & paroissoit au-dehors avoir détruit la principale partie de l'os innominé, autant qu'on peut s'en convaincre en introduisant une sonde dans différentes directions.

La manière avec laquelle une portion de cette tumeur pressoit sur le cou de la vessie, explique aisément la difficulté de l'introduction d'un catheter, quoique la bougie fût introduite avec facilité; & elle fait voir pourquoi le malade, longtems avant sa mort, étoit incapable de vider sa vessie.

On ne peut point encore fixer le degré d'altération qu'a éprouvé l'os innominé, puisque la tumeur n'est pas encore assez réduite par la macération. Dans les endroits où l'os est débarrassé des parties environnantes, il paroît qu'il a souffert une grande perte de substance, & qu'à mesure que la tumeur se dissout, une grande quantité de matière osseuse qui est privée de son moyen d'union, se précipite continuellement au fond du

vaisseau dans lequel on fait macérer la tumeur.

Le conduit thorachique fut mis dans l'eau-de-vie pour conserver sa forme primitive, & c'est dans cet état qu'il a été porté à Londres. En le montrant à différens anatomistes, ils ont douté, s'il ne restoit point encore quelque petite cavité dans ce conduit, & ils desirèrent que je misse sous leurs yeux cette pièce anatomique, en la retirant de l'eau-de-vie, pour l'examiner plus soigneusement. Je me suis rendu à leurs desirs, & la pièce a été examinée par MM. Hunter, Waston & Cruikshanks qui vinrent chez moi pour cet objet. Voici les remarques particulières qu'ils eurent occasion de faire; ils trouvèrent que le conduit étoit pleinement obstrué, excepté à la partie bulbeuse inférieure qu'on appelle communément le réservoir du chyle, où à la vérité il y avoit assez de place pour laisser passer l'air entre la tunique du conduit & la substance étrangère qui s'y étoit formée, de sorte que le réservoir qui auparavant paroissoit aplati, devenoit distendu & arrondi en y soufflant de l'air; mais cet air étoit entièrement confiné au réservoir du chyle, & ne pouvoit en aucune manière être poussé dans le conduit thorachique. Le réservoir ayant été ouvert, on tâcha d'introduire une soie dans le conduit, mais la chose fut impossible.

M. Cruikshanks tâcha ensuite de forcer le mer-

D d iij

Année 1780
Vol. LXXL

Année 1780.
N^o. LXXI.

cure dans le conduit ; mais il ne put point y introduire la moindre particule.

D'après ces divers examens, nous avons été convaincus que le réservoir du chyle n'étoit point si complètement obstrué qu'il ne put encore recevoir une petite quantité de fluide, mais que le conduit étoit totalement imperméable, sans qu'il fût possible d'y rien introduire.

Les tuniques du conduit ne paroissoient point avoir éprouvé aucune altération morbifique, car dans quelques endroits où la substance qui y étoit contenue n'étoit pas si fortement adhérente qu'elle n'en put être facilement détachée, ces tuniques étoient dans un état parfaitement sain & naturel. Dans d'autres endroits où l'adhésion n'étoit pas si forte, il y avoit à l'extérieur une plus grande apparence d'ossification ; mais il y avoit lieu de se convaincre que cela provenoit seulement de l'épaississement des tuniques dans les parties où le réservoir du chyle avoit été ouvert, & la substance de l'intérieur paroissoit d'une nature membraneuse très-semblable à celle qu'on trouve dans la veine cave du même individu, mais destituée de lames. Nous présumons que la même espèce de membrane avoit été continuée dans toute l'étendue du conduit, & qu'elle s'étoit complètement ossifiée dans toute cette portion du conduit que j'avois conservée.

Un petit corps qui ressembloit à une glande

lymphatique sur le côté de la partie supérieure du conduit avoit été ouvert par M. J. Hunter, qui avoit trouvé la même disposition osseuse dans ce petit corps que celle que nous avons aperçue dans le conduit lui-même.

Année 1780,
Vol. LXXI,

Nous examinâmes ensuite ce qui remplissoit en partie la veine cave ; il étoit long de quatre pouces, & d'une forme conique dont la partie supérieure étoit la plus étendue ; sa surface paroissoit irrégulière & granulée avec de petites particules osseuses. Elle paroissoit aplatie peut-être par la pression du sang qui circuloit constamment au-dessus ; car ayant fait une petite ouverture avec la lancette dans la partie la plus étroite de cette substance, nous pouvions passer très-aisément une sonde en haut & en bas, de manière à nous convaincre de l'existence d'une cavité. En introduisant un tuyau de pipe à fumer, la partie supérieure paroissoit s'étendre en un grand cul-de-sac ; & la partie inférieure étoit distendue comme un grand vaisseau. Les symptômes que cet homme a offerts durant sa maladie, aussi bien qu'à sa mort, étoient parfaitement semblables à ceux que j'ai observés dans les malades qui ont péri d'une inflammation lente des viscères. La nature de son mal paroissoit n'indiquer qu'une affection de la vessie, & c'est pour cette raison que je fis l'ouverture de son corps ; car il n'étoit point réduit dans

Année 1780.
Vol. LXXI.

un tel marasme que celui qu'offrent souvent ceux qui sont atteints de semblables maladies.

Continuation du cas précédent sur l'ossification du conduit thorachique ; par M. Cheslon.

IL a fallu attendre cinq mois de macération des os du bassin pour bien connoître leur état ; car quoiqu'on ait rarement changé l'eau du vaisseau , & qu'on l'ait tenu dans un endroit chaud , j'ai voulu que la putréfaction fût portée au dernier point , & prendre assez de tems pour que les parties molles fussent pleinement détruites.

Dans l'exposition que j'ai faite de l'état du conduit thorachique , je me suis livré à quelques soupçons sur l'altération que pouvoit avoir éprouvée dans sa substance une grande partie de l'os innominé ; mais c'étoit à la macération à éclaircir ces doutes. La profondeur à laquelle la sonde étoit introduite , & la dure résistance que j'épronvois dans le corps de la tumeur , firent voir que l'introduction ne se faisoit point à travers une partie cariée ou dans un état morbifique , comme je l'avois soupçonné , mais dans une certaine quantité de matière osseuse déposée au-dehors de l'os innominé , & que la partie qui en étoit chargée à l'extérieur étoit dans un état sain.

Il est difficile de fixer avec précision la partie

où la tumeur qui occupoit le côté droit du bassin , & qui contenoit une matière osseuse , avoit pris son origine. Il y a lieu cependant de présumer qu'elle commença dans le bassin au-dessous du péritoine , puisque la surface de la tumeur étoit évidemment recouverte de cette membrane ; & d'ailleurs d'après toutes les apparences de la tumeur , aussi-bien que d'après un examen attentif des parties durant le progrès de la dissolution , il est probable qu'en sortant du bassin antérieurement par le trou ovale , aussi bien qu'à la partie latérale au-dessous de l'ischium , & en s'élevant au-dessus de l'épine de l'ilium , la tumeur formoit une communication complète du dehors au-dedans , de manière à envelopper entièrement tout l'os innominé.

A mesure que les parties molles se détachent par la macération , on trouvoit dans l'eau , au fond du vaisseau , de grandes quantités de matière osseuse qui avoient des formes irrégulières & différens volumes ; & comme on n'avoit employé ni la force , ni le mouvement pour séparer cette matière de celle qui étoit adhérente à l'os , il est très-probable qu'elle avoit existé dispersée & détachée dans la tumeur.

La tumeur à l'extérieur avoit toutes les apparences ordinaires d'une glande affectée & augmentée en volume , mais par degrés , comme j'eus occa-

Année 1780.
Vol. LXXL

Année 1780.
Vol. LXXI.

sion de l'observer en changeant souvent l'eau. Toute l'apparence fut changée, & la matière opaque, à mesure que la macération avançoit, paroissoit environnée d'une substance dure, blanche & plutôt transparente, très-semblable au suif, & dans cet état, elle résistoit principalement au pouvoir dissolvant de l'eau.

Lorsque l'os parut en général assez nettoyé pour le faire sécher, je trouvai dans une partie quelques restes de cette substance sébacée; mais comme je ne voulois pas laisser le tout dans l'eau en faveur de cette petite portion, & que je crus en outre que dans le dessèchement je pourrois encore découvrir quelques indices de sa nature, je l'exposai à l'air ouvert, & je fus surpris de trouver que dans le cours de trois jours cette substance s'étoit entièrement dissipée.

J'eus la satisfaction de voir que l'attention & le soin que je donnois aux os pour les faire bien macérer, furent amplement récompensés par les particularités qu'ils présentèrent.

L'os innominé gauche étoit parfaitement libre de toute apparence non naturelle dans cette partie même, à son union à la symphise du pubis; mais la maladie s'étendoit dans tout l'os innominé droit par différentes graduations, depuis une ulcération superficielle, jusqu'à une grande quantité d'excroissances.

Il est remarquable que le cartilage qui joint les os pubis, formoit les bornes de la maladie, & on n'observoit aucun état morbifique dans l'os pubis gauche. Il faut observer, pour l'intelligence de cette maladie, que l'étendue de cette tumeur qui se terminoit exactement à cette partie, paroît avoir formé les limites de la maladie. Autant que la lame externe de l'os pubis & de l'ischium manquoit, autant les os présentoient cette rudesse & cette perte irrégulière de substance qu'on appelle ordinairement ulcération ou carie superficielle. Le fond de l'*acetabulum* paroissoit avoir souffert de la même manière; mais à l'égard de l'os ilium, soit extérieurement, soit intérieurement, les lames n'avoient presque souffert aucune atteinte.

Année 1781.
Vol. LXXI.

ARTICLE XVI.

Luxation complète de l'os de la cuisse, dans un adulte, par une violence extérieure; par M. Charles White, chirurgien à Manchester.

UN homme fort & robuste, en déchargeant un pesant fardeau qui étoit sur un cheval, glissa & tomba à la renverse; le fardeau porta sur son ventre & sur ses cuisses. Ses domestiques le portèrent dans sa maison & le mirent sur son lit; il éprouvoit

Année 1760.
Vol. LI.

Année 1760.
Vol. LI.

des douleurs insupportables lorsque j'arrivai. Je trouvai la fesse droite deux fois presque aussi grosse que l'autre, le genou & le pied du même côté, tourné en dedans & la cuisse très-accourcie. En tâchant de faire exécuter à la cuisse un mouvement de rotation, on n'entendoit point le moindre craquement; cela me fit juger que la tête de l'os étoit hors de la cavité cotyloïde, & en l'examinant je me convainquis qu'elle étoit au-dessous des muscles fessiers. Je vis alors la cause de l'augmentation du volume de la fesse.

Je fis aussi-tôt la réduction de la manière suivante.

Ayant mis quelques serviettes autour du pilier du lit pour empêcher que la peau ne fût écorchée, je fis placer le malade sur son dos avec une jambe de chaque côté du pilier, & alors j'engageai trois ou quatre des assistans de saisir le membre disloqué, pendant que le pilier du lit qui répondoit à l'aine, faisoit un point d'appui propre à résister en sens contraire; pendant qu'ils faisoient l'extension, j'appliquai ma main gauche sur la tête de l'os pour le porter dans sa place, & en même tems avec ma main droite, tournant le genou au-dehors, je portai la tête de l'os dans la cavité cotyloïde avec la plus grande facilité, mais avec un bruit si marqué que tous ceux qui étoient présents en furent étonnés.

La personne s'est bien trouvée dès ce moment, & l'augmentation de volume de la cuisse a entièrement disparu; dans une quinzaine de jours elle a été en état de se mouvoir sans aide, & deux mois après il a été à pied à Manchester presque comme dans l'état naturel.

Année 1760.
Vol. II.

Remarques.

LES anciens & les modernes sont tombés dans de grandes erreurs sur le traitement des accidens qui surviennent à l'articulation de la cuisse. Les anciens qui, par le défaut des connoissances anatomiques & de l'ouverture des corps morts, ne savoient point que le cou du fémur étoit souvent fracturé, imaginoient toujours qu'il étoit luxé. Leurs malades étoient par conséquent quelquefois longtems tourmentés (dans l'espoir d'une réduction) sans en retirer aucun avantage, & le défaut de succès faisoit que les chirurgiens dans d'autres tems abandonnoient leurs malades, tandis qu'ils auroient pu les soulager. Les modernes sont tombés dans une extrémité opposée, mais accompagnée de conséquences aussi pernicieuses. Boerhaave en particulier pensoit qu'il ne survenoit jamais une dislocation de la cuisse par une violence externe, mais que la tête de l'os étoit souvent fracturée à son cou, près de son trochanter. L'opinion de ce médecin célèbre est d'un si grand poids auprès

Année 1760.
Vol. II.

de ceux de sa profession, qu'on a cru que dans ce cas la tête du fémur étoit toujours fracturée, & par conséquent qu'on opéroit rarement la réduction, & que les malheureux malades restoient boiteux le reste de leur vie; mais ce point est maintenant mis hors de doute.

Dans le second volume des mémoires de l'académie de chirurgie de Paris, on trouve deux cas qui font voir les ressources de la nature, lorsque la luxation de la cuisse n'a point été réduite. Il parut après la mort que dans le premier cas l'os étoit hors de sa place, & porté en haut & en-dehors, pendant que la cavité cotyloïde étoit très-diminuée en volume, & que sa forme de ronde avoit été changée en ovale. La tête du fémur avoit été reçue dans une autre cavité formée sur l'os *ilium*, & s'étoit fixée dans cette cavité contre nature. Cet accident avoit été occasionné par une chute, lorsque la personne étoit encore dans l'enfance; elle fut en état de marcher, quoique cependant elle continuât de boiter jusqu'à sa mort, qui eut lieu vers sa soixante-huitième année. Dans l'autre cas l'os étoit luxé en bas & en-dedans, & la tête étoit engagée dans ce qu'on appelle le trou ovale.

On trouve un cas semblable, bien constaté dans le deuxième volume des essais philosophiques & littéraires d'Edimbourg, d'un homme de Wor-

cester dont la tête de l'os avoit été expulsée de la cavité coryloïde & logée dans l'aine. Elle fut réduite avec quelque difficulté, & l'homme n'éprouva d'autre inconvénient, sinon que sa jambe étoit d'un quart de pouce plus longue que l'autre.

Je dois ajouter à cela qu'il y a environ trente ans que mon père fut appelé pour voir un homme dont la cuisse avoit été luxée trois ou quatre jours auparavant; la tête de l'os étoit dans l'aine; ce que le chirurgien du lieu n'avoit pas d'abord reconnu; cependant elle fut immédiatement remise en place, & le malade recouvra l'usage du membre.

Il paroît, d'après ce qui vient d'être dit, que l'os fémur est souvent luxé, & que cette luxation se fait sur-tout de deux manières différentes.

ARTICLE XVII.

Autre exemple d'une luxation complete de l'os de la cuisse; par M. C. Young, chirurgien à Plimouth.

J. DOWN, âgé d'environ 40 ans, d'une taille moyenne, en mettant les harnois aux chevaux de son maître, fut renversé avec la chaise qui leur étoit attelée, à cause d'une frayeur dont ils furent saisis. Il se trouva renversé avec le dos tourné vers

Année 1760.
Vol. LI.

Année 1760.
Vol. LI.

Année 1760.
Vol. LI.

la chaise, dont la roue, par un mouvement rapide ; le frappa à la partie supérieure & postérieure de la cuisse droite. Il tomba à terre & ne put se relever, se plaignant d'une douleur violente vers la hanche droite. Je fus appelé aussi-tôt après l'accident, & je le fis mettre au lit pour l'examiner avec plus de soin. Je remarquai qu'il se plaignoit d'une vive douleur vers l'articulation du fémur avec l'ischium, & cette douleur étoit encore augmentée par le moindre mouvement du membre. Le gros orteil étoit tourné vers le talon du pied gauche, & le talon du pied droit étoit tourné en-dehors. Tout le membre, depuis la tête du fémur jusqu'à l'extrémité des orteils, étoit contourné en proportion.

Je crus qu'il étoit manifeste au premier coup d'œil qu'il devoit y avoir ou une fracture du fémur ou une dislocation de son articulation avec l'ischium. Il auroit été facile de découvrir le premier cas s'il avoit eu lieu ; mais en mettant ma main sur le grand trochanter, pendant qu'un aide tournoit le pied en-dedans & en-dehors alternativement, j'aperçus que le mouvement du grand trochanter correspondoit exactement au mouvement de l'extrémité inférieure du fémur ; & je conclus que s'il y avoit eu une fracture, elle auroit eu lieu entre le grand trochanter & la tête de l'os, & si tel eût été le cas, j'aurois été en état

état de le découvrir par le craquement qu'on éprouve toujours quand les deux extrémités fracturées d'un os sont mues l'une contre l'autre. Mais ce symptôme n'étant pas sensible, & cependant le membre étoit si contourné, & la douleur si violente & si bornée aux parties qui environnent la jointure, que je déclarai qu'il y avoit une dislocation de la tête du fémur, & par conséquent je tâchai de la réduire par les méthodes ordinaires de l'extension. C'est dans cette vue que deux aides furent employés à étendre le membre en tirant des serviettes dont on avoit enveloppé le bas de la cheville, pendant que d'autres opéroient la contre-extension, en tirant un drap de lit qu'on avoit passé entre les cuisses, & qui étoit fixé à la tête du lit, & en même tems on tournoit le pied en-dehors à mesure que l'extension s'opéroit. Ce procédé fut très-douloureux, mais le membre devint bientôt à tous égards parallèle à l'autre. Il parut aussi long, & en l'appuyant sur le lit, les gros orteils & les talons des deux pieds se trouvèrent exactement dans la même position, & la seule différence qu'on pouvoit apercevoir entre les deux membres, c'étoit qu'il étoit un peu applati vers la hanche droite. En un mot la différence entre les deux membres étoit si petite, que je commençai à croire que je m'étois trompé en croyant qu'une dislocation avoit eu lieu, puisqu'il

Tome II. Chirurgie.

E e

Année 1760.
Vol. II.

Année 1760.
Vol. LI.

étoit évident qu'il n'y avoit point eu de réduction par l'extension, & que ni le malade ni moi ne l'avions observée : je crus alors que la distorsion du membre n'étoit due à autre chose qu'à une contraction involontaire des muscles occasionnée par la violence du coup.

Je fis donc pratiquer une saignée ; le malade fut couché sur son dos, & on lui prescrivit de se mouvoir le moins qu'il lui seroit possible, pensant que le repos seroit le remède le plus efficace. La douleur continua avec violence pendant quelques jours ; mais par degrés elle devint supportable, excepté dans les mouvemens du membre ; & dans environ douze jours après l'accident, le malade pouvoit supporter que son membre fût levé ou abaissé avec presque point de douleur. Nonobstant cela il ne pouvoit pas le lever lui-même plus qu'il ne le faisoit précédemment, lorsque la douleur étoit la plus vive. Un cas pareil m'embarrassoit beaucoup. J'étois convaincu qu'il n'y avoit point de fracture du membre dans aucune partie, & je pensois que d'après les circonstances rapportées ci-dessus, on ne devoit point admettre une dislocation. Je voulus donc prendre l'avis de deux autres chirurgiens qui, en voyant la position du membre, & rappelant toutes les autres circonstances qui avoient précédé ou accompagné l'accident, convinrent qu'il n'y avoit point de frac-

ture, & qu'il étoit également invraisemblable qu'il y eût une luxation. Car la jambe droite, lorsqu'elle étoit placée à côté de la gauche, comme je l'ai déjà dit, lui étoit exactement parallèle, & se mainrenoit dans cet état, à moins que le malade ne remuât le corps, soit en dormant, soit de toute autre manière, en sorte que le mouvement fût communiqué à la jambe. Mais on remarquoit toujours que le gros orteil étoit tourné en-dedans & le talon en-dehors; il pouvoit cependant être replacé sans la moindre difficulté & sans douleur, & seulement comme on auroit pu le faire à un membre qui auroit été dans un état de paralysie. Il y avoit donc lieu d'attendre que le repos & le tems rétablissent la liberté & la force du membre; plusieurs jours s'étant passés, sans aucun changement, je donnai un fort purgatif, & je le fis répéter tous les deux ou trois jours pendant quelque tems, pour affoiblir les muscles, afin de pouvoir mieux reconnoître l'état actuel des parties; car quoique cet homme fût d'une stature moyenne, il étoit très-charnu, & les muscles fessiers étoient trop épais pour qu'on pût s'assurer distinctement de ce qui étoit au-dessous d'eux. Ce moyen remplit mon attente; car en répétant souvent les purgatifs & à de courts intervalles, en lui prescrivant un régime rigide & en le faisant tenir au lit, il devint si maigre qu'on sentoit la tête du

E c ij

Année 1760
Vol. LI.

Année 1760.
Vol. LI.

fémur à travers les muscles, & qu'on reconnut que cet os étoit disloqué en arrière, étant fixé dans l'espace qui est entre l'*ischium* & le *sacrum*.

Les mêmes chirurgiens qui l'avoient déjà examiné furent encore appelés le 25 Septembre, & ils furent convaincus que l'os de la cuisse étoit disloqué & qu'on sentoit sa tête à travers les muscles fessiers dans l'espace qui est entre l'*ischium* & le *sacrum*.

Ce qui avoit sans doute d'abord induit en erreur, c'étoit la situation de l'os qui permettoit au membre des mouvemens plus étendus que par-tout ailleurs; c'est aussi ce qui explique le parallélisme du membre comparé à l'autre, quoique la luxation eut lieu.

Mais en faisant exécuter de légers mouvemens de rotation en-dedans & en-dehors, pendant qu'un aide tenant sa main sur la tête de l'os, on sentoit un craquement qui étoit sensible pour le malade & pour les assistans, c'est ce qui nous surprit d'abord; mais comme on n'entendoit point de craquement, à moins qu'on ne presât fortement la tête de l'os, en même tems qu'on lui faisoit exécuter des mouvemens de rotation, & comme on sentoit que la tête du fémur suivoit exactement les mouvemens de rotation qui étoient imprimés à la cuisse, nous fûmes portés à conclure qu'il n'y avoit rien autre chose que la tête du fémur qui portoit contre les rebords de l'*ischium*.

Nous nous déterminâmes donc à faire l'extension, & dans cette vue le malade fut placé sur les pieds du lit en mettant le pilier du lit entre ses cuisses, après avoir eu soin de l'envelopper avec du linge, pour qu'il ne blessât pas la peau de ces parties. On attachâ une serviette autour de la jambe vers la cheville, & deux aides furent employés à tirer avec force, pendant qu'un troisième tournoit le genou en-dehors; & pendant ce tems, je pressois en bas la tête de l'os avec ma main. Aussi-tôt que l'extension commença, je sentis que la tête du fémur glissoit au-dessous de ma main, & j'eus à peine le tems de le dire qu'on entendit un éclat que le malade lui-même éprouva, & qui fut entendu de tous les assistans, ce qui annonçoit la réduction de l'os.

Pendant que le malade étoit placé sur son dos au-dessus du lit, la jambe droite paroissoit un peu plus longue que l'autre; mais il paroît que cet effet étoit dû aux muscles qui, à cause des tiraillemens qu'ils avoient éprouvés durant l'extension, n'avoient pas assez de force pour remettre le fémur au fond de la cavité coryloïde.

Dans six ou sept jours le malade se trouva très-bien, & fut en état de marcher avec des béquilles, & d'appuyer une partie considérable du poids de son corps sur la jambe droite, & depuis cette époque il recouvra très-promptement ses forces,

Année 1760.
Vol. LI.

& il a eu autant de force dans cette jambe & cette cuisse, que dans celles de l'autre côté, sans la moindre différence, ni pour la longueur, ni de toute autre manière.

Lettre à M. Huxham.

JE vous envoie, Monsieur, l'exemple précédent, parce que je fais que des chirurgiens qui ont même un grand nom, prétendent que la luxation de la tête du fémur est comme impossible, & que ce qu'on a pris en général pour une luxation de cette articulation, est une fracture du cou du fémur.

Il est sans doute probable que cette fracture a plus souvent lieu qu'une dislocation; mais le cas ci-dessus apprend que celle-ci peut arriver, & même sans une violence extraordinaire, pourvu que cette force soit convenablement appliquée. Il est vrai qu'une force dirigée sur la cuisse de haut en bas peut à peine produire cet effet, & qu'une force de bas en haut, en portant la tête du fémur contre la partie supérieure de la cavité cotyloïde, a une grande tendance pour fracturer le cou du fémur qui est la partie la plus foible.

Mais quoiqu'il ne soit pas possible que le fémur soit luxé par aucune force appliquée dans une direction parallèle à celle de la cuisse, lorsque le

corps est droit, il n'est pas également impossible que la luxation ait lieu par une force appliquée dans une direction contraire. Car dans le cas ci-dessus, le coup a été reçu à la partie supérieure & postérieure de la cuisse dans une direction en-devant, par la roue de la chaise, & il doit avoir eu par conséquent la tendance de chasser la tête du fémur de sa cavité, & de la porrer en arrière où cette cavité est moins profonde qu'en-devant ou en-dessous. A la partie antérieure il y a encore un creux plus considérable, & par conséquent il faut moins de force pour produire une luxation dans ce sens & plus spécialement, parce que de ce côté-là il y a moins de muscles qui résistent.

Il a été peut-être heureux pour le malade que je me sois trompé d'abord sur l'existence de la luxation; car si je l'eusse crue certaine, j'aurois employé toutes les méthodes possibles de réduction, & il y a apparence que pendant que les muscles restoient dans leur force entière, & qu'ils se contractoient involontairement & avec violence, les fibres musculaires, par des extensions extrêmes, auroient pu se rompre avant que de permettre l'extension, & dans ce cas l'homme auroit pu rester boiteux toute sa vie, pendant que maintenant, quoiqu'il se soit écoulé vingt-cinq jours depuis l'accident, ses muscles ont été si affoiblis, soit pour avoir gardé le lit, soit pour avoir fait usage de pur-

E e iv

Année 1760.
Vol. LL

Année 1760.
Vol. LI.

gatif répétés, que la réduction s'est effectuée avec autant de facilité que lors d'une luxation de l'humérus.

Ne seroit-ce point un moyen pour réduire les luxations de l'humérus qui ne peuvent céder à aucune méthode d'extension, que de recourir à un usage fréquent de purgatifs forts pour affoiblir des sujets qui ont des fibres musculaires qui opposent une résistance extrême à la réduction?

ARTICLE XVIII.

*Opération remarquable faite sur un bras fracturé;
par M. Charles White, chirurgien de Manchester.*

Année 1760.
Vol. LI.

ROBERT ELLIOT, âgé de neuf ans, eut le malheur de faire une chute vers le milieu de l'été de l'année 1759, & de se fracturer l'humérus vers le milieu de l'os. On fit venir aussi-tôt un renoueur qui appliqua un bandage & des attèles au bras fracturé, & qui traita le malade aussi-bien qu'il lui fut possible pendant deux ou trois mois. Ses efforts cependant ne produisirent point l'effet désiré, puisque les parties fracturées n'étoient point réunies. Un chirurgien de réputation fut ensuite appelé, mais voyant qu'il ne pouvoit être d'aucune

utilité, & comme le cas étoit très-curieux, il conseilla aux amis du blessé de l'envoyer à l'infirmierie de Manchester, & l'enfant y fut envoyé vers Noël. En l'examinant nous trouvâmes que c'étoit une fracture oblique simple, & que les extrémités de l'os chevauchoient l'une sur l'autre. Son bras ne lui étoit pas seulement inutile, mais même un fardeau d'autant plus qu'il y avoit peu de probabilité que les parties fracturées se réunissent, puisqu'il s'étoit déjà passé six mois depuis l'accident.

On proposa donc l'amputation comme le seul moyen de soulagement; mais je ne pus y donner mon consentement, car comme le sujet étoit jeune, & qu'il étoit d'une bonne constitution, il ne paroïssoit pas qu'il y eût aucun vice dans les solides ou les fluides, mais que la nature avoit été dérangée dans son travail par des frottemens répétés durant la formation du calus, ou plutôt que les extrémités de l'os étant rudes, avoient divisé une partie du muscle, & que quelque portion s'étoit probablement insinuée entre les parties fracturées, ce qui empêchoit leur réunion. Quoi qu'il en fut je pensai que le jeune homme ne pouvoit être soulagé que par l'opération suivante : c'étoit de faire une incision suivant la longueur de l'os, de faire sortir une des extrémités de l'os, ce qui étoit facile, d'autant mieux que le bras étoit flexible, de retrancher l'extrémité oblique, soit avec une

Année 1760.
Vol. II.

scie, soit avec des tenettes, de faire sortir l'autre extrémité de l'os, d'y pratiquer la même opération, & ensuite de replacer les deux extrémités fracturées bout-à-bout, & de les traiter alors entièrement comme une fracture composée.

Les objections que d'autres chirurgiens firent à cette méthode de pratique, furent, 1°. le danger de blesser l'artère humérale avec le bistouri; 2°. la lacération de l'artère en faisant sortir au-dehors les extrémités des os; 3°. le défaut d'autorité pour faire une semblable opération. Il étoit aisé de répondre à la première objection, en faisant l'incision au côté du bras opposé à l'artère humérale. Le lieu d'élection me paroissoit être le bord extérieur & inférieur du muscle deltoïde, en ce que la fracture étoit très-près de l'insertion de ce muscle dans l'humérus. Par ce moyen le danger de blesser les vaisseaux étoit non-seulement évité, mais encore après l'opération, pendant que le malade garderoit le lit, on pouvoit empêcher le séjour de la matière, & guérir aisément la plaie en renouvelant l'appareil. La seconde objection ne paroissoit pas forte, quand on considéroit que dans les fractures composées, l'os est souvent poussé avec violence à travers les tégumens, & qu'il survient rarement une lacération de quelque artère considérable, & comme on procéderoit avec beaucoup de prudence & de circonspection, le danger paroissoit pouvoir être

évitée. La troisième & dernière objection n'est que celle qu'on fait à toutes les nouvelles découvertes dans les sciences.

Année 1764
Vol. LL.

La méthode que je proposois ayant été adoptée, elle fut faite en ma présence par un chirurgien très-habile, le 3 Janvier 1760. Le malade ne perdit pas au-delà d'une cuillerée de sang pendant l'opération, quoiqu'on ne fit point usage du tourniquet. Quand l'opération fut finie & l'appareil appliqué, le membre fut placé dans une espèce de boîte pour les fractures, & le blessé fut confiné dans son lit, & on suivit les autres préceptes de traitement qu'exige une fracture composée.

La plaie fut guérie dans presque une quinzaine de jours, lorsqu'un érysipèle se déclara & s'étendit lui-même sur tout le bras avec un certain gonflement. Cette nouvelle affection fut combattue avec des fomentations & un régime antiphlogistique, & la guérison eut lieu sans aucune autre interruption. Six semaines après l'opération le cal commença à se former, & dans peu de tems il eut pris de la fermeté; le bras étoit presque aussi long que l'autre, mais un peu plus petit, parce que la nutrition y avoit été gênée par la longue application du bandage. Le membre acquéroit de jour en jour des forces au moment où cette observation a été envoyée à la société royale.

ARTICLE XIX.

Exemple d'un jeune homme qui avoit perdu l'usage de ses mains en nettoyant du fil de laiton ; par M. S. More.

Année 1760.
Vol. II.

LES maladies auxquelles les ouvriers sont sujets par l'exercice de leur profession, ont donné lieu à divers écrits ingénieux, & c'est pour ajouter aux connoissances de ce genre que j'ai cru devoir publier le cas suivant ; car je suis convaincu que ceux qui ont occasion de fréquenter le peuple de cette cité, ont souvent vu leurs mains dans un état approchant de celui que je vais rapporter, quoique l'affection ne soit pas portée à un si haut degré que celle du jeune homme dont on va faire l'histoire.

Comme il y a lieu de croire que la maladie dont il est ici question, arrive souvent aux personnes qui sont occupées à la teinture, elles trouveront ci-après une méthode de traitement qui, avec la moindre dépense possible, leur sera toujours très-utile.

OBSERVATION.

Pour bien entendre le cas suivant, il est nécessaire de rappeler qu'en préparant le fil de

laiton pour les ouvriers en épingles, on le passe fréquemment à travers le feu, & qu'il se couvre ainsi d'une croûte qu'il est nécessaire d'emporter avant d'en faire usage, & c'est dans cette vue qu'on l'envoie aux teinturiers, qui le laissent exposé quelque tems à l'action d'une liqueur qu'on appelle couleur des Saxons (composée d'eau, d'huile de vitriol, d'alun, de tartre, &c.) & en le jetant avec force trois ou quatre fois contre terre, la croûte se brise par degrés, & le fer devient brillant & propre à être employé. C'est aux apprentis qu'on confie ces soins, & c'est à cette occupation que François Newman, qui fait le sujet de cette observation, passoit souvent ses heures de loisir jusqu'au mois d'Août 1739, que la peau de la paume de ses mains & de l'intérieur de ses doigts devint si âpre & si roide, qu'il ne fut plus capable de se livrer à ce travail ni à tout autre. Il consulta plusieurs personnes pour se délivrer de cette incommodité, & il prit plusieurs fois des médicamens purgatifs, mais sans aucun succès. Il fut ensuite envoyé à l'hôpital Saint-Thomas où il resta six semaines ou deux mois sans recevoir aucun soulagement.

Année 1760.
Vol. LI.

Quelques-uns lui dirent que cette affection étoit due au scorbut auquel il avoit été sujet, & dans cette vue on lui donna plusieurs remèdes; entr'autres M. Ward lui administra des pillules,

Année 176c.
Vol. LI.

& une fois, par erreur, il en prit une dose double; ce qui opéra d'une manière si violente, qu'on crut qu'il ne survivroit pas à l'action de ce remède; cependant cet effet cessa, mais la maladie n'en fut pas diminuée. Croyant alors que le séjour de l'hôpital le mettroit plus à portée de guérir en y restant plus longtems, il s'y détermina & continua le traitement pendant plus de deux mois; mais à cette époque son état n'avoit pas changé en mieux; ce qui fit qu'il se retira.

Quinze jours après on m'écrivit pour m'engager à le voir, en ajoutant qu'il s'étoit empoisonné les mains avec le laiton & l'huile de vitriol. Quand je le vis, pour la première fois, je lui trouvai les mains entièrement roides & incapables de concourir à aucun travail; & comme il avoit déjà pris des avis de plusieurs personnes, & qu'il avoit usé d'une grande quantité de médicamens, il en conclut que sa maladie étoit incurable, & qu'il perdrait entièrement l'usage de ses mains, la peau de la paume, sur-tout de la main droite, ayant exactement l'apparence d'un parchemin avec des élévations; & lorsque je voulus redresser ses doigts par force, le sang jaillit de chaque jointure.

J'imaginai alors que comme la maladie avoit été contractée en plongeant plusieurs fois les mains dans une liqueur acide forte, le moyen le plus probable de produire du soulagement étoit une

application d'un liniment émollient, mêlé avec une lessive alcaline. Dans cette vue je prescrivis le topique suivant :

Année 1769.
Vol. LI.

*Huile d'amandes douces, 4 onces,
Lessive de sel alkali fixe, 2 onces;
Mêlez le tout & faites-en un liniment.*

Je prescrivis au malade de faire des onctions fréquentes de ses mains avec cette substance savonneuse, & pour rendre l'application du liniment plus durable, de porter constamment une paire de gands.

Quatre jours après je trouvai que la peau étoit un peu assouplie, & que je pouvois lui faire étendre ses doigts avec moins de douleur qu'auparavant. Cela m'encourageoit à continuer l'usage du même liniment; mais comme il se plaignoit que cette application produisoit une douleur cuisante toutes les fois qu'elle avoit lieu, je pensai que l'addition de quelque jaune d'œuf pouvoit diminuer l'acrimonie du sel alkali, sans porter atteinte à l'efficacité du remède, & par conséquent je le composai de la manière suivante :

*Huile d'olive, quatre onces,
Lessive de sel alkali fixe, 2 onces;
Deux jaunes d'œuf;
Faites un liniment pour en user comme du précédent.*

Ce mélange ne produisant pas autant de douleur

Année 1760.
Vol. LL.

que le précédent, dont il avoit usé pendant trois jours, & le malade m'étant venu alors trouver, je reconnus que ses mains continuoient à être dans un meilleur état; que la peau qui s'étoit durcie s'écailloit, & qu'il se manifestoit au-dessous une autre peau plus flexible; les gerçures qui s'étoient formées se cicatrisoient, & l'usage des doigts commençoit à se rétablir. Encouragé par ce succès, le malade continua à user du liniment ci-dessus, & comme il n'avoit point exercé ses doigts depuis longtems, & que les jointures avoient en grande partie perdu la propriété de concourir au mouvement, je lui conseillai de joindre ses poings & d'étendre ses doigts plusieurs fois le jour.

Cette affection étoit si invétérée, & avoit, pour ainsi dire, pris des racines si profondes, que quoi-qu'elle fût diminuée d'une manière très-sensible par l'application du liniment, cependant, comme il avoit été continué pendant deux mois entiers, je crus qu'il falloit l'abandonner, & pour empêcher une rechûte je lui ordonnai l'onguent suivant :

*Axonge, 2 onces,
Un jaune d'œuf,
Huile de lavande, 5 gouttes;
Faites-en un onguent.*

Je lui prescrivis d'en oindre ses mains toutes les nuits en allant au lit; cet onguent a été continué

tinué environ un mois, & maintenant le jeune homme a pleinement repris l'usage de ses mains, étant devenu en état de continuer ses occupations.

Année 1760.
Vol. II.

Durant le cours des ses onctions, il n'a fait usage d'aucun remède interne; il a pris seulement trois purgatifs.

A R T I C L E X X.

*Os trouvé dans le bassin d'un homme à Bruxelles;
par M. Brady, docteur-médecin.*

Le corps concret extraordinaire dont on vient de parler pesoit 10 onces; il avoit toutes les apparences extérieures d'une substance osseuse, avec la dureté, la solidité & la gravité spécifique d'un os ordinaire. Il étoit marbré, & on pouvoit distinguer les particules primitives de l'os qui étoient plus blanches & plus dures que les autres parties. Il s'étoit porté à l'extrémité inférieure du méso-colon, & probablement il avoit été entraîné par son propre poids dans le bassin, où il n'avoit contracté aucune adhérence ni connexion avec les parties adjacentes; mais il étoit enveloppé avec sa propre membrane ou son périoste entre le pubis & la vessie un peu au côté droit. Il étoit joint au mésentère par une substance compacte, membraneuse & glanduleuse, & avoit la forme d'un

Année 1760.
Vol. II.

Année 1760.
Vol. II.

cône renversé, dont la pointe étoit fottement insérée dans la cavité observée à son extrémité; on voyoit des fibres membraneuses qui étoient changées en os & *vice versu* des fibres des os qui avoient dégénéré en membranes charnues. On n'observoit point de substance cartilagineuse intermédiaire. En élevant ce corps conique avec peu d'effort, l'os suivoit, à la grande surprise de tous les spectateurs, après quoi on ne fit point de recherches ultérieures à l'égard des autres viscères de l'abdomen. Il faut seulement remarquer que l'épiploon étoit presque consumé, & que le mésentère étoit très-enflé & très-squitrueux.

L'homme dans le cadavre duquel on trouva cette concrétion étoit âgé de 55 ans, & il avoit été pendant longtems militaire. Il avoit été fort & robuste jusques vers l'âge de 50 ans; il commença alors à se plaindre d'une dureté dans le ventre, & alternativement d'une suppression d'urine dont il se délivroit en se tournant un peu du côté droit, & en restant couché sur sa face. Dans cette position, la concrétion ne pressoit plus sur la vessie. Il n'abandonna ses occupations militaires que sept jours avant sa mort.

« Nous avons plusieurs exemples de membranes ossifiées, ainsi que de diverses autres parties molles du corps, mais je ne crois pas qu'il y ait d'exemple d'une production aussi monstrueuse.

Il y a environ 20 ans que je vis à Mantoue deux pouces de l'aorte ossifiés dans un homme qui avoit été tourmenté pendant longtems d'une palpitation du cœur.

Année 1760.
Vol. LI.

ARTICLE XXI.

Lettre de Thomas Woleomb, chirurgien, à M. Huxham, sur une plaie d'arme à feu qui devint mortelle.

LE 17 Décembre 1763, je fus appelé pour donner du secours à un jeune homme de 25 ans qui venoit de recevoir une blessure considérable par un coup de fusil parti involontairement & chargé de petit plomb; comme cette arme étoit peu éloignée de son bras, elle avoit agi avec violence & fait un très-grand trou à travers les muscles biceps & le brachial interne, avoit découvert l'os de l'humérus, & enfin avoit pénétré à travers tout le bras de bas en haut.

Année 1770.
Vol. LX.

Lorsque j'arrivai, ce qui étoit immédiatement après l'accident, je ne trouvai que peu ou point d'hémorragie, ce qui me fit juger que l'artère humérale n'avoit point été divisée. En examinant la blessure, & n'y trouvant point de substance étrangère, mais un passage perméable à la sonde, je

F f ij

Année 1770.
Vol. LX.

panfai la plaie avec de la charpie sèche, un digestif, &c., prescrivant cependant de tenir le bras enveloppé dans un cataplasme chaud fait avec du gruau d'avoine, de la bière vieille & une assez bonne quantité d'huile. En revenant le soir je trouvai que le malade étoit assez bien, mais en appliquant mes doigts sur l'artère du poignet du même côté, je ne fus pas peu alarmé de n'y point apercevoir la moindre pulsation. Il étoit facile d'en soupçonner la cause; il y avoit lieu de penser que l'artère avoit été divisée, & s'il en étoit ainsi, le membre ne pouvoit guères être conservé.

Je fis ce rapport aux amis du malade; cependant comme des symptômes menaçans ne se déclaroient point, je voulus voir si l'artère avoit été divisée & si le sang, de même qu'après l'opération de l'anévrisme, ne trouveroit point un passage par les branches collatérales pour conserver la circulation dans cette partie. Je fus porté d'autant plus à le croire qu'il n'y avoit point eu d'hémorragie par la plaie, & que le cours de la circulation pouvoit avoir été empêché seulement par quelque contraction spasmodique qui pouvoit cesser vers le matin, & dans tout événement je jugeai qu'il étoit prudent d'attendre. Je panfai donc la plaie avec un petit digestif chaud, après avoir fomenté convenablement le membre, & je recomandai qu'on renouvelât le cataplasme comme ci-devant. Il n'y

avoit que peu ou point de tension ; néanmoins pour la prévenir, ayant d'ailleurs à attendre une fièvre symptomatique, & remarquant que le pouls commençoit à s'élever, je fis pratiquer une saignée copieuse, & je laissai le tourniquet autour du bras, après avoir donné des avis convenables aux gardes-malades de peur d'une rupture soudaine de quelque vaisseau sanguin durant la nuit.

Le lendemain je trouvai le malade assez bien ; mais son pouls étoit très-vif & très-fort, & on ne sentoit point encore aucune pulsation dans l'artère radiale du bras blessé. L'aspect de la plaie étoit très-bon, & il n'y avoit point de tension autour. Cependant comme c'étoit toujours un point difficile à déterminer que de savoir si l'artère avoit été divisée ou non, & en conséquence s'il étoit plus prudent dans cette supposition de procéder à l'amputation ou de courir le risque de la gangrène, je jugeai convenable de prendre l'avis de mes confrères, & je fis appeler trois chirurgiens des plus expérimentés de la ville.

Ils furent tous d'avis que s'il n'y avoit point des symptômes imminens, il étoit plus prudent d'attendre encore, jugeant avec raison que si la gangrène devoit avoir lieu par le défaut seul de circulation du sang dans le membre, on pourroit facilement y remédier par une amputation faite au-dessus, au moment que la mortification se déclara.

Année 1770.
Vol. LX.

reroit. La plaie fut donc pansée de la même manière, mais on fit de nouveau une saignée au malade, & on lui donna un doux lénitif qui fit pousser quelques selles. Le soir les symptômes étoient à-peu-près les mêmes; le pouls étoit encore fort & accéléré, & la saignée fut répétée.

Le lendemain tout paroissoit prendre une bonne tournure; le pouls étoit plus calme; une suppuration de bonne qualité avoit lieu; on n'observoit point de tension dans le membre, & tout se passa bien les trois ou quatre premiers jours. Pendant tout ce tems on n'observoit point la moindre pulsation dans le membre blessé; on y sentoît toujours une chaleur douce, & le malade ne se plaignoit que d'un engourdissement & d'une sorte d'état de mort du petit doigt & du doigt annulaire.

Toutes ces circonstances favorables me portèrent à croire que tout le danger étoit passé, lorsque le 5^e ou le 6^e jour de l'accident, la plaie prit un mauvais aspect & une couleur d'un bleu leucophtegmatique; la matière de l'écoulement devint plus limpide & plus sereuse, & plusieurs *fungus* très-considérables commencèrent à végéter de la surface de chaque blessure; tout le membre, soit au-dessus, soit au-dessous de la plaie, s'engorgea & se tuméfia beaucoup, & la main, ainsi que l'avant-bras, devinrent œdémateux, le pouls étoit

accélééré & déprimé , & le visage qui étoit auparavant d'un rouge fleuri , devint pâle & défiguré.

Année 1770.
Vol. LX.

Ces symptômes alarmans me firent naître les plus justes craintes pour l'avenir , & pour y obvier , autant qu'il m'étoit possible , je prescrivis le quinquina en décoction & en substance de deux en deux heures , & je demandai une nouvelle consultation de chirurgiens. L'amputation ne paroissoit plus praticable , en ce que la distension du membre s'étendoit presque jusqu'à l'aisselle. Nous continuâmes par conséquent l'usage des fomentations , des topiques chauds , &c. en répandant de la poudre d'angélique sur les *fungus*. Nonobstant cela , ces végétations continuèrent à s'élever , & quoique à chaque pansement j'eusse soin d'emporter avec le bistouri tout ce qui étoit mort , mes efforts pour les supprimer furent vains.

L'état du malade se maintint ainsi jusqu'au premier Janvier , qu'il commença à se plaindre d'un grand sentiment de froid , & malgré les médicamens les plus chauds & les plus toniques , sa mauvaise situation empira de plus en plus , & il périt du 11 au 12 du même mois ; ni avant , ni après la mort , on ne découvrit aucune apparence de mortification.

Cependant pour rechercher , s'il étoit possible , la vraie cause de cette mort , & pour reconnoître

point avoir un plus bel aspect, & la suppuration être d'une meilleure qualité.

Année 1770.
Vol. LX.

Par des saignées répétées, des doux cathartiques & des topiques relâchans convenables, la tension s'étoit heureusement dissipée; il ne s'étoit déclaré que peu ou point de fièvre symptomatique, & on paroissoit avoir obvié à tous les symptômes d'un mauvais présage. De quelle manière donc devons-nous expliquer la mort qui est survenue, puisque le blessé n'avoit éprouvé ni hémorragie, ni convulsion, ni gangrène? Et que peut-on supposer avoir empêché l'hémorragie, puisqu'on découvroit si manifestement une ouverture à travers les tuniques de l'artère?

ARTICLE XXII.

Extrait d'une lettre de M. Latham, chirurgien & accoucheur à Dartford, à M. Warner, membre de la société royale.

UN homme âgé de 55 ans & d'une constitution saine avoit été attaqué de la fièvre vers l'âge de 35 ans, époque à laquelle il embrassa la profession de meunier. Les travaux auxquels il se livroit l'obligeoient souvent à s'échauffer beaucoup, & le forçoient de vivre continuellement

Année 1770.
Vol. LX.

Année 1770.
Vol. LX.

dans une atmosphère de poussière. Aussi-tôt qu'il recommençoit ses occupations, sa poitrine étoit oppressée, avec la sensation d'un souffle qui s'étendoit sur tout son corps; il fut délivré de tems en tems de ces symptômes en interrompant l'exercice de sa profession. Le premier rhume dont il avoit été attaqué au commencement de ce genre de travail avoit été suivi de la fièvre, qui, en général, avoit eu un ou deux retours durant l'année, surtout en automne & quelquefois au printemps. Après avoir continué son commerce quatre ou cinq ans, il l'abandonna, parce qu'il ne douta point que les incommodités qu'il éprouvoit ne dussent être attribuées principalement à la poussière de la farine.

Quoi qu'il en fût sa fièvre devint moins violente peu-à-peu; mais l'épiderme continua toujours à s'enlever comme précédemment; quant aux particularités de ses affections, voici quelle étoit leur nature. Il éprouvoit d'abord une fièvre violente accompagnée de douleurs à la tête, au dos, aux membres avec des bâillemens & des pandiculations; il vomissoit quelquefois beaucoup de bile, & d'autrefois peu ou point du tout; sa peau étoit sèche, sa langue chargée, avec une soif extrême, le ventre constipé & l'urine fortement colorée. Au commencement de la fièvre, on le saignoit en général; cette évacuation produisoit quelque soulagement, & en tenant le ventre libre, au moyen

des rafraîchissans, les bâillemens avec les pandiculations se calmoient dans cinq ou six jours; toute la surface du corps prenoit une teinte-jaune, quoique cette circonstance n'eût pas cependant toujours lieu. Après cela le visage prenoit une couleur fleurie, & le malade éprouvoit un grand mal-aise pendant plusieurs jours, avec un engourdissement & un tintement sur tout le corps; ce qui se terminoit par une évacuation d'urine qui déposoit un sédiment épais.

Vers le commencement de la troisième semaine, à compter de la première attaque, l'épiderme paroissoit s'élever en plusieurs endroits. Huit ou dix jours après la sur-peau devenoit si lâche qu'on pouvoit aisément l'éloigner en grandes vésicules; l'épiderme des mains, depuis les poignets jusqu'à l'extrémité des doigts, se détachoit entièrement, & offroit la forme d'un gant. Il ne fut jamais disposé à suer dans aucune période de sa maladie, & quand on essayoit d'exciter la sueur par des remèdes, son état empirait, & il n'éprouvoit jamais un bien être que lorsque son urine avoit déposé son sédiment; après quoi il n'éprouvoit d'autre incommodité que celle qui provenoit du peu de souplesse de sa peau. On n'a point vu ses ongles tomber.

Je vous envoie, avec un des gands humains, dont je viens de parler, un autre objet

Année 1770.
Vol. LX.

qui n'est pas d'une moindre curiosité; c'est un petit fœtus venu au monde en même tems qu'un autre fœtus parvenu à terme. La femme avoit accouché avant mon arrivée. En examinant le placenta j'y crus découvrir quelque chose d'extraordinaire, & en le nettoyant j'y trouvai le fœtus dont je viens de parler. Il n'avoit aucune communication sensible avec le placenta, mais il étoit applati & ridé, quoiqu'il ne fût nullement dans un état putride. Smellie rapporte un cas semblable pris des mémoires de l'académie des sciences. Ne peut-on point supposer que la femme avoit engendré des jumeaux, & que celui qui étoit mort n'avoit point été chassé de la matrice comme cela arrive souvent, mais qu'il y étoit resté jusqu'à l'époque de l'accouchement naturel de celui qui étoit encore en vie?

ARTICLE XXIII.

Cas extraordinaire d'une dame qui avoit avalé de l'euphorbe; par M. Willis de Lincoln.

Année 1760.
Vol. LI.

EN Décembre 1758, madame Willis de Lincoln tomba dans une fièvre lente, occasionnée par un défaut d'écoulement des lochies après ses couches, & par une redondance de sang pour

n'avoir point allaité son enfant. Le 18^e jour après son accouchement, par une erreur de sa garde, elle prit en place d'une potion qui lui avoit été prescrite, deux onces d'une teinture d'euphorbe⁽¹⁾. Les symptômes alarmans qui en furent la suite immédiate furent une suffocation violente, une ardeur brûlante & insupportable dans la bouche, le gosier, l'estomac; ils annoncèrent aussi l'erreur funeste qui venoit d'être commise. J'étois dans la chambre quatre ou cinq minutes après l'accident, ignorant sa nature & trouvant tout le monde en pleurs, & sans aucun espoir de produire du soulagement.

Dès que j'eus appris ce qui étoit arrivé, je pensai que l'eau chaude & l'huile étoient les moyens les plus appropriés pour corriger & chasser le poison. J'imaginai qu'une abondante quantité d'eau chaude feroit vomir probablement le malade, & aideroit en même tems à expulser la teinture caustique. J'étois sûr aussi que l'eau calmeroit en même tems la violence en la délayant & en précipitant la

Année 1769.
Vol. II.

(1) *Gum. euphorb. drach. 2, spirit. vin. rectif. uncias 2; solut. adde camph. drach. 1.* Le camphre avoit été prescrit pour affoiblir la qualité caustique de la teinture, qui ayant été appliquée à la jambe d'un cheval, sans le camphre, y avoit produit un escarre.

Année 1760.
Vol. LI.

gomme âcre qui étoit tenue en dissolution par l'esprit-de-vin, & que par-là elle préviendroit le contact immédiat de cette substance sur les membranes de l'estomac & les intestins dans un si grand nombre de points, & l'empêcheroit de pénétrer dans leur tissu intime, & d'y exercer leur pouvoir délétère.

Il y avoit heureusement une theière d'eau sur le feu, & je fis prendre immédiatement une grande coupe d'eau chaude : je fis répéter cette dose aussi promptement qu'il fut possible, en conjurant la malade de prendre la plus ferme résolution d'avaler ce liquide; ce qu'elle fit d'une manière à nous surprendre. Après la troisième prise, elle vomit très-copieusement; les matières rejetées avoient une très-forte odeur de camphre & sembloient contenir une grande quantité de teinture avec la gomme séparée du spiritueux. La malade but encore; mais elle se plaignoit d'une ardeur excessive & d'une douleur déchirante de l'estomac, poussant continuellement des cris, & disant qu'elle éprouvoit une brûlure mortelle.

J'eus recours par intervalles à l'huile, à la dose de deux ou trois onces à la fois, & je la gorgeai ainsi, tantôt d'huile, tantôt d'eau chaude. Les vomissemens furent encore très-copieux, & je fis répéter alternativement les boissons jusqu'au point de me faire conjecturer par la capacité des vais-

seaux, que la malade avoit pris huit pintes d'eau & une bouteille d'huile dans très-peu de tems (1).

Année 1760.
Vol. LI.

(1) Le docteur Sydenham ayant été appelé pour donner des secours à un homme qui avoit pris du sublimé corrosif environ une heure avant l'arrivée du même médecin, le poison affectant déjà les lèvres, &c. il prescrivit la boisson d'une grande quantité d'eau & des clystères copieux. Mais comme le sublimé corrosif doit être considéré comme poison dont l'acrimonie caustique consiste dans un principe salin, & que l'eau est le véhicule naturel des substances salines, on voit avec combien de raison Sydenham insistoit sur ce moyen. Les poisons d'une nature saline étant dissous dans les fluides de l'estomac & des intestins ne bornent pas leurs ravages à ces parties seulement, mais elles peuvent entrer dans les vaisseaux absorbans, & s'insinuent dans le cours de la circulation. L'eau est alors un bon antidote, puisqu'elle délaye de semblables substances, & que pénétrant toutes sortes de canaux, elle se fait jour hors du corps; mais il en est autrement des poisons gomme-résineux, comme l'euphorbe : puisque cette substance n'est pas dissoluble dans l'eau, elle ne peut pas être transmise au moyen de l'eau dans les vaisseaux absorbans & passer dans le sang, mais par son acrimonie elle ferme les orifices de ces canaux, & bouche leur passage; par conséquent il ne faut employer dans ce cas que l'huile, car la substance résineuse caustique de l'euphorbe étant précipitée & séparée de l'esprit, & disposée en flacons au moyen de l'eau, seroit propre à adhérer à la membrane nerveuse de l'estomac & des intestins, & par son intolérable acrimonie, causeroit des corrosions, des inflammations & la gangrène. Mais l'huile con-

Année 1760.
Vol. LI.

Imaginant que cette boisson délétère n'avoit pas agi assez longtems pour produire une violente inflammation ou excoriation, ou pour pénétrer dans le sang, les vomitifs & les purgatifs parurent les moyens les plus propres de sauver le malade, si on pouvoit attendre qu'il arrivât quelque malheureux événement dans une position aussi périlleuse. J'ordonnai donc un émétique doux où entroit l'ipécacuanha, & une mixture de blanc de baleine & d'huile prise de tems en tems, continuant toujours de faire prendre de l'eau & de l'huile. J'avois lieu d'attendre que l'émétique agiroit autant en bas que par le haut, & qu'il auroit l'avantage de débarrasser autant l'estomac des restes de la potion délétère, que d'entraîner par le bas ce qui auroit déjà passé au-delà du pylore par la contraction & l'agitation du ventricule depuis les vomissemens précédens. L'apothicaire s'opposa à l'émétique, en objectant le danger d'aggraver les effets du poison par un *stimulus* nouveau & une irritation accessoire. Quoique ses objections fussent sans force pour moi, cependant, craignant toujours les suites, je me désistai de mon avis.

tribue beaucoup à prévenir ces effets funestes, en émoussant l'activité corrosive de ce poison, en empêchant son adhésion aux membranes délicates de ces parties, & en expulsant les matières qui y sont contenues. Ces propriétés de l'huile la rendent très-utile dans d'autres espèces de poison.

Mon

Mon frère, voyant l'état pénible où je me trouvois, me demanda si je ne serois pas bien aise de me concetter avec M. Dymock; je répondis que je ne demandois pas mieux, & on l'envoya chercher. En même tems je fis insister toujours dans l'usage de l'huile & de l'eau qui provoqua de nouveau le vomissement; mais la malade se plaignoit toujours d'une ardeur brûlante dans l'estomac & les intestins. Son haleine, & tout ce qu'elle rendoit en vomissant, avoient une odeur forte de camphre, le pouls étoit peu accéléré. M. Dymock étant arrivé, je lui fis part de toutes les circonstances qui avoient précédé, & il ne balança pas de faire prendre aussi-tôt du vin d'ipécacuanha pour provoquer le vomissement; mais la malade se plaignit de plus en plus d'une ardeur brûlante qui lui fit desister l'usage de l'eau avant que l'émétique opérât. Cependant le remède agit d'une manière très-efficace, soit par le vomissement, soit par les selles, & sur-tout de cette dernière manière. La matière des déjections qui continua à être évacuée, pendant près d'une heure, sans aucune tranchée, découvrit manifestement le camphre & l'huile qui lui étoient mélangés. L'évacuation par l'anus diminua par degrés, & bientôt après l'ardeur brûlante de la région de l'estomac devint plus tolérable & se calma par degrés, le camphre n'étant plus d'ailleurs sensible, ni dans l'haleine,

Tome II. Chirurgie.

G g

Année 1760.
Vol. LI.

Année 1760.
Vol. LI.

ni dans les matières évacuées. On lui fit alors user pour boisson de l'eau simple, en y ajoutant un peu de lait.

Les forces que la malade avoit conservées, au moyen de l'irritation & du tumulte de la fièvre que la teinture caustique avoit excités, commencèrent alors à s'abattre, & ce fut avec difficulté qu'on la mit au lit; après qu'elle fut couchée, elle se plaignit du mal qu'elle éprouvoit dans les premières voies, & elle tomba dans des sueurs abondantes pendant quatre heures, ce qui la réduisit à un état extrême de débilité.

On donna un doux opiat qui produisit son effet, & après un sommeil de cinq heures, la malade s'éveilla & se trouva en bon état; elle prit encore une dose de mixture où entroit le blanc de baleine, & elle eut de nouveau un sommeil de trois heures. Elle se trouva alors débarrassée de toutes ses affections, la fièvre lente qui avoit précédé, aussi bien que les effets de la teinture vénéneuse ayant entièrement cessé.

Il faut observer que la malade se trouva successivement pendant quatre jours dans un état si marqué de calme & de tranquillité, que si elle n'eût jamais éprouvé aucun mal, & qu'elle jouit depuis cette époque d'un état parfait de santé.

J'ai cru devoir exposer l'histoire vraie de cet accident, d'autant mieux qu'on ne peut nier que

les progrès de l'art de guérir tiennent plus à la simple relation des faits qu'à des hypothèses ingénieuses. Voici les conclusions immédiates qui me paroissent devoir être tirées de l'observation précédente :

Année 1750.
Vol. LI.

1°. Que dans des cas où on a avalé des poisons, une administration prompte & résolue d'eau & d'huile à haute dose, paroît être le moyen le plus efficace d'en prévenir les suites pernicieuses, & qu'il est bien préférable à tant d'antidotes qu'on a vantés avec exagération.

2°. Qu'un émétique peut être administré en toute sûreté & même avec avantage, après que l'acrimonie du poison a été émoussée, & que les tuniques de l'estomac ont été défendues de son atteinte par un usage abondant d'eau & d'huile, plutôt que lorsqu'il a été immédiatement avalé.

3°. Que la fièvre lente & la redondance du lait, aussi bien que la matière vénéneuse surer, emportées par une évacuation copieuse excitée de la manière dont on vient de le dire ? Ne devrait-on point attendre un succès complet dans les fièvres occasionnées par des causes semblables, par la plénitude & l'obstruction, si on avoit recours à des évacuations abondantes produites par des délayants & des médicamens actifs suivant les mêmes vues.

4°. Sans doute que le camphre a été très-utile pour émousser les effets pernicioeux de l'enphorbe.

G gij

Année 1760.
Vol. LL.

pour détruire son acrimonie & amener les nerfs à une espèce d'insensibilité relativement à leur irritation; & par conséquent pour prévenir les affections spasmodiques. Nous avons essayé plusieurs fois la teinture d'euphorbe avec le camphre, appliquée sur la jambe d'un cheval, & nous avons reconnu qu'elle n'avoit point un effet aussi caustique que lorsqu'elle est employée sans le camphre. Il est bien connu que le camphre enveloppe les particules les plus actives, corrige l'acrimonie, & adoucit les effets des cantharides, du sucre de Saturne & des préparations mercurielles & antimoniales.

5°. On doit ajouter au camphre l'action de l'eau & de l'huile comme des moyens propres à corriger & à expulser en général les poisons, soit qu'elles émoussent leur acrimonie, qu'elles calment le système nerveux & qu'elles préviennent les affections spasmodiques & les convulsions, soit que par leur extrême subtilité elles puissent pénétrer tous les replis du corps & favoriser puissamment la transpiration insensible.

Ces trois corps simples, l'eau, l'huile & le camphre tiennent le premier rang parmi les antidotes jusqu'ici connus, soit pour l'usage interne, soit pour l'extérieur, & on doit bien plus compter sur leurs effets que sur tant de compositions si vantées qui ont été proposées par les anciens, comme la thériaque d'Andromaque, le Mithridate, &c.

N O T I C E

*Des Articles de Médecine & Chirurgie qui
n'ont pu entrer dans ce volume.*

A R T I C L E P R E M I E R.

*Exemple peu ordinaire d'une hémoptisie ; par
M. Darwin, M. D.*

CETTE hémorragie du sang par l'artère pulmonaire paroît différente de celles qui sont rapportées dans les ouvrages de médecine ; & d'après la connoissance de la cause il a été facile de procéder au traitement.

Un homme âgé d'environ 40 ans, maigre & pâle avoit été tourmenté par des maux de tête habituels pendant plusieurs années, & depuis quatre années il étoit devenu paralytique après avoir usé d'une grande quantité de quinquina. Il avoit cependant recouvert l'usage du bras droit, & il n'y conservoit qu'un peu de foiblesse, lorsqu'il fut attaqué soudainement environ à deux heures du matin à son réveil (le 7 Mai 1759) d'un cra-

Année 1759
Vol. XLI,

Année 1781.
Vol. LXXI.

chement de sang, de telle sorte qu'il rendit quatre ou cinq onces d'un sang fleuri.

On lui tira immédiatement douze ou quatorze onces de sang, & il fit usage d'un élixir de vitriol; il prit le soir un clystère & on lui tira encore dix onces de sang. Le lendemain il s'éveilla à la même heure que la nuit précédente, & il cracha la même quantité de sang. On lui conseilla alors d'augmenter la quantité d'élixir de vitriol, & il prit de six en six heures un bol où entroit le camphre; on lui appliqua aussi une sangsue sur une veine hémorroïdale qui étoit très-gonflée, & qui avoit paru depuis quelque tems après des efforts pour aller à la garde-robe.

Le 9^e, à la même heure, le crachement de sang se renouvela encore comme précédemment; ce qui faisoit voir que l'hémorragie provenoit de l'artère pulmonaire, plutôt que de l'artère bronchique, c'étoit, après ce crachement soudain, la quantité, la qualité fleurie du sang, son évacuation sans douleur & le défaut de matière phlegmatique.

Comme il n'y avoit point eu des symptômes fébriles, ni lors de son premier réveil, ni durant le jour, on ne le saigna plus; & comme il dormoit constamment d'un sommeil profond, depuis dix heures du matin jusqu'à deux, époque à laquelle le crachement se renouveloit, on lui con-

seilla de se faire éveiller & de se lever du lit à une heure du matin, & de rester levé jusqu'à trois heures, sans faire d'ailleurs d'autre remède. Il suivit ce conseil pendant une semaine, & après cela il prit l'habitude de se lever à la même heure; par-là il s'est non-seulement délivré de l'hémorragie, mais il a été exempt de toute évacuation par les vaisseaux hémorroïdaux; il a acquis plus d'embonpoint, & ses maux de tête ont beaucoup diminué. Il ne faut point omettre qu'on lui donna un émétique le 12 du même mois, & que ce remède fut répété deux fois dans l'intervalle de trois ou quatre jours.

Comme le malade, depuis son attaque d'hémiplégie, avoit vraisemblablement plusieurs parties du corps moins irritables que dans l'état naturel, & comme son sommeil étoit constamment très-profond & que l'hémoptysie l'éveilloit toujours après quatre heures de sommeil, j'ai été porté à conclure que les poulmons n'étoient point assez sensibles pour seconder la circulation, & que par-là le sang, en s'accumulant par degrés, rompoit quelques petites branches de l'artère pulmonaire avant que le mal-aise devint assez grand pour éveiller le malade, & autant qu'on peut tenir compte en médecine d'un fait particulier, le traitement heureux de ce cas semble établir la vérité de ce point de doctrine.

G g iv

Année 1719.
Vol. XII.

J'ajouterai seulement que l'anxiété qu'éprouvent des personnes très-foibles, lorsqu'elles s'éveillent, paroît être en général due à l'accumulation du sang dans les poumons, durant la diminution de leur sensibilité, & combien doit être pernicieuse dans ce cas l'administration de l'opium ou du nitre, pendant que le défaut du sommeil ou le retour de l'hémorragie paroissent demander leur secours.

ARTICLE II.

Extrait d'une lettre avec quelques détails sur la tarentule; par M. D. Cirillo, professeur d'histoire naturelle dans l'université de Naples.

Année 1770.
Vol. LX.

Le docteur Cirillo a eu occasion de soumettre à l'examen les prétendus effets de la tarentule dans la province de Tarento, où on trouve cet insecte en abondance, & il assure que ce qu'on a dit de la cure surprenante de sa morsure, par la musique n'est nullement vrai, & que c'est seulement une invention de quelques personnes pour gagner de l'argent, en dansant lorsque ce qu'ils appellent le tarentisme commence. Il ne doute pas que quelquefois la chaleur du climat ne contribue beaucoup à échauffer leur imagination,

& de les jeter dans une espèce de délire qui peut être en quelque manière guéri par la musique; mais on a fait différentes expériences avec la tarentule; & ni les hommes, ni les animaux, après cette morsure, n'ont offert aucune autre affection qu'une inflammation légère sur la partie, de même que celle qui est produite par la morsure d'un scorpion, qui se dissipe sans le moindre danger.

En Sicile où l'été est encore plus chaud que dans aucune partie du royaume de Naples, la tarentule n'est jamais dangereuse, & la musique n'est jamais employée pour la guérison du prétendu tarentisme. Il doit paraître étonnant qu'un médecin aussi éclairé que Baglivi (1) ait pu ajouter foi à cette maladie, & qu'au lieu d'examiner le fait par des expériences, il ait au contraire cherché à en donner la raison; mais les philosophes même, lorsqu'ils trouvent des faits étonnans & extraordinaires, & même contraires à la raison; ont coutume de les prêter comme s'ils étoient vrais, & tâchent d'en découvrir la cause. Chaque année cette prétendue affection acquiert

Année 1770.
Vol. LX.

(1) *Note du traducteur.* Dans une nouvelle édition que j'ai donnée de l'ouvrage de Baglivi, j'ai eu soin d'ajouter quelques notes critiques sur les effets de la morsure de la tarentule.

Année 1770.
Vol. LX.

moins de fondement, & il est vraisemblable que dans peu de tems elle tombera entièrement en discrédit. Tous les médecins de Naples regardent la tarentule sous le même point de vue, sur-tout depuis que le docteur Serao a publié un ouvrage ingénieux sur cet objet; ce dernier a fait voir en effet par diverses expériences que la morsure de la tarentule n'avoit jamais produit des effets pernicieux, & que la musique n'a eu jamais rien de commun avec elle.

ARTICLE III.

Abcès au foie avec des calculs dans la vésicule du fiel & la réunion des reins; par M. Edw. Tyson.

N°. 142.

Le lobe du foie qui étoit au côté droit paroissoit décoloré, & en y faisant une incision, il coula une grande quantité de pus très-fétide; cette matière purulente n'étoit point contenue dans un kyste particulier, mais dans divers sinus de cette parrie du foie. Le malade deux ou trois fois éprouva dans des intervalles considérables, des accès qui ressembloient à ceux d'une fièvre intermittente; il avoit été aussi sujet à la jaunisse.

On fut fort surpris de voir aussi une stricture contre nature & une réunion des deux reins dont

le parenchime de l'un se continuoit au-dessus de l'épine jusqu'à l'autre, de sorte que par leur réunion, ils formoient une espèce de corps semi-lunaire. Ils étoient très-gros & la pattie qui les réunissoit étoit un peu moins grande que les vrais reins.

N°. 141.

ARTICLE IV.

Examen anatomique du corps d'une dame morte d'une attaque d'apoplexie ; par M. G. Cole.

CETTE dame avoit éprouvé depuis quelques années des symptômes d'hysterie, quelquefois avec une hémorragie abondante du nez. On avoit beaucoup employé la saignée ; le jour qui précéda sa mort, elle avoit éprouvé une tendance marquée à son hémorragie ordinaire, & elle s'efforça de combattre cette disposition. Les remèdes qu'elle employa ne furent que trop efficaces pour arrêter l'écoulement du sang, mais le soir en se couchant elle fut frappée d'une hémorragie mortelle.

N°. 173.

A l'ouverture du cadavre on trouva que les vaisseaux sanguis, sur-tout du lobe droit du cerveau étoient très-distendus, & en les ouvrant on vit s'écouler une grande quantité de sérosité. En incisant la substance du cerveau, il se présenta un grand grumeau de sang coagulé qui pèsait environ

N°. 173.

une once & demie, & qui avoit formé une cavité proportionnée à son volume. Le lobe gauche du cerveau, non plus que ses vaisseaux, ne paroissoient nullement distendus.

ARTICLE V.

Exemple d'une paralysie périodique; par M. Musgrave.

N°. 141.

C'ÉTOIT une fille de 21 ans, d'une complexion sanguine; elle avoit pris pendant plusieurs jours moins d'exercice qu'à son ordinaire, & après cela elle avoit perdu l'usage de la parole & de ses jambes; la sensibilité étoit entièrement détruite dans ces parties. La saignée qui paroissoit indiquée fut sans efficacité. M. Musgrave administra le sel ammoniac succiné, les martiaux avec la gentiane, l'ambre, le castoreum & d'autres remèdes échauffans. On appliqua un vésicatoire sur le cou. Un bain d'absinthe & d'autres plantes aromatiques, administrés aux extrémités inférieures, des onctions faites avec *Pungentum martiatum* après le bain, rendirent l'usage de la parole dans trois jours, & dans peu de tems la malade fut en état de marcher avec des béquilles. Les remèdes ayant été suspendus, la maladie se renouvela & fut encore

guérie par les mêmes moyens; après plusieurs alternatives de ce genre, la malade s'éloigna du médecin qui n'en entendit plus parler. N^o. 242

ARTICLE V I.

Convulsion invétérée des muscles du cou; par M. Tuberville.

UN homme avoit éprouvé depuis longtems des retours d'une grande douleur & d'une convulsion des muscles du cou. En appliquant une ventouse sur l'endroit même, en faisant succéder des scarifications & appliquant un emplâtre de *diapalma*, la guérison fut complète. N^o. 164.

ARTICLE V I I.

Exemple d'un homme qui ne devenoit aveugle que le soir après le coucher du soleil; par M. Parham.

RIEN n'annonçoit aucune affection de la tête; la maladie étoit la même en été qu'en hiver, & n'éprouvoit aucun changement, soit que le jeune homme se livrât au travail ou non. On ne parle pas qu'on ait eu recours à aucune méthode de traitement. N^o. 159.

ARTICLE VIII.

Duplicité de la vision & goutte sereine survenue après de grandes douleurs de tête & des convulsions; par M. Briggs.

N°. 159.

DES pillules caphaliques, un électuaire anti-épileptique, la saignée à la jugulaire, l'application des sangsues aux veines hémorroïdales, l'attention de lui raser la tête & d'appliquer des vésicatoires au cou, &c. furent sans effet.

ARTICLE IX.

Expérience sur la surdité; par M. Holder.

N°. 160.

ON confia à ses soins un jeune homme qui étoit sourd depuis l'âge de 10 à 11 ans. Après un examen attentif, M. Holder crut voir qu'il n'y avoit aucun vice dans le nerf auditif, & que l'affection consistoit seulement dans un relâchement de la membrane du tympan ou dans le défaut d'action du petit muscle qui sert à la tenir dans un état de tension. D'après ces considérations il conseilla l'usage de quelques fumigations astringentes & toniques. En même tems il fit employer comme moyen subsidiaire l'action d'un son

fort & violent comme celui d'un tambour. Il arrivoit en effet que pendant que le tambour battoit, l'homme entendoit ceux qui lui adressoient la parole, & quand le même son cessoit il n'entendoit plus personne. Cette expérience fut souvent répétée avec le même succès. L'auteur parle aussi d'une personne qui paroissoit être dans le même cas, & qui étoit sourde dans l'intérieur de sa maison, pendant qu'il entendoit bien dans les rues très-fréquentées de Londres. N°. 36.

ARTICLE X.

Exemple d'un polype du nez; par M. Giles.

M. GILES avoit été appelé pour donner ses soins à un homme qui avoit un polype dans la narine droite. Il l'arracha, en produisant une vive douleur, mais sans aucun accident. Après cette extraction on trouva qu'il restoit encore dans la luette une grosseur semblable à celle de la moitié d'une noix, qu'on jugea avec raison être une portion du même polype; on en fit aussi l'extraction. Deux ans après le malade étant mort d'une fièvre maligne, on ouvrit son corps & on ne trouva dans le nez qu'une petite masse charnue qu'on suivit dans son trajet, & qui aboutit enfin N°. 226.

N°. 226.

dans le sinus maxillaire supérieur. On rompit ces os, & on trouva dans son sinus une matière claire & gluante du milieu de laquelle s'élevoit un corps qui étoit semblable pour la figure, la consistance & la couleur au premier polype du nez dont on avoit fait l'extraction.

Quand les polypes sont très-rouges & pleins; l'extirpation est alors dangereuse, puisqu'elle peut causer une hémorragie difficile à arrêter; il faut donc alors les attaquer par les caustiques.

ARTICLE XI.

*Preuves en faveur de l'usage de la laryngotomie;
par M. G. Musgrave*

N°. 278.

CETTE opération doit être appliquée lorsque le malade est menacé d'une suffocation imminente, puisqu'elle ouvre promptement un nouveau passage à l'air qui sert à la respiration. L'auteur rapporte en faveur de la laryngotomie l'exemple d'un homme auquel des assassins avoient coupé le larynx en travers & qui guérit très-bien, au moyen d'une suture & d'un traitement méthodique.

ARTICLE

ARTICLE XII.

Exemple d'un polype des poumons ; par M. Buffière.

UN enfant de cinq ans étoit sujet à des quintes d'une toux sèche, & à des alternatives d'un léger crachement de sang. Dix à douze jours avant sa mort, la femme qui le gardoit dit qu'il avoit craché certaines pellicules épaisses. Son médecin en ayant examiné une, il trouva qu'elle étoit de la consistance & de la forme d'un vaisseau, ce qui lui fit d'abord faussement juger que c'étoit quelque vaisseau pulmonaire. L'enfant étant mort, on ouvrit son corps & on trouva que l'intérieur de la trachée-artère étoit incrusté d'une membrane visqueuse qu'on détacha de cette cavité & de ses ramifications, en sorte que cette pellicule imitoit la trachée-artère & toutes les ramifications des artères-bronchiques. Elle adhéroit à la tunique interne de la trachée-artère par de petits filamens qui étoit si tendres, qu'ils se déchiroient aisément; ce qui fit juger que ce n'étoit qu'une humeur lymphatique qui se dégorgeoit par les glandules de la trachée-artère, & qui s'étant épaissie par un état morbifique, avoit été réduite à une sorte de gelée par le dessèchement qu'avoit produit l'air respiré;

Tome II, Chirurgie.

H h

Nº. 263.

N°. 263.

ce qui avoit empêché qu'elle ne fût crachée. Elle s'étoit épaissie peu-à-peu jusqu'à ce qu'enfin elle causa une quinte de toux qui étouffa le malade. Cette membrane contre nature n'étoit point soluble dans l'eau chaude.

ARTICLE XIII.

Cure infaillible de la dyssenterie; par M....

N°. 318.

ON regarde l'ipécacuanha comme un remède infaillible de la dyssenterie, quelque invétérée qu'elle puisse être; on doit seulement excepter les malades qui ont des affections des poudrons, ou des symptômes d'hydropisie, avec des signes d'une mort prochaine; & ceux dont les intestins sont frappés déjà de gangrène, ce qui s'annonce par le hocquet, le vomissement & la cessation d'une douleur vive du bas ventre, &c. L'auteur combine l'ipécacuanha, tantôt avec les martiaux & les aromatiques, tantôt avec les purgatifs.

On voit que ce remède est annoncé avec un peu trop d'ostentation. Il ne dispense pas d'ailleurs de consulter les auteurs qui ont écrit sur cette maladie.

ARTICLE XIV.

Mouvements des maladies, naissances & morts des animaux dans différentes époques du jour naturel; par M. Paschal.

AVANT soupçonné pendant quelques mois que les causes des marées devoient aussi exercer leurs actions sur d'autres parties du globe terrestre, quoique leurs effets ne fussent pas sensibles sur les solides & sur les fluides, je me suis livré à des recherches sur cet objet. J'ai divisé l'espace de vingt-quatre heures, qui est la durée du jour naturel, en quatre senaires d'heures. Le premier de ces senaires comprend les trois heures qui précèdent & les trois heures qui suivent le passage de la lune au méridien; le second senaire comprend les six heures qui suivent, & le troisième & quatrième senaires comprennent les deux autres quarts du jour naturel.

Je suis passé ensuite à l'examen des naissances & des morts dans l'espèce humaine, comme dans les autres espèces d'animaux, pour voir indifféremment auquel de ces senaires elles paroissent correspondre. J'ai trouvé qu'on ne naissoit ni qu'on ne mouroit par les voies ordinaires de la nature

H h ij

N^o. 102.

dans le premier & le troisième senaires que j'appelle la première marée, mais que ces deux opérations naturelles s'exécutoient dans le second & le quatrième senaires que j'appellerai le premier & le second reflux.

J'ai passé ensuite à l'observation des mouvemens des maladies, ce que je pouvois faire d'autant mieux qu'il y avoit dans ma famille quelques personnes qui avoient des fièvres intermittentes. J'ai remarqué que l'exacerbation des accès duroient en général durant tout le tems des marées, & qu'ils se terminoient ensuite par de douces sueurs pendant les reflux. D'après des observations multipliées, & en faisant abstraction d'autres circonstances accessoiress de l'état moral & physique, de la saison, &c. j'établis comme une maxime, que le mouvement, la vigueur, l'action, la force, &c. paroissent avec plus d'énergie durant le flux des marées; & que le repos, le relâchement, la décadence, la dissolution ont lieu pendant le reflux.

ARTICLE X V.

Espèce de rumination; par M. F. Slare.

N^o. 103.

UN homme de Bristol commence à mâcher ses alimens environ un quart d'heure après ses repas, s'il a pris quelque boisson; s'il n'a point

bu, il est plus longtems à ruminer. Cette manière de mâcher après le repas dure environ une heure & demie. S'il se couche immédiatement après le repas, il ne peut dormir jusqu'à ce que le tems ordinaire employé à cette seconde mastication soit entièrement passé. Ses alimens dans ce retour à la bouche lui paroissent plus sapides que dans la première mastication. Le pain, la viande, le fromage & la boisson reviennent à la bouche comme s'ils avoient été mêlés ensemble dans un mortier. Les liquides, comme le bouillon, la bouillie, reviennent à la bouche comme une nourriture solide & sèche.

N°. 193.

Lorsqu'il est privé de cette propriété de ruminer, il est malade; il en est attaqué depuis l'âge de 20 ans. M. Stare dit avoir connu plusieurs personnes à Londres qui sentent revenir à la bouche la masse alimentaire avec un mauvais goût & une sensation d'amertume demi-heure après le repas, & cela est très-dégoûtant pour elles; mais dans la vraie rumination les alimens reviennent à la bouche avec un goût agréable, & il semble que c'est avec délices qu'on les remâche.

Note du traducteur. Le terme technique de l'espèce de rumination dont il est ici question est le *merycisme*. *Fabricius ab aquapendente* est un des deux premiers qui l'a fait connoître, & il en rap-

N^o. 193.

porte deux exemples. Il parle d'abord d'un habitant de Padoue qui, environ une heure après ses repas, sentoit des portions de ses alimens revenir de l'estomac dans sa bouche, & qui les mâchoit de nouveau avec une sorte de délices. Le même auteur rapporte un second exemple qui est d'un autre genre & qui paroissoit tenir à une hernie de l'estomac; c'étoit un moine dont les alimens étoient aussi-tôt rejetés qu'ils étoient pris, en sorte que, faute de nourriture, il tomba dans le marasme & la consomption. On voit bien qu'un pareil fait ne doit pas être confondu avec le merycisme proprement dit. On trouve d'autres exemples de merycisme dans une dissertation chirurgicale qui a fait la matière d'un acte public en 1786, & qui a pour titre : *de vomituum diversis speciebus accuratius distinguendis.*

ARTICLE XVI.

*Sur la réunion du corps de deux fœtus; par
M. Parsons.*

Année 1760.
Vol. XLV.

Ce fœtus double, dont l'accouchement fut très-laborieux, est décrit avec soin par M. Sherwood qui en fit l'examen anatomique; les deux corps étoient réunis par leur partie antérieure depuis

l'extrémité supérieure du sternum jusqu'à l'ombilic. Chaque fœtus avoit son œsophage, son estomac & son pylote dans l'état naturel; il en étoit de même du *duodenum* pendant une longueur de trois pouces; mais alors ces deux conduits se réunissoient en un seul & aboutissoient au *jejunum* qui d'ailleurs offroit beaucoup d'irrégularités.

Année 1769.
Vol. XLV.

Nous ne nous arrêterons point ici aux autres variétés du système vasculaire, mais nous croyons devoir donner un précis des réflexions de l'auteur sur la génération de semblables monstruosités. Il remarque d'abord que le système de la génération qui suppose l'organisation des animaux & des végétaux déjà formée dans leur semence, paroît être le plus sûr garant de l'uniformité des espèces, & qu'elle prévient en général la confusion, & & les écarts contre nature qui pourroient arriver. Tout animal & tout végétal est constant dans son espèce, & il paroît que, dès le premier remède de son développement, sa forme ne peut être altérée que par accréation ou par compression. Maintenant qu'on suppose que deux ou plusieurs œufs fécondés ou des embryons, parviennent dans la matrice, si les membranes de l'un & de l'autre sont libres & isolées, elles prendront un développement proportionnel; mais si les parties de ces membranes se trouvent serrées les unes contre les autres, qu'elles soient minces & foibles, ou que par une

Année 1760.
Vol. XLV.

résistance irrégulière ou un frottement elles viennent à se dissoudre ou à se rompre, alors leurs fluides s'uniront, & les deux petits embryons, n'ayant plus de membrane intermédiaire, adhéreront entre eux, & leurs parties tendres s'aglutineront; d'où il résultera que par leur tendance naturelle à s'accroître & à prendre du développement, il y aura une coalition réciproque des parties & une confusion plus ou moins marquée; ce qui aboutira à une production irrégulière & monstrueuse.

On peut citer plusieurs faits pour confirmer cette opinion, & pour montrer que les fibres des animaux & des végétaux ont une tendance surprenante pour s'étendre & pour s'insinuer les unes dans les autres, que les vaisseaux sanguins peuvent contracter une union réciproque, se prolonger ou même produire de nouvelles ramifications, lorsque le rétablissement d'une partie le demande. N'est-ce pas de cette manière que des tumeurs remplies de veines & d'un volume monstrueux se propagent à la surface du corps humain? N'est-ce point ainsi que les poumons peuvent contracter des adhérences avec la plèvre, de manière à ne former qu'une masse & à ne pouvoir être divisés qu'avec le scalpel comme des parties similaires d'un muscle? Ne fait-on point que les rejetons des arbres implantés sur d'autres troncs par la greffe, insinuent leurs fibres dans celles du tronc

sur lequel ils prennent de l'accroissement, en formant enfin une continuité de la partie ligneuse avec eux? De cette manière les sutures du crâne & celles des épiphyses des os, s'oblitérent totalement dans un âge avancé par une insinuation & une combinaison réciproque des fibres? En un mot comment des plaies récentes s'aglutineroient-elles si promptement s'il n'y avoit pas une insertion expéditive des vaisseaux, & si la circulation ne s'y continuoît.

Année 1760.
Vol. XLV.

A la vérité, quand on considère cet objet, il est difficile de concevoir comment cette union surprenante peut arriver, mais nous pouvons imaginer ce qui peut avoir lieu à l'égard de deux petits êtres organisés très-tendres, & dont les parties les plus éloignées les unes des autres ne sont pas peut-être à la distance d'un cinquantième de pouce, & alors leur adhésion ne sera plus regardée que comme très-naturelle. C'est ainsi que les deux fœtus, dont il est parlé ci-dessus, venant à se comprimer par leurs ventres au premier tems de leur formation, leur régumens tendres compris entre les muscles droits de chaque côté ont été amincis & dissous, & que la coalition des parties a eu lieu telle qu'on l'a décrite ci-dessus, ainsi que leur intrusion réciproque & leur apparence de confusion.

Ainsi, si le contact & la compression des deux

Année 1769.
Vol. XLV.

foetus est uniforme & modérée, leur accroissement se fera de la même manière; mais si la compression est très-grande en tout sens par l'action de l'utérus, il peut en résulter une confusion complète, & une masse irrégulière & informe. Si leur contact est tellement disposé qu'un foetus seul soit comprimé, & que l'autre soit plus libre, celui-ci prendra son développement naturel pendant que l'autre sera gêné ou interrompu dans quelqu'une de ces parties; il peut aussi survenir des membres superflus par une exubérance de suc nourricier & un développement plus libre.

Les mêmes phénomènes n'ont-ils point lieu à l'égard des végétaux. Les carottes, les navets & autres plantes ou racines qui ont leurs formes déterminées, n'éprouvent-elles point des changemens & des altérations par la compression qui en empêchant les sucs de se porter dans certaines directions, les déterminent dans d'autres. N'est-ce point de cette manière que ces productions végétales viennent à contracter des gibbosités & des difformités. Les courges en leur appliquant des ligatures durant leur accroissement ne prennent-elles point des formes variées? Les pommes qu'on met quand elles sont encore très-petites, dans des vaisseaux cylindriques, ne perdent-elles point leur forme ronde pour en prendre une cylindrique. C'est ainsi que les pommes, les noix, les châ-

taignes, &c. peuvent devenir doubles & s'écarter d'une manière plus ou moins marquée de leur forme naturelle.

Année 1760.
Vol. XLV.

ARTICLE XVII.

Description d'un monstre de l'espèce humaine dans deux lettres; observation communiquée à M. Banki.

CET article est accompagné d'un dessin de ce monstre. *Peruntaloo*, lors de la date de cette description, étoit âgé de 13 ans. Son individu propre ou particulier étoit bien fait. Il avoit quatre pieds six pouces & demi de hauteur, jouissant de toutes les facultés du corps & de l'ame, & donnant même des marques d'un esprit prématuré. Il est né à *Popelpahdoo* à soixante-dix milles ouest de *Masulipatan*. Au Cartilage enfi-forme de ce garçon est attachée par la symphise des os pubis une moitié inférieure d'un autre enfant. Cette moitié parasite, a les cuisses & les jambes froides, l'anus imperforé, mais elle rend l'urine par un acte de la volonté du garçon parfait. On y observe même que le pénis se trouve quelquefois en érection. Vers la partie inférieure de ce demi-corps sont placées deux vessies que

Année 1789.
Vol. LXXIX.

Année 1789.
Vol. LXXIX.

Peruntaloo peut enfler à volonté , & l'on voit clairement qu'elles communiquent avec ses poumons. Ces deux sujets ont un estomac commun , mais le canal intestinal ne paroît appartenir qu'à l'individu principal. Celui-ci reçoit les sensations excitées dans son appendice , sans toutefois être doué de la faculté de le mettre en mouvement.

ARTICLE XVIII.

Maladie très-grave du rein ; par M. Cowper.

N°. 122.

UNE jeune femme avoit éprouvé, environ huit ans avant sa mort, de légères douleurs dans la région lombaire, & rendu souvent des urines noirâtres. Au moindre mouvement la douleur augmentoit beaucoup; après avoir fait usage de plusieurs médicamens astringens pendant deux ans, la douleur lombaire augmenta au côté gauche, & il s'ensuivit une grande foiblesse, la perte de l'appétit, & de mauvaises digestions. Elle se rétablit de ces indispositions, & se trouva assez bien pendant deux ans : après cela elle éprouva des douleurs violentes, & son urine commença à être noirâtre. Quelques mois après, ses douleurs devinrent insupportables, & elle croyoit avoir senti un corps pesant qui, suivant son expression, étoit

tombé au-dedans d'elle. Elle prit de fortes doses d'opium qui calmèrent un peu ses douleurs. La position du corps qu'elle préféroit étoit de se tenir debout, plutôt que courbée, ce qui est le contraire de ceux qui ont des calculs dans les reins & les uretères. Elle se plaignoit d'un engourdissement dans la région gauche des lombes. Les douleurs du pubis augmentèrent beaucoup avant sa mort, & sa cuisse gauche fut très-engourdie.

N^o. 122.

A l'ouverture de son corps, en dégageant le rein affecté de ses adhérences avec ses parties voisines, la membrane extérieure se rompit en trois ou quatre endroits, & il en sortit une grande quantité d'un sang grumelé. Ce rein pesoit cinq livres, & l'autre qui étoit sain & d'un volume ordinaire ne pesoit que cinq onces. En coupant la substance du rein affecté il parut squirreux ou comme du foie qu'on auroit fait bouillir. On trouva trois ou quatre cellules pleines d'un sang grumelé provenu du déchirement de quelques vaisseaux sanguins avant la mort.



ARTICLE XIX.

Vers lombricaux & cucurbitains; par M. Lyster.
Le lumbricus latus; par M. Ed. Tyson. Le
lumbricus teres; par M. Tyson. Remède contre
les vers très-vanté; par M. Mayern. Vers
trouvés dans différentes parties du corps; par
M. Dent.

Année 1739.
 Vol. XLI.

Nous réunissons tous ces articles qui se trouvent dans les nos 95, 146, 147, 211, 213, & nous nous bornerons à en annoncer le titre, parce que les connoissances postérieures qu'on a acquises sur les objets sont plus exactes & plus étendues. On fait combien ont été utiles à cet égard les recherches de M. Muller, qui a décrit un grand nombre de nouvelles espèces de vers tirés du fond de l'océan, des eaux douces & des intestins des animaux. MM. Pallas, Wagler, Zeege, Fabricius, Goetze & Leske ont fourni aussi des matériaux précieux pour l'histoire des vers des intestins : mais tout ce que disent ces auteurs ne pouvoit être regardé que comme des fragmens ou de recherches isolées qu'il falloit réduire en corps de doctrine; c'est à cette époque que la société royale de Copenhague proposa

pour sujet d'un prix, la génération des vers des intestins, & les remèdes qu'on peut appeler vermifuges. M. Bloch, médecin de la faculté de Berlin, a remporté ce prix, & la traduction françoise de son ouvrage a paru en 1788. Nous tenoyons nos lecteurs à ce traité.

Année 1739.
Vol. XII.

Nous nous bornerons seulement à parler ici du remède contre les vers, qui est recommandé dans le numéro 211 des Transactions philosophiques, & dont le principal ingrédient est le mercure doux. On y fait entrer un peu de sucre pour qu'il soit plus agréable aux enfans. Voici la recette de ce remède qui est dû à Pontanus.

*Prenez du mercure doux, quinze grains,
De la scammonée, cinq grains,
Deux fois autant de sucre pour en former
des lozanges.*

On en donne deux ou trois, ou même davantage, suivant l'âge de l'enfant. Pontanus, auteur de ce remède, dit que cette dose qui, en France est propre à purger les adultes, ne produit en Angleterre aucun effet sur les personnes qui ont plus de quinze ans, & qu'il faut l'augmenter.

ARTICLE XX.

Tumeur stéatomateuse extraordinaire dans l'abdomen d'une femme; par M. Hanly.

Année 1771.
Vol. LXI.

UNE dame âgée de 36 ans, & au cinquième mois de sa grossesse disoit éprouver une tumeur extraordinaire dans l'estomac, qui paroissoit du volume d'un œuf de poule, & qui lui caufoit beaucoup de douleur & d'incommodité, mais dont elle espéroit être délivrée à son accouchement; elle étoit devenue très-maigre vers le terme de sa grossesse, & fut obligée de garder le lit.

M. Hanly, en l'examinant attentivement, remarqua une tumeur considérable contiguë à l'estomac; cette tumeur augmenta ensuite beaucoup, & s'étendit obliquement vers le côté droit, aussi bas que l'ombilic; elle étoit immédiatement sous le péritoine & les muscles abdominaux, & dans ses progrès on sentoit autour, d'autres petites protubérances d'une substance solide, & qui par leur distribution avoit quelque ressemblance avec la tête & les extrémités supérieures d'un fœtus. Cet assemblage étoit mobile de côté & d'autre, sans causer beaucoup de douleur; mais il résistoit & il devenoit sensible quand on tâchoit de le pousser en

en bas : M. Hanly lui fit administrer une simple infusion amère avec des poudres absorbantes , & il attendit, pour lui donner des désobstruans, qu'elle eût repris ses forces après l'accouchement.

Année 1771.
Vol. LXL

Cinq semaines après l'accouchement, la tumeur avoit beaucoup augmenté dans toutes ses dimensions, & ses protubérances offroient de plus en plus une certaine ressemblance avec la tête, le tronc & les extrémités d'un fœtus extra-utérin, autant qu'on pouvoit en juger à travers les muscles abdominaux qui étoient minces. Cette femme fut examinée par plus de dix, soit médecins, soit chirurgiens ou accoucheurs, & tous furent d'avis que la tumeur étoit formée par un fœtus extra-utérin. Cependant on ne se détermina point pour l'opétation césarienne, parce que la malade étoit trop foible & trop maigre pour qu'on pût conserver quelqu'espoir de la sauver par ce moyen. On crut donc devoir tout attendre de la nature, parce que d'ailleurs on ne sentoit aucun mouvement dans aucune partie de la tumeur, quoiqu'elle eût acquis un grand volume.

Les forces de la malade continuèrent à décliner; la tumeur & les symptômes augmentèrent durant les mois de Mai & de Juin, & le 23 Juillet suivant on sentit une petite fluctuation d'eau dans l'abdomen, & on l'engagea à donner à une autre

Année 1781.
Vol. LXL

nourrice l'enfant qu'elle s'étoit obstinée à vouloir allaiter; mais l'ascite continua avec le dépérissement. La seule position qu'elle put supporter dans le lit étoit d'être à demi-assise; elle succomba le 2 Septembre suivant.

A l'ouverture de son corps on trouva environ un gallon (quatre pintes) de fluide dans l'abdomen, & une grande tumeur stéatomateuse au-dessous du péritoine; elle avoit près de trois pouces d'épaisseur & sept pouces de longueur, depuis l'estomac jusqu'à l'angle obtus des côtes; dans quelques endroits elle avoit près de cinq pouces de largeur, depuis le sternum jusqu'aux vertèbres du dos; elle étoit pleine de protubérances de différens volumes; elle étoit d'une consistance ferme dans sa partie antérieure; mais plus molle postérieurement; elle étoit divisée en cellules nombreuses par des membranes minces; elle pesoit sept livres, étoit d'une forme irrégulière & adhérente à la partie antérieure de l'estomac; elle étoit si fortement unie à la surface inférieure du foie qu'on ne pouvoit l'en séparer sans employer beaucoup de force; elle pressoit & cachoit le colon, & s'étendoit depuis l'estomac jusqu'à l'ovaire droit & les vertèbres du dos. Le lobe antérieur du foie étoit si comprimé entre le diaphragme & la tumeur qu'il paroissoit applati, & plus petit qu'à

l'ordinaire & dans un état de dépérissement. Cette tumeur paroissoit un amas de graisse formé par une production & une distension de l'épiploon.

Année 1781.
Vol. LXI.

ARTICLE XIX.

Changement singulier qu'a éprouvé un ovaire humain dans sa structure; par M. M. Baillie.

LES ovaires des femmes, comme l'observe M. Baillie, sont sujets à une grande variété de changemens dans leur structure naturelle. Plusieurs de ces changemens sont exactement semblables à ceux qui ont lieu dans d'autres parties du corps; mais il y a une altération qu'il regarde comme propre à ces parties organiques, & qui jusqu'ici ne paroît point avoir été exactement déterminée; c'est une transformation de la substance naturelle de l'ovaire en une masse de graisse entremêlée de cheveux & de dents. On voit de pareils exemples de ce genre dans les recueils des observations de médecine, mais on n'en a point encore tiré les conséquences naturelles qui doivent en résulter sur leur formation. On les a considérées en général comme des essais imparfaits du développement d'un fœtus dans l'ovaire à la suite de l'union

Année 1789.
Vol. LXXIX.

Année 1789.
Vol. LXXIX.

des sexes. Cette conjecture peut être étayée par des circonstances d'une grande probabilité; mais il croit qu'on peut lui opposer des objections très-fortes. Le cas qui va être exposé lui fait penser que les ovaires des femmes ont en eux-mêmes une certaine faculté de suivre un procédé qui imite le résultat de la génération sans l'approche du mâle.

Le docteur Baillie a eu occasion de disséquer le corps d'une jeune fille de douze ou treize ans, & il a trouvé l'ovaire droit converti en une substance molle au toucher & du volume d'un gros œuf de poule. En incisant cette substance il trouva que c'étoit en apparence une masse de graisse entremêlée de cheveux & d'une excroissance d'os. Il fut d'autant plus surpris qu'il avoit été toujours porté à croire que de pareils écarts de la nature étoient une sorte de conception imparfaite, & comme les circonstances étoient très-singulières, il les examina encore avec une grande attention.

Cette masse de graisse étoit d'une couleur blanche, jaunâtre, & dans certains endroits d'un jaune plus marqué que dans d'autres; elle étoit très-onctueuse au toucher, & consistoit en portioncules courtes & séparées, sans avoir la consistance que la graisse a ordinairement dans les autres parties du corps. Elle devint très-molle quand on l'exposa à la chaleur du feu, & en la faisant tomber sur

un morceau de papier, elle s'y étendit de manière à le rendre plus transparent. Lorsque le papier ainsi imprégné fut exposé à la flamme d'une chandelle, il brûla avec un pétilllement considérable.

Les cheveux avec lesquels cette substance adipeuse étoit mêlée s'élevoient à la surface intetne de la capsule qui la contenoit; ces cheveux étoient isolés dans certains endroits, mais dans d'autres ils étoient en petits faisceaux dispersés à des distances irrégulières. En outre on trouvoit des cheveux qui étoient enveloppés librement dans la matière adipeuse. Quelques-uns de ces cheveux étoient d'une longueur considérable, puisqu'il y en avoit de trois pouces de long; ils étoient déliés & d'une couleur légèrement brune. Ils ressembloient beaucoup plus aux cheveux de la tête qu'au poil qu'on trouve ordinairement au pubis, & ils étoient d'une couleur analogue aux cheveux de la tête de la jeune fille.

On voyoit aussi naître de la surface interne de la capsule, quelques vestiges des dents humaines; l'une d'elles paroissoit une dent canine; une autre, une des petites dents machelières; les deux autres avoient la forme des dents incisives. On voyoit aussi un essai imparfait de la formation d'une autre dent. Ces dents n'étoient point pleinement formées, puisque les racines leur manquoient; mais

Année 1789.
Vol. LXXIX.

le corps de deux de ces dents étoit aussi complet qu'on puisse les trouver dans les circonstances ordinaires. Chacune d'elles étoit renfermée dans une capsule propre qui naissoit de la surface interne de l'ovaire, & qui consistoit en une membrane épaisse, blanche & opaque. Il y avoit une substance blanche spongieuse attachée à trois de ces dents. La membrane de l'ovaire elle-même étoit d'une épaisseur considérable, mais inégale dans différentes parties. Elle étoit unie à la surface interne & plus irrégulière à l'extérieur. L'utérus étoit plus petit qu'il n'a coutume de l'être à la naissance. Il étoit parfaitement sain dans sa structure, & en ouvrant sa cavité il offroit les apparences ordinaires de l'utérus d'un enfant à cette période de l'âge. L'ovaire gauche étoit très-petit & correspondoit à l'état de l'utérus. Il paroît par-là que l'utérus n'avoit pas encore reçu l'accroissement de volume qui est ordinaire à l'âge de puberté. L'hymen étoit dans son état d'intégrité, & tel qu'on le trouve ordinairement à cette période de l'âge. Il y avoit une sorte de poil follet sur les grandes lèvres, tel qu'on en voit ordinairement à la lèvre supérieure d'un garçon de seize ans.

Les circonstances qui viennent d'être rapportées donnent lieu à quelques conclusions naturelles que M. Baillie croit devoir en tirer. On ne peut d'abord

gnères attribuer à un état de maladie la formation de cette substance irrégulière. Elle a lieu dans une partie du corps qui sert à la génération & où il se forme quelquefois un fœtus complet. Il y auroit d'abord lieu de croire que cette production des cheveux & des dents dans l'ovaire est une sorte d'imprégnation imparfaite; mais il paroît aussi qu'il y a des raisons également fortes pour croire que de telles productions peuvent naître d'une action dans l'ovaire lui-même, sans aucun *stimulus* de la liqueur spermatique du mâle.

Dans le cas qui vient d'être rapporté, l'utérus étoit aussi petit qu'il l'est à la naissance, & l'ovaire droit correspondoit à l'état de l'utérus. Il n'avoit point été stimulé, ni ne paroïssoit capable de l'être par l'impression de la semence du mâle; c'est ce qui paroît être une circonstance très-déterminante; car on conserve encore dans la collection des pièces anatomiques de feu M. Hunter un œuf formé dans une des trompes de fallope, & l'utérus étoit deux fois plus volumineux qu'il ne l'est lorsque la femme n'a point été fécondée. M. Baillie en conclut de là que quand l'imprégnation a lieu hors de-la cavité de l'utérus, ce viscère prend encore part à l'action, & éprouve quelques-uns des changemens de l'imprégnation. Et quant à la conclusion relative à l'action de l'utérus dans la

Année 1789
Vol. LXXIX.

Année 1780.
Vol. LXXIX.

formation d'un fœtus extra-utérin, il est porté aussi à croire, d'après d'autres préparations, surtout d'après une pièce préparée & conservée dans la collection de M. Hunter, où le fœtus étoit formé dans l'ovaire, & dans laquelle l'utérus avoit pris un volume plus que double que hors l'état de fécondation; le même viscère étoit épais & spongieux, & ses vaisseaux sanguins avoient grossi de la même manière que dans un utérus imprégné. Mais dans le cas présent l'utérus n'avoit souffert aucun changement.

M. Baillie remarque en outre que nous ne devons pas regarder la formation des dents dans l'ovaire comme plus précoce qu'elle n'a coutume de l'être dans la tête d'un fœtus. Dans cet exemple cependant les dents étant formées comme elles le sont en général quelques mois après la naissance, leur accroissement devroit avoir commencé au moins plus de douze mois avant la mort de l'enfant; ce qui dans cette opinion porte leur commencement à un période beaucoup trop avancé pour qu'on puisse penser que l'imprégnation ait eu lieu.

D'après toutes ces circonstances, M. Baillie est porté à supposer que la formation des cheveux & des dents n'est pas la suite de l'union des sexes & d'une fécondation; mais qu'elle provient de

quelqu'action de l'ovaire lui-même, à laquelle l'utérus n'a point participé. Ce qui rend encore plus vraisemblable cette opinion, c'est qu'on a quelquefois trouvé des cheveux dans d'autres parties du corps humain qui n'ont aucune connexion avec les organes de la génération. Il s'est trouvé quelquefois des cheveux dans des tumeurs enkystées, & le docteur Baillie fait particulièrement mention de diverses préparations de cette nature qu'on peut voir dans la collection de M. Hunter. Toutes ces circonstances prouvent clairement que les cheveux peuvent se former sans aucune espèce de génération.

Mais les cheveux sont autant une substance particulière que les dents. Si l'un par conséquent peut être formé contre nature dans l'ovaire, on ne peut point donner de bonne raison pour prouver que l'autre ne peut pas y prendre son origine. L'action qui produit les uns n'est pas plus difficile à comprendre que celle qui produit les autres. M. Baillie croit donc que les dents peuvent être formées par une action particulière qui a lieu dans l'ovaire comme pour les cheveux.

Pour donner du poids à cette opinion, il ajoute que plusieurs dents se forment après la naissance de l'enfant, & que par conséquent leur formation dépend d'une action qui a lieu dans la mâchoire

Année 1789
Vol. LXXIX.

Année 1789.
Vol. LXXIX.

à une période particulière. Il se forme aussi quelquefois des dents dans l'âge adulte. M. Baillie observe que ces procédés ont lieu après que l'animal a été formé, en conséquence d'une certaine action excitée dans une partie déterminée du corps. Il y a donc moins de difficulté à croire que la même sorte de procédé peut s'étendre à d'autres parties du corps qui n'ont point cette destination naturelle. Et dans cette opinion il est raisonnable de supposer que les ovaires doivent avoir une plus grande aptitude à suivre un procédé un peu analogue à la génération, que d'autres parties indifférentes du corps, puisqu'ils appartiennent à des organes qui sont matériellement destinés à la reproduction. D'après toutes ces circonstances prises collectivement, il regarde comme très-probable que la formation des cheveux & des dents dans l'ovaire, ne dépend pas nécessairement, comme on l'a cru, de l'apptoché du mâle, mais qu'elle provient de quelque action particulière au-dedans de l'organe lui-même, & qui imite la génération.

M. Baillie n'ose point décider jusqu'à quel point un lecteur intelligent peut adopter cette conjecture. Nous devons cependant observer que nous convenons avec l'auteur qu'il n'y a point lieu de supposer que la génération des cheveux

& des dents dans une substance adipeuse trouvée dans l'ovaire, soit l'effet de l'union des sexes ; mais peut-être qu'on peut former une conjecture plus simple sur cette production. Quoique les dents paroissent en général après certaines périodes de la vie & dans une succession établie, cependant il est très-connu que leurs rudimens se découvrent dans la mâchoite du fœtus dès les premiers tems de son existence. Les dents, comme l'a observé M. Hunter, quoique tirant leur accroissement & leur nourriture du système, peuvent cependant être regardées comme étrangères au corps. Cette observation n'est pas moins applicable aux cheveux. Chaque cheveu qu'on trouve sur la tête ou sur toute autre partie du corps tire son origine d'un bulbe particulier aussi bien qu'une dent se produit de son rudiment. Ne peut-on point donc supposer que les dents & les cheveux croissent dans les ovaires, d'après une conformation monstrueuse des parties qui y forme des rudimens ou des bulles des uns & des autres ? Et cette conformation monstrueuse n'est-elle point particulière aux ovaires d'après les fonctions auxquelles ils sont naturellement destinés ? Quoique la génération doive être considérée comme un des plus grands mystères de l'économie animale, cependant on ne peut douter que les ovaires ne

Année 1789.
Vol. LXXIX.

Année 1785.
Vol. LXXIX.

participent à cette fonction, & qu'ainsi ils servent même à la production d'un fœtus complet qui doit posséder des cheveux & des dents; mais ce n'est que par le rapprochement des faits qu'on pourra confirmer cette conjecture ou toute autre qu'on pourra former sur cette matière. Il n'en résulte pas moins que l'observation rapportée ci-dessus ne laisse guères de doute sur l'indépendance qu'a cette production des cheveux & des dents dans l'ovaire, de l'acte même de la génération par l'union des sexes.

Fin du Tome second,

T A B L E

A L P H A B É T I Q U E

D E S M A T I È R E S.

A Accès au foie avec des calculs biliaires, 474 — survenus vers le centre des os longs, 320 Accidens qui surviennent à la suite des accouchemens, 385 Accouchement contre nature d'un fœtus par l'anus, 102 Affections spasmodiques causées par des vers, 245 Anglois dans un état progressif de prospérité. 2 — plus avancés que les autres peuples sur les calculs, relatifs à la population, 33 Anévrisme de l'artère fémorale, 304 — incertitude des symptômes de l'anévrisme en général, 300 Ascitique, hydatides trouvées dans son abdomen, 108 Attaque d'apoplexie, résultat de l'ouverture du corps, 475 Avoir-du-poids, mesure Angloise, 22	Aveuglement qui n'avoit lieu qu'après le coucher du soleil, 477 B Bandage à dix-huit chefs remplacé par un autre, 315 Bile, son usage dans l'économie animale, 178 — distension du ventre causée par son défaut, 182 Blessure de la vésicule du fiel, résultat de l'ouverture du corps, 178 — symptômes durant la vie, 180 Bronchotomie, opération telle qu'on la pratique à l'hôpital de Saint-André, 334 — auteurs qui en ont parlé, 336 — précautions à prendre, 339 Bousserole (<i>urva urfi</i>) employée contre le calcul de la vessie, 178 C Calus, observations sur sa production, 347
--	---

Calus, remarques critiques
sur l'emploi de l'ostéocole,

348

Calculs raboteux trouvés dans
la vessie d'un homme, 183

— volumineux reçu par une
femme, 87

— trouvé dans l'urètre, 94

— trouvé dans le rein, 99

— biliaire d'un grand vo-
lume évacué, 106

Cataracte, consiste-t-elle dans
une pellicule membra-
neuse ou dans l'opacité du

342

Cristallin, 342

Camphre, son efficacité con-
tre la manie, 55

— observation sur ajoutée,
60

— les effets sur l'économie
animale, 62

Chances de la vie depuis l'en-
fance jusqu'à 16 ans, 403

Collyre pour une blessure de
l'œil, 82

Conception dans une des
trompes de fallope, 70

Convulsions, effets extraor-
dinares qu'elles prodai-
sent, 118

— guéries par une grande
évacuation de vers, 100

Conséquences, pratiques à
tirer d'une blessure de la

191

vésicule du fiel, 191

Cornée de l'œil droit blessée
et guérie, 350

— la blessure avec laceration
de l'uvée, 81

D

Déjections, manquent par le
défaut de bile, 186

Délire fébrile guéri par le
quinquina, 234

Douleurs arthritiques traitées
avec l'huile de cannelle, 198

Duplicité des objets relative-
ment à la vision, 478

E

Eau froide, son usage contre
les fièvres, 150

Estomac perforé à la partie
supérieure, 91

— deux observations sur ses
blessures, 308

Examen chimique du fluide
d'un ascitique, 110

Embryon trouvé dans une
tumeur du bas-ventre, 76

Epiderme qui se détachoit pé-
riodiquement, 354

Epileptiques, résultat de l'ou-
verture du corps, 87

Euphorbe pris à l'intérieur
par accident, 458

Extraction des restes d'un
fœtus extra-utérin, 73

Evacuation des calculs bi-
liaires par une plaie de la

région de l'estomac, 110

F

Fécondité des femmes dans
les classes inférieures de la

société, 400

Fécondité des femmes dans

DES MATIÈRES. 511

- quelle période de la vie, 400
- proposée & évitée, 441
- Fièvre maligne contractée par l'ouverture d'un cadavre, 352
- intermittentes qui règnent à Tunis, 162
- Fistule lacrymale, nouvelle méthode de la traiter, 378
- instrument pour porter le mercure dans le sac lacrymal, 380
- procédé à suivre, 382
- Fœtus conçu dans l'ovaire & extrait par l'anus, 103
- resté 13 ans dans une des trompes de Fallope, 68
- né avec un corps double, 487
- né avec une tumeur à l'anus, qui contenoit les rudimens d'un embryon, 75
- Fungus qui végète dans la cavité médullaire d'un os, 327
- Fracture de la jambe, instrument pour contenir les os en place, 313
- & dépression du crâne avec perte d'une partie de la dure-mère & du cerveau, 358
- leur traitement & la guérison, 360
- explication de la planche qui représente cette blessure, 363
- du bras, 440
- amputation de ce bras
- Hémoptisie peu ordinaire, 469
- Huileux, souvent le meilleur antidote, 461
- employés à titre de vermifuges, 247
- Humérus, perte de sa tête à la suite de la gangrène, 311
- Hydro-enterocelle avec l'apparence d'un hydro-sarcocelle, 317
- I
- Infection de la petite vérole, exemple remarquable, 111
- Inoculation de la petite vérole; procédé suivi dans la nouvelle Angleterre, 112
- premiers essais en Angleterre, 114
- accidens qui l'ont accompagnée dans quelques cas, 120
- ses progrès en Angleterre, 123
- en usage depuis un tems immémorial dans le pays de Galles, 135
- Intestin ileum blessé & guéri, 296
- leur mouvement péri-staltique perdu par le défaut de bile, 185
- passé du sac herniaire

- dans celui d'une hydro-
cèle, 317
Insectes, ressemblans à des
mille pieds rejetés par le
vomissement, 253

L

- Laryngotomie, preuves en
sa faveur, 480
Langue, difformité causée
par une langue double, 80
Lépreux de l'île de la Guade-
loupe, 222
— caractère de cette lèpre,
223
— visite faite par ordre du
ministère, 226
Lettre sur la mortalité de la
petite vérole naturelle, 137
— sur le danger de la petite
vérole naturelle, 141
Luxation complète de l'os
de la cuisse, 427
— remarques sur ce cas,
429
— de l'os de la cuisse (autre
exemple), 431
— lettre à M. Huxham sur
cet objet, 438
Lythotomie par le haut appa-
reil, par M. Douglas, 276
— autre exemple, par M. Le-
cat, 292
— Lythotomie par l'appareil
latéral, 288

M

- Maladie épidémique, 214
— grave du rein, 492
Madère (île de) mortalité
de ses habitans, 18
Mélange de céruse & d'huile
pris à l'intérieur par acci-
dent, 102
Mortalité dans différentes
villes de l'Europe, 7
— sa différence entre les
villes & les campagnes, 34
Moyen proposé de tirer la
pierre de la vessie, 272
Muet qui recouvre l'usage
de la parole par un songe
effrayant, 78
Monstre de l'espèce humaine,
491
Mouvements des maladies,
correspondans aux diffé-
rentes époques du jour,
483
Muscles du cou, leur con-
vulsion invétérée, 477

N

- Néphrétiques (affections)
par des calculs biliaires,
206
— remède de M. Durand,
211

O

- Œil, maladie peu ordinaire
de cet organe, 218
— resté myope à la suite
d'une blessure, 85
Omoplate, sa perte à la suite
de la gangrene, 312
Opération à substituer dans
certains cas à la lytho-
tomie, 269
Ouverture du corps de plu-
sieurs

DES MATIÈRES. 513

- fleurs personnes mortes de la peste, 164
 - Os d'un poisson trouvé dans une tumeur de la fesse, 149
 - trouvé dans le bassin d'un homme, 448
 - Ossification du conduit thorachique, 414
 - symptômes survenus avant la mort, 415
 - examen anatomique après la mort: 416
 - continuation du même cas, 414
 - Ovaire qui contient des dents & des cheveux, 498
- P
- Paralytie périodique, 476
 - Peste de Constantinople en 1258, 38
 - ses symptômes, 45
 - son traitement méthodique, 51
 - son germe est-il répandu dans l'air? 44
 - peut-on l'avoir plusieurs fois? 42
 - peut-elle être mortelle au moment de son invasion? 40
 - la saison des chaleurs l'arrête-t-elle? 49
 - résultat de l'ouverture du corps de plusieurs pestiférés, 164
 - Plaie d'arme à feu, mortelle, 449
 - Pestiférés, expétiences faites avec leur bile, 169
- R
- Petite vérole partielle, 132
 - Population de la ville d'York considérée en divers tems, 3
 - causes générales de son accroissement, 2
 - Poisons pris à l'intérieur; conduite qu'ils demandent, 467
 - Proportion du nombre des garçons à celui des filles, 11
 - Polype rendu par l'expectoration, 93
 - du nez, son origine, 479
- S
- Régime aqueux; règles de ce régime, 152
 - attentions particulières durant ce traitement, 154
 - Remarques critiques sur certains calculs de mortalité, 16
 - Remède contre la dysenterie, 482
 - Rumination ou plutôt mérycisme, 484
- K
- Sauvages de la Virginie; leurs remèdes & moyens chirurgicaux, 164
 - leurs prêtres exercent la médecine, 168
 - leurs moyens de traiter les plaies, 167
 - exemple de ce traitement, 168
 - leurs principes de médecine, 170

Tome II. Chirurgie.

K k

514 TABLE DES MATIÈRES:

Sauvages de la Virginie ; plantes dont ils font usage, 371	— qui montre les chances de la vie à diverses périodes de l'âge, 387
— leur manière de vivre, 374	
Scabieuse employée à Tunis contre les fièvres intermittentes, 163	Tarentule, détails sur sa morsure, 472
Structure singulière des parties génitales, 105	Tumeur Stéatomateuse, 496
Symptômes causés par une blessure de la vésicule du fiel, 189	— extraordinaire survenue au genou, 344
Spina ventosa ; observation sur cette tumeur, 313	— survenue à la cuisse, & sa description, 355
— causée par l'effort éritique d'une fièvre, 321	
— causée par le froid, après un exercice violent, 325	
— remarques sur sa nature & son traitement, 329	
— changemens que cette maladie produit dans les os, 331	
Surdité ; expérience sur ce vice organique, 478	
T	
Tables sur la mortalité de la petite vérole, 144	
	V
	Vaisseaux lymphatiques, leurs usages, 254
	— théorie de Boerhaave sur ces vaisseaux, 255
	— ils ne reçoivent pas la lymphe des vaisseaux sanguins, 258
	— remarques additionnelles, 263
	Voies urinaires ; leur conformation remarquable, 101
	Usage des mains perdu en nettoyant du laiton, 445
	Usages médicaux de l'arbre de la cannelle, 195

Fin de la Table des Matières.

615232

















